

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Офіційне видання
Official publication

Бюлетень
Bulletin

10
2023



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
MINISTRY OF AGRARIAN POLICY AND FOOD OF UKRAINE
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
Свідоцтво КВ № 22460-1236 ПР
від 01.03.2017

Видається
12 разів на рік

Заснований
24 січня 2003 р.

Випуск 10, 2023

Головний редактор
Віштак І. А.

Editor-in-chief
I. Vishtak

Редакційна колегія
Мельник С. І.
(заступник головного редактора)
Павлюк Н. В.
(відповідальний секретар)

Editorial board
S. Melnyk
(deputyies editor-in-chief)
N. Pavlyuk
(executive secretary)



Український інститут
експертизи сортів рослин
UKRAINIAN INSTITUTE FOR
PLANT VARIETY EXAMINATION

Каражбей Г. М.
Тиха Н. В.
Голіченко Н. Б.
Гринів С. М.
Сиплива Н. О.
Стариченко Є. М.
Хоменко Т. М.

H. Karazhbei
N. Tykha
N. Holichenko
S. Gryniv
N. Syplyva
Y. Starychenko
T. Khomenko

10 2023

м. Вінниця
ТОВ «ТВОРИ»
2023

УДК 347.77:633(055)

0-92

0-92 Охорона прав на сорти рослин: Бюлетень / Український інститут експертизи сортів рослин. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. Вип. 10. 301 с.

Бюлетень видається на виконання Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» з метою організації офіційної інформаційної діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та реалізації міжнародних зобов'язань України, що випливають з її членства в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV).

Розповсюджується для селекціонерів, власників майнових прав інтелектуальної власності на поширення сортів, володільців патенту, виробників насіння і садивного матеріалу, селекційно-насінницьких фірм, науково-дослідних інститутів, ЗВО, технікумів. Становить також інтерес для господарств різної форми власності, городників і садівників.

УДК 347.77:633(055)

Адреса видавця:

Український інститут експертизи сортів рослин,
вул. Горіхуватський шлях, 15, м. Київ-41, 03041, Україна,
тел.: +38 044 290-40-45,
e-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua
веб-сайт: <http://sops.gov.ua>

ЗМІСТ

Офіційні відомості	6
Інформаційні повідомлення	6
Нормативно-правові документи	7
Відомості, внесені до Реєстру заявок	9
Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд	9
Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин	12
Відомості щодо ухваленої назви сорту рослин	14
Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	17
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин	17
Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати	23
Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	28
Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	28
Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати	38
Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати	48
Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	53
Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні	54
Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні	54
Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності	66
Сільськогосподарські:	
злаки	66
Жито посівне (озиме)	66
ЗУ Барезі	66
ЗУ Перспектив	67
Нива волошкова	68
Рефлектор	69
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент	70
Л2177ПхЛ2184Н	70
ХЮР035	71
Кукурудза звичайна	72
Булат херсонський	72
Дарунок херсонський	73
Січковий	74
Ярик	75
Кукурудза звичайна – батьківський компонент	76
1ПВНВ47	76
1ПТФТ47	77
ПХ4ДЗС	78
ПХ4ДЗЦ	79
Овес посівний (ярий)	80
Вудленд	80
Фостер	81
Пшениця м'яка (озима)	82
Атрибут	82
Біла	84
Бісквіт	85
Вірність одеська	86
Дженіс	87
Джубіло	88
Дністрянка одеська	89
Епіграф	90
Епітет	91
Етуаль	92
Євразія	93
Загадка одеська	94
ЗУ Віллем	95
ЗУ Шамаль	96
Київська 22	97
Малуша	98
Мізінка	99
МІП Аеліта	100
МІП Відзнака	101
МІП Дарунок	102
МІП Довіра	103
Новинка	104
НОВІК	105
Носівочка	106
Синтетик 240	107
Соліфлор КС	108
Творчість одеська	109
Трояна	110
Фокс	111
ФОРСАЙТ	112
Пшениця м'яка (яра)	113
Бромонт	113
ІС ЯРІЕЛЛА	114
Колос Поліський	115
МІП Веснянка	116
Перібонка	117
Реліквія	118
Сінді	119
Танок	120
Пшениця спельта (озима)	121
Білбері	121
Пшениця тверда (яра)	122
Аурата	122
Пшениця туранська	123
Пектораль	123
Сармат	124
Тритикале (озиме)	125
Златоуст	125
Тритикале (яре)	126
Кріпость харківська	126
Опора харківська	127
Ячмінь звичайний (дворучка)	128
Еволюція	128
Русин	130
Ячмінь звичайний (озимий)	132
Мелія	132
Нептун	133
Румкас	134

Тур	135	7ПВДХ67Б	171	Гарбуз мускатний	209
Ячмінь звичайний (ярий)	136	7ПВЛХ62Р	172	Баттернат де Люкс	209
Брант	136	7ПВЛХ62Р	173		
Генерал	137	7ПУГК32Р	174	Диня звичайна	210
ІС МАЛТИГО	138	7ПУГК32Р	175	Мегарин	210
Незламний	139	7ПУКЦ97А	176		
Покоління	140	7ПУКЦ97Б	177	Кабачок	212
Тася	140	7ПУХД10А	178	Еклер	212
Шубін	142	7ПУХД10Б	179	Контак	214
Ювента	143	ПХ1032А	180		
		ПХ1032Б	181	Кавун звичайний	216
Сільськогосподарські:		Сільськогосподарські:		АМІНА	216
бобові	144	картопля		Грей Белле	217
Горох посівний		Картопля	182	ГРІН ДЖАР	218
(зерновий)	145	АЛВЕРСТОН РАССЕТ	183	ЄЛОВ ЛАВ	219
Аякс	145	Камелія	183	Жако	220
Велетень	147	Кардіма	184	Медун	221
Оркестра	149	Коразон	185	СВ3807ВТ	222
Остімато	150	Роксоланівська	186	Чарльстон Грей Делюкс	223
Протін	151	Санред	187		
Симбіоз	153	СПЕКТРА	188	Капуста білоголова	224
		Тайгер	189	Ельза	224
Квасоля звичайна		ТРАЙПЛ7	190	Кабінет	225
(зернова)	154		191	Кората	226
Садгорянка	154	Сільськогосподарські:		Сплеш болл	227
		кормові	192	Тайсон	228
Нут звичайний	155	Горошок посівний (вика)		Капуста цвітна	229
Октавіус	155	(ярий)	193	ДЕПУРПЛ	229
		Ворскла	193	ЕЛЕКТРА	230
Сільськогосподарські:		Нітро	194	КЛЕМЕНТИН	231
круп'яні	156	Оазис	195		
Просо посівне	157	Пірит	196	Касоля звичайна	
Переможне	157			(овочева)	232
		Еспарцет виколистий	197	ЕСКАДРОН	232
Сільськогосподарські:		ВАЛЛОР	197	Контада	233
олійні та прядивні	158			Крома	234
Гірчиця біла	159	Конюшина лучна			
КОЗАЧКА	159	(червона)	198	Кукурудза цукрова	235
		Андріана	198	Макарон	235
Льон звичайний (озимий)	160	Атлант Носівський	199	Мегаза	236
ЛСЛ 1133	160	Любава	200	МУСС	237
		МЕЛІФОР	201	НІКОЛЬ	238
Льон низький		Оплески	202	Фрагман	239
(олійний, кудряш)	161			Шербет	240
Ланселот	161	Люпин вузьколистий	203		
		Ілдіго	203	Морква	241
Ріпак (озимий)	162			Карлав	241
Алекс	162	Люцерна посівна	204	Нью Курода АС	242
Коріда	163	МЕДІСАН	204		
Кросбі	164			Огірок посівний	243
Мессі	165	Тритикале (дворучка)	205	БРАНДІНО	243
Резорт	166	Єгор	205	Дієз	244
Тринідад	167			Маркетморе 70	245
Тріатлон	168	Сільськогосподарські:		Проскор	246
Юстас	169	овочеві	207	Фенікс де Люкс	247
		Вігна промениста (квасоля			
Соняшник однорічний –		золотиста, маш)	208	Помідор їстівний	248
батьківський компонент	170	Бераш	208	Хібачі	248
7ПВДХ67А	170			ХМ 5900	249

ХМ 9903	250	Актинідія пурпурова х актинідія гостра	264	Декоративні та лікарські	276
Редька посівна (редиска)	251	Галаретка	264	Первоцвіт	277
Експо	251	Фортуна	266	Веснянка	277
Марвіс	252			Лісова пісня	279
Радіс	253	Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщеп)	268	Чумацький Шлях	281
		Міробалан 29С	268		
Салат посівний	254		268	Хризантема	283
головчастий	254	Вишня степова х вишня ланезіана (підщеп)	269	шовковицелиста	283
Скайфос	255	ВСЛ 2.1	269	Коралове намисто	285
	255			Прометей	287
Цибуля городня	256	Груша звичайна	270	Рожева діадема	289
АЛМАНЗОРО	257	Вежа мускатна	270		
Болбул	258			Чорнушка дамаська	289
Редровер	259	Слива домашня	272	Різдвяна зірочка	289
Саратога	260	Октобер Сан 2	272		
Фасто	261			Лісові	290
	261	Яблуня домашня	274	Тополя	291
Плодові та ягідні	262	Градська	275	Макс-4	291
Аґрус звичайний	263	Дебют			
Кам'яноград					
Петрівка					
Холодний яр					
Інші відомості					292
Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України					292
Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин					293
Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту					294
Загальновживані скорочення термінів					299

Офіційні відомості Official notifications

Інформаційні повідомлення Information messages

З 23 по 27 жовтня 2023 р. у штаб-квартирі UPOV у м. Женеві (Швейцарська Конфедерація) відбулася 59-та сесія **Технічного комітету**, 80-та – **Адміністративного комітету** та **Юридичного комітету**, 100-та – **Консультативного комітету** та 57-ма – **Ради UPOV**, організовані Бюро. У засіданні взяли участь понад 45 країн-учасниць UPOV.

Під час роботи сесій було розглянуто документи відповідно до порядку денного. На Раді UPOV було заслухано та ухвалено такі документи: «Обмін програмним забезпеченням», «Програмне забезпечення, що використовується країнами-учасницями Союзу», «Система кодів UPOV», «Пояснювальні коментарі щодо назв сортів відповідно до Конвенції UPOV», «Пояснювальні коментарі стосовно суттєво похідних сортів відповідно до Акта Конвенції UPOV 1991 року»; TGP/7 «Розробка методик з експертизи (Трансформування стандартних формулювань методик на необов'язкові, ознаки стійкості до хвороб: додавання ступеню прояву та розміщення не позначених зірочками ознак стійкості до хвороб у розділі 5 технічної анкети, сортів-еталонів для кількісних ознак, позначених зірочкою, якщо надаються ілюстрації); TGP/12 «Керівництво з визначення фізіологічних ознак», TGP/14 «Глосарій термінів, що використовуються в документах UPOV», погоджено програми роботи комітетів та робочих груп і календар засідань органів UPOV на 2024 рік, погоджено методики для проведення експертизи на ВОС для *Oxypetalum coeruleum* (D. Don) Decne.; *Malus domestica* (Suckow) Borkh.; *Brassica napus* L. ssp. *nappus*; *Rubus occidentalis* L.; *Rubus idaeus* L.; *Brassica oleracea* L. var. *medullosa* Thell.; *Brassica oleracea* L. var. *viridis* L.; *Brassica oleracea* L. var. *costata* DC.; *Brassica oleracea* L. var. *sabellica* L.; *Brassica oleracea* L. var. *palmifolia* DC.; *Carthamus tinctorius* L. та після часткового перегляду – для *Brassica oleracea* L. var. *italica* Plenck; *Brassica oleracea* L. var. *gemmifera* DC.; *Brassica oleracea* L.: *Brassica*; *Daucus carota* L.; *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.; *Valerianella locusta* L.; *Valerianella eriocarpa* Desv.; *Cucumis sativus* L.; *Raphanus sativus* L. var. *sativus*; *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Kerner; *Zea mays* L.; *Raphanus sativus* L. var. *sativus*; *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S. Kerner; *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.; *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai *Oncidium* Sw.; *×Oncidesa* Hort.; *×Ionocidium* Hort.; *×Zelenkocidium* J.M.H.Shaw.; *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner; *Solanum lycopersicum* L. x *Solanum peruvianum* (L.) Mill.; *Solanum pimpinellifolium* L. x *Solanum habrochaites* S. Knapp & D.M. Spooner.

24 жовтня 2023 р. у штаб-квартирі UPOV відбулося друге засідання щодо електронної форми заявки, організоване Бюро UPOV.

Під час засідання заслухано інформацію щодо використання UPOV PRISMA, зокрема інструментів онлайн-заявки UPOV PRISMA, Модуля адміністрування UPOV електронної заявки про охорону прав селекціонера, адміністрування заявок та документів з охорони, комунікації із заявниками/власниками прав, публікації прав на сорти рослин та внесення даних до бази PLUTO, Модуля обміну звітами на ВОС за формою UPOV на сорти, що мають правову охорону, між офісами з охорони прав селекціонера у співпраці з іншими офісами з правової охорони сортів за експертизи на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС); щодо Баз даних PLUTO; Платформи співпраці членів UPOV: платформа для співпраці членів UPOV в управлінні та розгляді заявок. Погоджено, що першою платформою стане електронна заявка для країн Азії.

Проінформовано, що з 18 липня по 11 серпня 2023 р. було проведено тестування модулів UPOV для адміністрування електронної заявки та обміну звітами з експертизи на ВОС за формою UPOV. У заході взяли участь Азербайджан, Бразилія, Канада, Китай, Еквадор, Єгипет, Європейський Союз (CPVO), Гана, Ізраїль, Японія, Мексика, Королівство Нідерланди, Об'єднана Республіка Танзанія, Сінгапур, ПАР, Швейцарська Конфедерація, Великобританія та В'єтнам.

25 жовтня 2023 р. у штаб-квартирі UPOV відбулось четверте засідання **Робочої групи з рекомендацій для дрібних фермерів щодо приватного та некомерційного використання**, організоване Бюро UPOV. У роботі засідання взяли участь представники країн-учасниць UPOV, у тому числі з Європейського Союзу та міжнародних організацій.

Під час зустрічі відповідно до порядку денного було заслухано інформацію про розробку Положення та склад робочої групи стосовно Керівництва для дрібних фермерів щодо приватного та некомерційного використання; Про компіляцію відповідей, отриманих від компетентних органів щодо «поширених запитань, актуальних для дрібних фермерів і фермерів, які ведуть натуральне господарство»; Про Компіляцію відповідей, отриманих від компетентних органів щодо «варіантів для питань, які можуть бути розглянуті під час перегляду поширених запитань щодо винятків із прав селекціонера».

Під час зустрічі відповідно до порядку денного було заслухано інформацію про проведений аналіз і звіт з пропозиціями команди проєкту та обговорено наступні кроки для вирішення питань.

Нормативно-правові документи Regulatory documents

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1738 від 02.10.2023 «Про внесення змін до Порядку проведення кваліфікаційної експертизи сорту» внесено до Порядку проведення кваліфікаційної експертизи сорту, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 липня 2023 року № 1344, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 липня 2023 року за № 1244/40300, такі зміни:

1) у розділі II:

у пункті 3 слова та цифри «від 15 липня 2022 року № 798» замінено словами та цифрами «від 04 серпня 2023 року № 813»;

у абзаці першому пункту 6 слова «на ПСП» виключено;
у пункті 10 слово «типу» виключено;

2) у пункті 4 розділу III слова «у разі, якщо результати врожайності в пункті дослідження є нижчими на 25 і більше відсотки ніж усереднена врожайність цього ж об'єкта заявки в інших пунктах досліджень тієї ж ґрунтово-кліматичної зони, такі результати зазначаються окремо та не враховуються як результати річного циклу досліджень та при формуванні експертного висновку» виключено;

3) у пунктах 1 та 2 розділу VI слова «експертний заклад» у відповідному відмінку замінено словами «Компетентний орган» у відповідному відмінку;

4) у пункті 4 розділу VII слова «До складу Комісії входять: представник експертного закладу, відповідальний за дотримання методичних вимог, який є одночасно головою комісії, експерт сорту та/або керівник структурного підрозділу пункту дослідження, представник Компетентного органу, заявник або його представник (представники)» замінено словами «До складу Комісії входять: представник експертного закладу, відповідальний за дотримання методичних вимог, який є одночасно головою комісії; експерт (експерти) сорту; керівник структурного підрозділу пункту дослідження; представник Компетентного органу; заявник або його представник (представники)».

5) додаток 7 до цього Порядку викладено у новій редакції.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1790 від 10.10.2023 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 серпня 2023 року № 1609» внесено до Порядку складання, подання та розгляду заявки на сорт, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 31 серпня 2023 року № 1609, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2023 року за № 1735/40791, такі зміни:

у пункті 1 розділу I слова «Компетентного органу» замінено словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (далі – Компетентний орган)»;

у розділі II:

в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова «згідно з додатком» замінено словами «, наведеною у додатку»;

у пункті 7:

в абзаці першому слово «розділі» замінено словом «рядку»;

в абзацах п'ятому – сьомому розділовий знак «-» замінено розділовим знаком «—»;

абзац восьмий викладено у такій редакції:

«Якщо у рядку 4 додатків 1, 2 до цього Порядку наведені відомості більш ніж про двох заявників, у цьому рядку зазначається відповідна кількість аналогічних аркушів цього рядку заявки»;

у розділі III:

в абзаці сьомому підпункту 2 пункту 2 слово «уважається» замінено словом «вважається»;

в абзаці дев'ятому підпункту 2 пункту 2 перше речення викладено у такій редакції: «Довіреність, видана поза межами України, підлягає легалізації в установленому законодавством порядку, а форма і строк дії такої довіреності визначаються законодавством країни, де вона була видана»;

у підпункті 3 пункту 2 слова «копію», «завірену», «на українську мову» замінено словами «копія», «завірена», «українською мовою, засвідчений в установленому законодавством порядку» відповідно;

в абзаці першому пункту 9 слова та цифри «умов пункту 1 розділу III цього Порядку» замінено словами та цифрою «вимог пункту 1 цього розділу»;

у пункті 15 розділу IV слова «у відповідності», «Міністерством» замінено словами «відповідно», «у Міністерстві» відповідно;

у розділі V:

в абзаці другому пункту 1, абзаці четвертому пункту 3 після слів «офіційному виданні» доповнено словами «Компетентного органу»;

в абзаці четвертому пункту 3 слова «що й запропонованої» замінено словами «що й для запропонованої»;

в абзаці другому пункту 4 слово «як» виключено;

в абзаці першому пункту 7 розділу VI слова та цифри «розділу VI цього Порядку» замінено словами «цього розділу»;

у додатку 1:

у відмітці слово «Правил» замінено словом «Порядку»;

у рядку 5 таблиці слова та цифри «у рядку 5», «in paragraph 5» замінено словами «у цьому рядку», «in this paragraph» відповідно;

у рядку 6 таблиці слово «заявці» замінено словом «заявці»;

у рядку 7 таблиці:

слова «цього Закону» замінено словами «Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"»;

слова «автору(ам)», «потребує» замінено словами «автор(и)», «потребує(ють)» відповідно;

у рядку 8 таблиці слова «іншим», «Сорт» замінено словами «інше», «сорт» відповідно;

у рядку 10 таблиці слова «Селекційни й» замінено словом «Селекційний»;

у рядку «ДЕКЛАРАЦІЯ / DECLARATION» слова «офіційний та дослідний зразки», «Заявки» замінено словами «офіційний та дослідний зразки сорту», «цієї Заявки» відповідно;

у додатку 2:

у відмітці слово «Правил» замінено словом «Порядку»;

у рядку 5 таблиці слова та цифри «у рядку 5», «in of paragraph 5» замінено словами «у цьому порядку», «in this paragraph» відповідно;

у рядку 6 таблиці слово «заявкі» замінено словом «заявці»;

у рядку 7 таблиці слова «автору(ам)», «потребує» замінено словами «автор(и)», «потребує(ють)» відповідно;

у рядку «ДЕКЛАРАЦІЯ / DEKLARATION» слова «офіційний зразок», «до Заявки» замінено словами «офіційний зразок сорту», «до цієї Заявки» відповідно;

у додатку 3:

у рядку 1 таблиці цифру та слово «1. Subject» замінити словом «Subject»;

у рядку 5 таблиці слово «установі» замінено словами «Компетентному органу та/або експертному закладу»;

у рядку 7 таблиці слова «а)», «б)» виключено;

у додатку 5 слова та цифри «Згідно умов», «Закону», «визначених статтею 20» замінено словами та цифрами «Відповідно до вимог», «Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”», «визначеним статтею 20» відповідно;

у додатку 10 слова «вимогам нормативно-правових актів» замінено словами «законодавством вимогам».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1835 від 19.10.2023 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 жовтня 2023 року № 1738» унесено зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02 жовтня 2023 року № 1738 «Про внесення змін до Порядку проведення кваліфікаційної експертизи сорту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2023 року за № 1807/40863, такі зміни:

в абзаці другому підпункту 1 пункту 1 цифри та слово «2023року» замінити цифрами та словом «2023 року»;

у підпункті 2 пункту 1 після слова «слова» доповнити словами «та цифри»;

у підпункті 3 пункту 1 слова «у відповідному відмінку» (у двох випадках) замінити словами «у всіх відмінках», «у відповідних відмінках».

Відомості, внесені до Реєстру заявок

Notification listed in the Register of applications

Заявки на сорти рослин, щодо яких може бути встановлена дата подання заявки на сорт, та сплачено збір за її подання і розгляд

Applications for varieties of plants, for which the date of submission of the application for the variety can be set, and the fee for its submission and consideration has been paid

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)					
23006006	11.10.2023	БЕРІНГ BERING	2440	PC, AC NLI, AC	Carlo Invernizzi
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
23009022	18.08.2023	P8902 P8902	1688	ПС PBR	Johann Fangl
23009023	18.08.2023	P9967 P9967	1688	ПС PBR	Goran Drinic
23009024	18.08.2023	1091B612 01 1091B612 01	1688	ПС PBR	Goran Drinic Mykola Vlasjuk
23009025	18.08.2023	P9944 P9944	1688	ПС PBR	Goran Drinic
23009026	18.08.2023	БРВ2814Б BRV2814B	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009027	18.08.2023	P8660 P8660	1688 1690	ПС PBR	Benoit Revol
23009028	18.08.2023	1089B481 01 1089B481 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009031	18.08.2023	1082B213 01 1082B213 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009032	18.08.2023	P9002 P9002	1688 1690	ПС PBR	Benoit Revol
23009034	18.08.2023	1084B563 01 1084B563 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009035	18.08.2023	1092B839 01 1092B839 01	1688	ПС PBR	Johann Fangl
23009039	18.08.2023	P9975 P9975	1688 1690	ПС PBR	Goran Drinic
23009042	18.08.2023	1086B224 01 1086B224 01	1688	ПС PBR	Christian Riedelsheimer
23009043	18.08.2023	БРВ2931Б BRV2931B	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009045	18.08.2023	1091B610 01 1091B610 01	1688	ПС PBR	Johann Fangl
23009047	18.08.2023	1087B013 01 1087B013 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009029	21.08.2023	P7655 P7655	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009030	21.08.2023	1001B860 01 1001B860 01	1688	ПС PBR	Goran Drinic
23009036	21.08.2023	P8115 P8115	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009037	21.08.2023	1082B210 01 1082B210 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009038	21.08.2023	P0260 P0260	1688	ПС PBR	Adriana Cristina Dobre
23009040	21.08.2023	1083A168 01 1083A168 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009041	21.08.2023	1005B749 01 1005B749 01	1688	ПС PBR	Goran Drinic
23009049	21.08.2023	БРВ2770Б BRV2770B	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009050	21.08.2023	P8256 P8256	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009051	21.08.2023	P8317 P8317	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009052	29.08.2023	1081B761 01 1081B761 01	1688	ПС PBR	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
23009053	29.08.2023	1084B561 01 1084B561 01	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23009054	29.08.2023	П0450 P0450	1688	ПС PBR	Adriana Cristina Dobre
23009057	29.09.2023	ПС 310 PS 310	3228	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Фещенко Василь Васильович Якимчук Руслан Андрійович
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
23039029	18.08.2023	П63ГЕ189 P63HE189	1688	ПС PBR	Anke Gehinger
23039030	18.08.2023	П64ЛЕ230 P64LE230	1688	ПС PBR	Manuel Yruela
23039032	18.08.2023	П64ЛП190 P64LP190	1688	ПС PBR	Antoine Mezzarobba
23039035	29.09.2023	ПС-115Е PS-115E	3228	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Фещенко Василь Васильович Якимчук Руслан Андрійович
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
23045013	27.09.2023	Аурикула Auricula	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
23045014	27.09.2023	Акасса Acassa	2011	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Bernhard Mayr
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
23088009	11.10.2023	Дейзі Daisy	2584	РС, АС NLI, AC	Eric Bonnel
Горох посівний (овочевий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea, Garden Pea					
23095004	02.10.2023	Олсан Allsun	2836	РС NLI	Radu Grumeza
23095005	02.10.2023	Лоар Loire	2836	РС NLI	Radu Grumeza
Капуста червоноголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>rubra</i> DC. Red Cabbage					
23097001	16.08.2023	Тінті Tinty	2086	РС NLI	Gerard Balder
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
23101004	05.09.2023	БАЙТОН WHITON	1833	РС NLI	Tomoaki Funabiki
23101005	05.09.2023	АЛСТОН ALSTON	1833	РС NLI	Basile de Bary
Цибуля шалот <i>Allium oschaninii</i> O. Fedtsch. Shallot, Grey Shallot					
23107002	26.09.2023	Бонус Bonus	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Михайлин Володимир Ігоревич Біленька Ольга Миколаївна Штепа Лариса Юрївна Сабельник Тетяна Олександрівна
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
23110011	20.09.2023	Герміна Hermína	1997	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Petr Horal
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
23115021	16.08.2023	Галіцено Galíceno	2070	РС NLI	Shai Nashilevitz
23115022	26.09.2023	Серпневий подарунок Serpnevyy podarunok	1781	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Куц Олександр Володимирович Самовол Олексій Петрович Замицька Тетяна Миколаївна Михайлин Володимир Ігоревич Кондратенко Сергій Іванович
23115023	10.10.2023	Зухраса Zuhrasa	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Maarten Verlaan
23115024	11.10.2023	Родіон Rodion	2529	РС NLI	Angelo Boni
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish					
23118002	16.08.2023	Пеніто Pepito	2086	РС NLI	Andre van Andel
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage					
23135001	05.09.2023	КІСЕКІ KISEKI	1833	РС NLI	Kazuhiro Nishikawa

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Запропонована назва сорту Proposed variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Мета реєстрації (ПС, РС, АС) Purpose of registration (PBR, NLI, AC)	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
23148003	26.09.2023	Кефрен Kefren	1730	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Pedro Navarro Lara
Турнепс <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs. Turnip Rape					
23178001	12.10.2023	ФІНІТО FINITO	971	РС, АС NLI, AC	Piet Lammers
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
23196002	11.10.2023	ІЗОЛА ISOLA	2440	РС, АС NLI, AC	Carlo Invernizzi
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry					
23296005	17.08.2023	Черкашаночка Cherkashchanochka	3220	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стукало Тетяна Вікторівна
23296006	17.08.2023	Шполяночка Shpolianochka	3220	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стукало Тетяна Вікторівна
23296007	17.08.2023	Вітюша Vitiusha	3220	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стукало Тетяна Вікторівна
Смородина чорна <i>Ribes nigrum</i> L. Black Currant					
23297001	17.08.2023	Кендал Kendal	3220	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стукало Тетяна Вікторівна
23297002	17.08.2023	Стрікланд Striklend	3220	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стукало Тетяна Вікторівна
23297003	17.08.2023	Крав Krav	3220	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Стукало Тетяна Вікторівна
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum					
23672002	03.10.2023	Анджелено 2 Andzheleno 2	3218	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Ярмалюк Іван Савич Будзинський Олександр Сергійович
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
23909058	18.08.2023	1ПЗУЛ46 1PZUL46	1688	ПС PBR	Susanne Groh
23909062	18.08.2023	1ПССУ26 1PSSU26	1688	ПС PBR	Susanne Groh
23909067	18.08.2023	ПХ4ЦТД PH4CTD	1688	ПС PBR	Maryse Lafouasse
23909073	18.08.2023	ПХ4ЦСГ PH4CSG	1690	ПС PBR	Edwin Grote
23909074	18.08.2023	1ПБЕВ24 1PWEV24	1690	ПС PBR	Christopher Rasmussen
23909075	18.08.2023	1ППНК23 1PPNQ23	1688	ПС PBR	Milorad Rosulj
23909077	18.08.2023	1ПВДЕ32 1PWDE32	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23909078	18.08.2023	ПХ2Т03 PH2T03	1688	ПС PBR	Ronicke Stephan
23909055	21.08.2023	1ПГЗВ72 1PGZW72	1690	ПС PBR	Julia Zhang
23909059	21.08.2023	1ПЙТИ48 1PJTY48	1688	ПС PBR	Benoit Revol
23909066	21.08.2023	1ПДКА37 1PDQA37	1688	ПС PBR	Laurence Pauly
23909069	21.08.2023	1ПХЕИ73 1PHEY73	1688	ПС PBR	Susanne Groh
23909080	21.08.2023	1ПГИЛ72 1PGYL72	1690	ПС PBR	Mario Carlone
23909082	21.08.2023	1ПМС341 1PMSZ41	1688	ПС PBR	Laurence Pauly
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
23940014	04.08.2023	Сінді КС Cindi CS	2890	ПС, РС, АС PBR, NLI, AC	Sandrine LEGROS

Відомості щодо зміненої та ухваленої назви сорту рослин

Notification on changed and approved plant variety denomination

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)				
21006004	1581	06.10.2023	Алькор	Голді Holdi
23006002	1581	05.10.2023	Поларіс	Беллатрікс Bellatriks
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn				
20009090	844	31.10.2023	ЕЮ4662	4111Ц 4111C
20009097	844	24.10.2023	ЕВ5154	АГСТЕЛЛАР AGSTELLAR
21009100	844	03.10.2023	ЕВ4563	ДКС4433 DKC4433
21009103	844	27.10.2023	ЕВ4671	МОГАБРІКС MOGABRIX
21009137	2890	02.10.2023	ЕС321408	ЛІД4101Ц LID4101C
21009142	2890	02.10.2023	ЕС320201	ЛІД2020Ц LID2020C
22009091	844	05.10.2023	ЕВ4051	ДКС4031 DKC4031
22009129	1783	09.10.2023	РХ22003	РЖТ РЕТАЛІКС RGT RETALIXX
22009130	1783	09.10.2023	РХ21036	РЖТ СЕДЕКС RGT CEDEXX
22009140	2720	16.10.2023	МЖМ438274	КРАКЕН KRAKEN
22009146	2720	17.10.2023	МЖМ475892	ПАКІТО PAKITO
22009153	1783	09.10.2023	РХ22033	РЖТ СУФІКС RGT SUFFIXE
22009154	1783	09.10.2023	РХ22029	РЖТ ПЕТЕКС RGT PRETEXTE
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)				
22012052	1517	05.10.2023	Еверест	Гравіс Hravis
22012053	1517	12.10.2023	Аватар	Аватар Харківський Avatar Kharkivskyi
23012005	1517	05.10.2023	Кассіопея	Фурія Furiia
23012007	1517	05.10.2023	Пектораль	Коллана Kollana
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)				
23015003	1581	10.10.2023	Плутон	Харківський патрон Kharkivskyi patron
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)				
21020007	1581	06.10.2023	Корал	Січовик Sichovyk
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower				
21039083	2890	06.10.2023	ЕСХ19041	ЕС ГАМА ES GAMA
21039085	2890	06.10.2023	ЕСХ21028	ЛІД1028Л LID1028L
21039086	2890	06.10.2023	ЕСХ21106	1043Л КЛП 1043L CLP
21039087	2890	06.10.2023	ЕСХ21125	ЛІД1015Л СУ LID1015L SU
21039088	2890	06.10.2023	ЕСХ90553	ІНСАН 288 КЛП INSUN 288 CLP
21039090	2890	06.10.2023	ЕСХ91218	1047 Л КЛП 1047 L CLP
21039091	2890	06.10.2023	ЕСХ21110	ІНСАН 299 СУ INSUN 299 SU
21039102	2643	05.10.2023	С2203	Маріголдес Marigoldes

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Запропонована назва сорту при поданні заявки Plant variety denomination during order application	Змінена та ухвалена назва сорту Changed and approved variety denomination
21039103	2643	24.10.2023	C2202	Равенес Ravenes
21039105	2890	06.10.2023	ECX20018	1018Л КЛП 1018L CLP
22039048	1783	09.10.2023	PA1037543	ЛЕРОС КЛП LEROS CLP
22039049	1783	09.10.2023	PA1040394	СПІРАЛЛЬ SPIRALL
22039053	1783	09.10.2023	PA1041066	РЖТ ВАЛЛЪКІРІЯ RGT VALLKYRIE
22039054	1783	09.10.2023	PA1040506	ВІВАЛЛЬТО КЛП VIVALLTO CLP
22039076	1783	12.10.2023	PA8125950	РЖТ ПАЛЛЬМЕР КЛП RGT PALLMER CLP
22039077	1783	12.10.2023	PA1041068	РЖТ МАРСЕЛЛО RGT MARCELLO
23039010	2890	06.10.2023	ECX21036	ІНСАН 120 INSUN 120
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean				
21045030	1783	10.10.2023	C15234	РЖТ СЕФОРА RGT SEFORA
22045028	1783	12.10.2023	C16921	СТАПЕЛІЯ STAPELIA
22045030	1783	12.10.2023	C16996	СУЗА SUZA
22045031	1783	12.10.2023	C16214	ШІВА SHIVA
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash				
22148001	2841	02.10.2023	Мелак	Контак Kontak
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear				
22258001	1940	27.10.2023	Червона Рута	Сяйво Siaivo

Відомості щодо ухваленної назви сорту рослин

Notifications on approved denomination for plant variety

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)			
23006006	2440	17.10.2023	БЕРІНГ BERING
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn			
22009135	793	06.10.2023	ЛЗМ272/02 LZM272/02
23009025	1688	23.10.2023	П9944 P9944
23009026	1688	23.10.2023	БРВ2814Б BRV2814B
23009027	1688 1690	26.10.2023	Р8660 P8660
23009030	1688	27.10.2023	1001Б860 01 1001B860 01
23009032	1688 1690	30.10.2023	Р9002 P9002
23009036	1688	23.10.2023	Р8115 P8115
23009038	1688	23.10.2023	Р0260 P0260
23009039	1688 1690	24.10.2023	Р9975 P9975
23009041	1688	24.10.2023	1005Б749 01 1005B749 01
23009043	1688	24.10.2023	БРВ2931Б BRV2931B
23009045	1688	24.10.2023	1091Б610 01 1091B610 01
23009050	1688	27.10.2023	Р8256 P8256
23009054	1688	26.10.2023	Р0450 P0450
23009057	3228	24.10.2023	ПС 310 PS 310
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)			
23012017	1581	02.10.2023	Польова красуня Polova krasunia
23012026	1591	02.10.2023	Нагорода Nahoroda
23012040	796	02.10.2023	Провіденс Providence
23012041	796	02.10.2023	Базіліо Basilio
23012042	796	02.10.2023	Престанс Prestance
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)			
23019002	2783	18.10.2023	Імператор Imperator
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower			
23039029	1688	23.10.2023	Р63ГЕ189 P63HE189
23039032	1688	24.10.2023	Р64ЛП190 P64LP190
23039035	3228	17.10.2023	ПС-115Е PS-115E
23039036	1985	19.10.2023	Н4Х404 КЛ N4H404 CL
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)			
23040010	912	18.10.2023	Тарту Tartu
23040024	912	18.10.2023	НПЦ22332В NPZ22332W
23040037	807	02.10.2023	Людвіг Ludwig

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean			
23045013	2011	05.10.2023	Аурікула Auricula
23045014	2011	05.10.2023	Акасса Acassa
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet			
21069032	796	31.10.2023	ФД Крампон FD Crampon
Конопля посівні <i>Cannabis sativa</i> L. Hemp			
23080002	2289	02.10.2023	Деметра Demetra
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato			
23088009	2584	17.10.2023	Дейзі Daisy
Капуста червоноголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>rubra</i> DC. Red Cabbage			
23097001	2086	17.10.2023	Тінті Tinty
Цибуля шалот <i>Allium oschaninii</i> O. Fedtsch. Shallot, Grey Shallot			
23107002	1781	24.10.2023	Бонус Bonus
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber			
23110011	1997	17.10.2023	Герміна Hermína
Пастернак <i>Pastinaca sativa</i> L. Parsnip			
23111001	1997	18.10.2023	Камо Kamo
Перець однорічний (солодкий) <i>Capsicum annum</i> L. Sweet Pepper, Paprika			
23113006	1833	03.10.2023	Ред Феррарі Red Ferrari
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato			
23115021	2070	12.10.2023	Галіцено Galíceno
23115023	1730	26.10.2023	Зухраза Zuhrasa
23115024	2529	17.10.2023	Родіон Rodion
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish			
23118002	2086	17.10.2023	Пеніто Pepito
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash			
23148003	1730	03.10.2023	Кефрен Kefren
Турнепс <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs. Turnip Rape			
23178001	971	18.10.2023	ФІНІТО FINITO
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne			
23196002	2440	17.10.2023	ІЗОЛА ISOLA
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry			
22294003	1948	18.10.2023	KIBX413 CIVN413
23294001	3217	18.10.2023	Рубі де Жардін Rubis des Jardins
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry			
23296005	3220	12.10.2023	Черкашаночка Cherkashchanochka
23296006	3220	16.10.2023	Шполяночка Shpolianochka
23296007	3220	16.10.2023	Вітюша Vitiusha

Номер заявки Application number	Заявник (код) Applicant (code)	Дата ухвалення Date of approval	Ухвалена назва сорту Approved variety denomination
Смородина чорна <i>Ribes nigrum</i> L. Black Currant			
23297001	3220	17.10.2023	Кендал Kendal
23297002	3220	17.10.2023	Стрікленд Striklend
23297003	3220	16.10.2023	Крав Krav
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard			
23380001	3223 3224 3225	02.10.2023	КОЗАЧКА KOZACHKA
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (Winter)			
23559003	796	02.10.2023	Ескрім Escrime
Павловнія <i>Paulownia</i> Sieb. et Zucc. Paulownia			
23649002	2692	16.10.2023	ПРОФІ PROFI
Слива верболиста <i>Prunus salicina</i> Lindl. Japanese Plum, Plum			
23672002	3218	31.10.2023	Анджелено 2 Andzheleno 2
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (parental component)			
23900009	2597	16.10.2023	TP23UB646 TR23UW646
23900010	2597	16.10.2023	TB23UB341 TB23UW341
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component			
23909058	1688	31.10.2023	1ПЗУЛ46 1PZUL46
23909059	1688	31.10.2023	1ПЙТИ48 1PJTY48
23909062	1688	31.10.2023	1ПССУ26 1PSSU26
23909066	1688	23.10.2023	1ПДКА37 1PDQA37
23909067	1688	23.10.2023	1ПХ4ЦТД 1PH4CTD
23909069	1688	24.10.2023	1ПХЕИ73 1PHEY73
23909073	1690	24.10.2023	1ПХ4ЦСГ 1PH4CSG
23909074	1690	24.10.2023	1ПВЕВ24 1PWEV24
23909077	1688	31.10.2023	1ПВДЕ32 1PWDE32
23909080	1690	30.10.2023	1ПГИЛ72 1PGYL72
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component			
23939019	2287	16.10.2023	ЄС 121 YeS 121
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component			
23940014	2890	24.10.2023	Сінді КС Cindi CS

Відомості, внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information entered in the State Register of Patents for Plant Varieties

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав на сорт та які внесені до Державного реєстру патентів на сорти рослин

Information on plant varieties, for which a decision on the state registration of the variety and the State Register of Patents for Plant Varieties

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)							
21006001	04.01.2021	230647	30.10.2023	04.01.2021	Аурата Aurata	1581	
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn							
21009001	04.01.2021	230637	30.10.2023	04.01.2021	Буллат херсонський Bulat khersonskyi	3221	
21009002	04.01.2021	230638	30.10.2023	04.01.2021	Дарунок херсонський Darunok khersonskyi	3221	
21009003	05.01.2021	230639	30.10.2023	05.01.2021	Ярик Yaryk	3221	
21009004	05.01.2021	230640	30.10.2023	05.01.2021	Січовий Sichovyi	3221	
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)							
20011003	12.11.2020	230575	06.10.2023	12.11.2020	Вудленд Woodland	2739	
20011004	12.11.2020	230563	06.10.2023	12.11.2020	Фостер Foster	2739	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)							
20012042	02.11.2020	230606	25.10.2023	02.11.2020	Новинка Novynka	2706	
20012043	20.11.2020	230511	02.10.2023	20.11.2020	Носівочка Nosivochka	1990	
21012001	04.01.2021	230607	25.10.2023	04.01.2021	Мізинка Mizynka	1581	
21012002	04.01.2021	230608	25.10.2023	04.01.2021	Малуша Malusha	1581	
21012011	17.03.2021	230539	06.10.2023	17.03.2021	МІП Дарунок MIP Darunok	2859	
21012012	17.03.2021	230540	06.10.2023	17.03.2021	МІП Відзнака MIP Vidznaka	2859	
21012013	17.03.2021	230541	06.10.2023	17.03.2021	МІП Аеліта MIP Aelita	2859	
21012014	17.03.2021	230542	06.10.2023	17.03.2021	МІП Довіра MIP Dovira	2859	
21012015	23.03.2021	230512	02.10.2023	23.03.2021	Загадка одеська Zahadka odeska	1591	
21012016	23.03.2021	230513	02.10.2023	23.03.2021	Вірність одеська Virnist odeska	1591	
21012017	23.03.2021	230514	02.10.2023	23.03.2021	Етуаль Etual	1591	
21012018	23.03.2021	230515	02.10.2023	23.03.2021	Творчість одеська Tvorchist odeska	1591	
21012019	23.03.2021	230516	02.10.2023	23.03.2021	Епітет Epitet	1591	
21012020	23.03.2021	230517	02.10.2023	23.03.2021	Дністрянка одеська Dnistrianka odeska	1591	
21012021	23.03.2021	230518	02.10.2023	23.03.2021	Епіграф Epigraf	1591	
21012023	16.04.2021	230543	06.10.2023	16.04.2021	БХВ20ГВ0009 BNW20GW0009	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21012024	16.04.2021	230544	06.10.2023	16.04.2021	БХВ20ГВ0010 BNW20GW0010	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21012030	18.05.2021	230583	06.10.2023	18.05.2021	Атрибут Attribut	807	
21012032	27.05.2021	230564	06.10.2023	27.05.2021	ЗУ Віллем SU Willem	2513	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21012033	27.05.2021	230565	06.10.2023	27.05.2021	ЗУ Шамаль SU Shamal	1223	
21012034	09.07.2021	230545	06.10.2023	09.07.2021	Джубіло Jubilo	2302	
21012035	09.07.2021	230546	06.10.2023	09.07.2021	Дженіс Jannis	2302	
21012036	09.07.2021	230547	06.10.2023	09.07.2021	Фокс Foxh	2803	
21012038	12.07.2021	230519	02.10.2023	12.07.2021	ФОРСАЙТ FORSAIT	2805 2806	
21012042	28.07.2021	230520	02.10.2023	28.07.2021	Слава Унави Slava Unavy	2610	біюлетень, випуск 9, 2023
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)							
20013003	13.05.2020	230609	25.10.2023	13.05.2020	Танок Tanok	1626	
20013004	13.05.2020	230610	25.10.2023	13.05.2020	Колос Поліський Kolos Poliskyi	1626	
20013006	12.11.2020	230584	06.10.2023	12.11.2020	Бромонт Bromont	2739	
20013008	04.12.2020	230566	06.10.2023	04.12.2020	МІП Веснянка MIP Vesnianka	2859	
22013001	05.01.2022	230567	06.10.2023	05.01.2022	Перібонка Peribonka	2739	
22013003	24.01.2022	230548	06.10.2023	24.01.2022	Сінді CINDY	880 2616	
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)							
21015002	01.02.2021	230597	25.10.2023	01.02.2021	Нива волошкова Nyva voloshkova	1581	
21015009	14.06.2021	230528	06.10.2023	14.06.2021	Рефлектор Reflektor	2258	
21015010	24.06.2021	230598	25.10.2023	24.06.2021	ЗУ Перспектив SU Perspectiv	1900	
21015012	24.06.2021	230599	25.10.2023	24.06.2021	ЗУ Барезі SU Baresi	1900	
Рис посівний <i>Oryza sativa</i> L. Rice							
20017001	23.12.2020	230648	30.10.2023	23.12.2020	Корвет Korvet	3221	біюлетень, випуск 1/2, 2023
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)							
21019007	08.06.2021	230558	06.10.2023	08.06.2021	Тойто Teuto	1797	біюлетень, випуск 9, 2023
21019009	09.07.2021	230559	06.10.2023	09.07.2021	Мелія Melia	2302	
21019010	09.07.2021	230560	06.10.2023	09.07.2021	Румкас Rumcajs	2302	
21019011	09.07.2021	230561	06.10.2023	09.07.2021	Нептун Neptun	947	
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)							
20020008	02.11.2020	230616	25.10.2023	02.11.2020	Генерал Heneral	2706	
20020009	02.11.2020	230617	25.10.2023	02.11.2020	Незламний Nezlamnyi	2706	
20020010	02.11.2020	230618	25.10.2023	02.11.2020	Шубін Shubin	2706	
21020005	03.11.2021	230635	27.10.2023	03.11.2021	Брант Brant	1669	
22020004	24.01.2022	230619	25.10.2023	24.01.2022	Покоління Pokolinnia	2706	
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)							
21022001	01.02.2021	230615	25.10.2023	01.02.2021	Златоуст Zlatoust	1581	
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea							
18023003	29.11.2018	230509	02.10.2023	29.11.2018	Велетень Veleten	1591	
21023001	04.01.2021	230636	30.10.2023	04.01.2021	Аякс Aiaks	1581	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21023005	20.12.2021	230594	25.10.2023	20.12.2021	Оркестра Orchestra	1783	
21023006	20.12.2021	230595	25.10.2023	20.12.2021	Остінато Ostinato	1783	
21023007	20.12.2021	230596	25.10.2023	20.12.2021	Симбіоз Symbios	1783	
22023001	24.01.2022	230526	06.10.2023	24.01.2022	Протін Protin	880	
Вірна промениста (квасоля золотиста, маш) <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek (<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.)							
Mung Bean							
20024001	12.10.2020	230574	06.10.2023	12.10.2020	Бераш Berash	2718	
Квасоля звичайна (зернова) <i>Phaseolus vulgaris</i> L.							
French Bean							
21025001	07.09.2021	230625	27.10.2023	07.09.2021	Садгорянка Sadhorianka	2723	
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L.							
Chick-Pea							
20028001	16.11.2020	230632	27.10.2023	16.11.2020	Октавіус Oktavius	1669	
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill.							
Linseed							
21035001	11.02.2021	230605	25.10.2023	11.02.2021	Ланселот Lanselot	1626	
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i>							
Rape Seed (Winter)							
20040039	08.05.2020	230521	02.10.2023	08.05.2020	Алекс Aleks	1669	
20040040	08.05.2020	230522	02.10.2023	08.05.2020	Юстас Yustas	1669	
21040015	05.04.2021	230568	06.10.2023	05.04.2021	Гумбольдт Humboldt	912	бюлетень, випуск 8, 2023
21040016	05.04.2021	230569	06.10.2023	05.04.2021	Мессі Messi	912	
21040017	05.04.2021	230570	06.10.2023	05.04.2021	Тріатлон Triathlon	912	
21040019	05.04.2021	230571	06.10.2023	05.04.2021	Тринідад Trinidad	912	
21040020	05.04.2021	230572	06.10.2023	05.04.2021	Турбо Turbo	912	бюлетень, випуск 8, 2023
21040022	15.04.2021	230573	06.10.2023	15.04.2021	Резорт Resort	912	
21040025	12.05.2021	230613	25.10.2023	12.05.2021	Марвін Marvin	2547	бюлетень, випуск 8, 2023
21040026	12.05.2021	230614	25.10.2023	12.05.2021	Том Tom	2547	бюлетень, випуск 8, 2023
21040053	09.07.2021	230549	06.10.2023	09.07.2021	Коріда Corida	880	
21040054	09.07.2021	230550	06.10.2023	09.07.2021	Кросбі Crosby	880	
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr.							
Soya Bean							
20045010	03.02.2020	230588	09.10.2023	03.02.2020	ОАЦ Глейз OAC Glaze	2557	бюлетень, випуск 1, 2022
20045012	03.02.2020	230589	09.10.2023	03.02.2020	ОАЦ Баунті OAC Bounty	2557	бюлетень, випуск 1, 2022
20045013	03.02.2020	230590	09.10.2023	03.02.2020	ОАЦ Кенді OATs Kendi	2557	бюлетень, випуск 1, 2022
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC.							
White Cabbage							
21096006	03.08.2021	230623	27.10.2023	03.08.2021	Сплеш болл Splash ball	2813	
21096011	23.12.2021	230624	27.10.2023	23.12.2021	Тайсон Tyson	2086	
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt.							
Sweet Corn							
22103001	05.01.2022	230628	27.10.2023	05.01.2022	Шербет Sherbet	273	
22103002	05.01.2022	230629	27.10.2023	05.01.2022	Фрагман Fragman	273	
22103003	05.01.2022	230630	27.10.2023	05.01.2022	Макарон Macaron	273	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22103004	05.01.2022	230631	27.10.2023	05.01.2022	МУСС MOUSSE	273	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber							
23110009	11.08.2023	230579	06.10.2023	11.08.2023	Фенікс де Люкс Feniks de Liuks	1163	
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon							
22146003	22.02.2022	230621	27.10.2023	22.02.2022	Чарльстон Грей Делюкс Charlston Hrei Deliuxs	1163	
22146004	22.02.2022	230622	27.10.2023	22.02.2022	Грей Белле Hrei Belle	1163	
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover							
20155003	29.09.2020	230603	25.10.2023	29.09.2020	Оплески Oplesky	1626	
20155004	15.10.2020	230626	27.10.2023	15.10.2020	Андріана Andriana	1946	
20155005	26.11.2020	230627	27.10.2023	26.11.2020	Атлант Носівський Atlant Nosivskyi	1990	
23155001	06.09.2023	230529	06.10.2023	06.09.2023	МЕЛІФОР MELIFOR	3227	
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)							
21177002	02.11.2021	230620	27.10.2023	02.11.2021	Пірит Piryt	1669	
21177003	23.11.2021	230510	02.10.2023	23.11.2021	Нітро Nitro	2805 2806	
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne							
23196001	06.09.2023	230531	06.10.2023	06.09.2023	МЕДИСАН MEDISAN	3227	
Еспарцет виколистий <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin							
23234001	06.09.2023	230527	06.10.2023	06.09.2023	ВАЛЛОР VALLOR	3227	
Льон звичайний (озимий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed							
21249001	09.07.2021	230604	25.10.2023	09.07.2021	ЛСЛ 1133 LSL 1133	2804	
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear							
20258003	07.12.2020	230586	09.10.2023	07.12.2020	Чарівниця Charivnytsia	2314	бюлетень, випуск 1, 2022
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum							
20261006	07.12.2020	230587	09.10.2023	07.12.2020	Престиж Prestyzh	2314	бюлетень, випуск 1, 2022
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple							
19263003	22.10.2019	230591	09.10.2023	22.10.2019	Дебют Debiut	2314	
Агрис звичайний <i>Ribes uva-crispa</i> L. Gooseberry							
23295001	01.02.2023	230523	06.10.2023	01.02.2023	Кам'яніград Kam'ianhrad	1601	
23295002	01.02.2023	230524	06.10.2023	01.02.2023	Петрівка Petrivka	1601	
23295003	01.02.2023	230525	06.10.2023	01.02.2023	Холодний яр Kholodnyi yar	1601	
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry							
23296001	15.05.2023	230562	06.10.2023	15.05.2023	ПШЕХИБА PRZEHYBA	2835	бюлетень, випуск 9, 2023
Актинідія пурпурова x актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. x <i>Actinidia arguta</i> Planch. Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit							
23368002	12.04.2023	230576	06.10.2023	12.04.2023	Фортуна Fortuna	348	
23368003	12.04.2023	230577	06.10.2023	12.04.2023	Галаретка Halaretka	348	

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard							
23380001	01.09.2023	230578	06.10.2023	01.09.2023	КОЗАЧКА KOZACHKA	3223 3224 3225	
Люпин вузьколистий <i>Lupinus angustifolius</i> L. Blue Lupin							
21403001	22.11.2021	230530	06.10.2023	22.11.2021	Ілдіго Ildigo	2258	
Васильки справжні <i>Ocimum basilicum</i> L. Basil							
23464001	03.05.2023	230592	25.10.2023	03.05.2023	Грек Greek	1163	бюлетень, випуск 9, 2023
23464002	03.05.2023	230593	25.10.2023	03.05.2023	Пурпле Purple	1163	бюлетень, випуск 9, 2023
Індау посівний <i>Eruca sativa</i> Mill. Arugula, Rocket, Rucola							
23500001	09.05.2023	230602	25.10.2023	09.05.2023	Фаворит Favoryt	1163	бюлетень, випуск 9, 2023
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush							
22548001	20.12.2022	230585	06.10.2023	20.12.2022	Різдвяна зірочка Rizdviana zirochka	348	
Ячмінь звичайний (дворучка) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (both winter and spring sowing)							
20612001	01.12.2020	230633	27.10.2023	01.12.2020	Русин Rusyn	1591	
20612002	01.12.2020	230634	27.10.2023	01.12.2020	Еволюція Evoliutsiia	1591	
Тритикале (дворучка) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (both winter and spring sowing)							
21622001	16.01.2021	230557	06.10.2023	16.01.2021	Єроп Yehor	2610	
Пшениця туранська <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turanicum</i> (Jakubz.) A. Love & D. Love Khorassan wheat; Oriental wheat							
21663001	06.01.2021	230611	25.10.2023	06.01.2021	Сармат Sarmat	2706	
21663002	03.02.2021	230612	25.10.2023	03.02.2021	Пектораль Pektoral	2706	
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula							
23680001	12.05.2023	230580	06.10.2023	12.05.2023	Чумацький Шлях Chumatskyi Shliakh	348	
23680003	12.05.2023	230582	06.10.2023	12.05.2023	Веснянка Vesnianka	348	
23680002	15.05.2023	230581	06.10.2023	15.05.2023	Лісова пісня Lisova pisnia	348	
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (parental component)							
21900001	16.04.2021	230532	06.10.2023	16.04.2021	TP20ГВ607 TR20GW607	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21900002	16.04.2021	230533	06.10.2023	16.04.2021	ТБ19ГВ303 TB19GW303	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21900003	16.04.2021	230534	06.10.2023	16.04.2021	ТА19ГВ003 TA19GW003	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21900004	16.04.2021	230535	06.10.2023	16.04.2021	ТБ19ГВ304 TB19GW304	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21900005	16.04.2021	230536	06.10.2023	16.04.2021	ТА20ГВ005 TA20GW005	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21900006	16.04.2021	230537	06.10.2023	16.04.2021	ТБ20ГВ305 TB20GW305	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
21900007	16.04.2021	230538	06.10.2023	16.04.2021	ТА19ГВ004 TA19HV004	2597	бюлетень, випуск 9, 2023
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component							
21909002	04.01.2021	230641	30.10.2023	04.01.2021	ХН 3816 KhN 3816	3221	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21909003	04.01.2021	230642	30.10.2023	04.01.2021	ХН 5416 KhN 5416	3221	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21909004	04.01.2021	230643	30.10.2023	04.01.2021	ХН 1616 KhN 1616	3221	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21909005	04.01.2021	230644	30.10.2023	04.01.2021	ХН 4616 KhN 4616	3221	бюлетень, випуск 1/2, 2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Дата реєстрації прав Date of rights registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21909006	04.01.2021	230645	30.10.2023	04.01.2021	XH 2316 KhN 2316	3221	білетень, випуск 1/2, 2023
21909007	04.01.2021	230646	30.10.2023	04.01.2021	XH 1116 KhN 1116	3221	білетень, випуск 1/2, 2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component							
21915009	24.06.2021	230600	25.10.2023	24.06.2021	Л2177ПхЛ2184Н L2177РkhL2184N	1900	
21915010	24.06.2021	230601	25.10.2023	24.06.2021	ХЮР035 HYR035	1900	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component							
20939035	03.02.2020	230551	06.10.2023	03.02.2020	7ПВДХ67Б 7РWDН67В	1688	
20939177	28.12.2020	230552	06.10.2023	28.12.2020	ПХ1032Б РН1032В	1688 1690	
21939035	10.11.2021	230553	06.10.2023	10.11.2021	7ПУГК32Р 7РUGQ32R	1688	
21939036	10.11.2021	230554	06.10.2023	10.11.2021	7ПВЛХ62Р 7РWLН62R	1688	
21939043	10.11.2021	230555	06.10.2023	10.11.2021	7ПУХД10Б 7РUHD10В	1688	
21939044	10.11.2021	230556	06.10.2023	10.11.2021	7ПУКЦ97Б 7РUKC97В	1688	

Відомості щодо виданих патентів на сорти рослин, їх завірених копій та дублікати

Information on issued patents for plant varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
20011003	12.11.2020	230575	Вудленд Woodland	2739	12.10.2023
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
20012039	12.08.2020	230506	ЮСОН YuSON	1751	12.10.2023
20012040	12.08.2020	230507	Сонцедар Sontsedar	1751	12.10.2023
20012041	19.08.2020	230508	Гусар Husar	1751	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230539	МІП Дарунок MIP Darunok	2859	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230540	МІП Відзнака MIP Vidznaka	2859	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230541	МІП Аеліта MIP Aelita	2859	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230542	МІП Довіра MIP Dovira	2859	12.10.2023
21012015	23.03.2021	230512	Загадка одеська Zahadka odeska	1591	12.10.2023
21012016	23.03.2021	230513	Вірність одеська Virnist odeska	1591	12.10.2023
21012017	23.03.2021	230514	Етуаль Etual	1591	12.10.2023
21012018	23.03.2021	230515	Творчість одеська Tvorchist odeska	1591	12.10.2023
21012020	23.03.2021	230517	Дністрянка одеська Dnistrianka odeska	1591	12.10.2023
21012021	23.03.2021	230518	Епіграф Epihraf	1591	12.10.2023
21012023	16.04.2021	230543	БХВ20ГВ0009 BHW20GW0009	2597	20.10.2023
21012030	18.05.2021	230583	Атрибут Attribut	807	18.10.2023
21012032	27.05.2021	230564	ЗУ Віллем SU Willem	2513	18.10.2023
21012034	09.07.2021	230545	Джубіло Jubilo	2302	18.10.2023
21012035	09.07.2021	230546	Дженіс Jannis	2302	18.10.2023
21012036	09.07.2021	230547	Фокс Foxx	2803	18.10.2023
21012038	12.07.2021	230519	ФОРСАЙТ FORSAIT	2805 2806	12.10.2023
21012040	22.07.2021	230485	Пам'яті Горлача Pam'iatl Horlacha	1635 1097	17.10.2023
21012041	22.07.2021	230486	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	1635 1097	17.10.2023
21012042	28.07.2021	230520	Слава Унави Slava Unavy	2610	12.10.2023
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
20013006	12.11.2020	230584	Бромонт Bromont	2739	12.10.2023
20013008	04.12.2020	230566	МІП Веснянка MIP Vesnianka	2859	12.10.2023
22013001	05.01.2022	230567	Перібонка Peribonka	2739	12.10.2023
22013003	24.01.2022	230548	Сінді CINDY	880	2616
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
21015001	25.01.2021	230499	Хлібна нива Khlibna nyva	1751	12.10.2023
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
21019009	09.07.2021	230559	Мелія Melia	2302	18.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21019010	09.07.2021	230560	Румкас Rumcajs	2302	18.10.2023
21019011	09.07.2021	230561	Нептун Neptun	947	18.10.2023
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
18023003	29.11.2018	230509	Велетень Veleten	1591	12.10.2023
22023001	24.01.2022	230526	Протін Protin	880	18.10.2023
Вігна промениста (квасоля золотиста, маш) <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek (<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.) Mung Bean					
20024001	12.10.2020	230574	Бераш Berash	2718	18.10.2023
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea					
21028001	19.04.2021	230503	Альбатрос Albatros	2796	12.10.2023
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
20040039	08.05.2020	230521	Алекс Aleks	1669	25.10.2023
20040040	08.05.2020	230522	Юстас Yustas	1669	25.10.2023
20040060	16.09.2020	230487	Майбах Maibakh	2666	12.10.2023
20040061	16.09.2020	230488	Торус Torus	2666	12.10.2023
20040062	16.09.2020	230489	Квант Kvant	2666	12.10.2023
20040066	28.10.2020	230476	Скай Skaï	1702	04.10.2023
20040074	08.12.2020	230490	АМАЗЗОНІТ AMAZZONITE	1783	18.10.2023
21040015	05.04.2021	230568	Гумбольдт Humboldt	912	18.10.2023
21040016	05.04.2021	230569	Мессі Messi	912	18.10.2023
21040017	05.04.2021	230570	Тріатлон Triathlon	912	18.10.2023
21040019	05.04.2021	230571	Тринідад Trinidad	912	18.10.2023
21040020	05.04.2021	230572	Турбо Turbo	912	18.10.2023
21040022	15.04.2021	230573	Резорт Resort	912	18.10.2023
21040027	18.05.2021	230445	Ромео Romeo	807	18.10.2023
21040028	18.05.2021	230446	Кондор Condor	807	18.10.2023
21040029	18.05.2021	230447	Десперадо Desperado	807	18.10.2023
21040030	18.05.2021	230448	Юрек Jurek	807	18.10.2023
21040031	20.05.2021	230449	Пірол Pirol	807	18.10.2023
21040032	20.05.2021	230450	Даззлер Dazzler	807	18.10.2023
21040033	20.05.2021	230451	ІНВ 2020 INV 2020	807	18.10.2023
21040049	14.06.2021	230491	РЖТ ПАРАДАЙЗЗ RGT PARADIZZE	1783	18.10.2023
21040052	18.05.2021	230452	Фамулус Famulus	807	18.10.2023
21040053	09.07.2021	230549	Коріда Corida	880	18.10.2023
21040054	09.07.2021	230550	Кросбі Crosby	880	18.10.2023
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
20045010	03.02.2020	230588	ОАЦ Глейз OAC Glaze	2557	13.10.2023
20045012	03.02.2020	230589	ОАЦ Баунті OAC Bounty	2557	13.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
20045013	03.02.2020	230590	ОАЦ Кенді OATs Kendi	2557	13.10.2023
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
22069006	12.12.2022	230478	СМАРТ ЕВІТА КВС SMART EVITA KWS	2649	12.10.2023
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
23110009	11.08.2023	230579	Фенікс де Люкс Feniks de Liuks	1163	12.10.2023
Часник <i>Allium sativum</i> L. Garlic					
21129001	09.06.2021	230288	Золочівський замок Zolochivskyi zamok	2594	12.10.2023
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
23155001	06.09.2023	230529	МЕЛІФОР MELIFOR	3227	11.10.2023
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
21177003	23.11.2021	230510	Нітро Nitro	2805 2806	12.10.2023
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
23196001	06.09.2023	230531	МЕДІСАН MEDISAN	3227	11.10.2023
Еспарцет виколистий <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin					
23234001	06.09.2023	230527	ВАЛЛОР VALLOR	3227	11.10.2023
Агрис звичайний <i>Ribes uva-crispa</i> L. Gooseberry					
23295001	01.02.2023	230523	Кам'яніград Kam'ianhrad	1601	25.10.2023
23295002	01.02.2023	230524	Петрівка Petrivka	1601	25.10.2023
23295003	01.02.2023	230525	Холодний яр Kholodnyi yar	1601	25.10.2023
Малина <i>Rubus idaeus</i> L. Raspberry					
23296001	15.05.2023	230562	ПШЕХИБА PRZEHYBA	2835	12.10.2023
Смородина чорна <i>Ribes nigrum</i> L. Black Currant					
22297001	02.09.2022	230459	Єдність Yednist	1601	25.10.2023
22297002	02.09.2022	230460	Мережка Merezhka	1601	25.10.2023
22297003	02.09.2022	230461	Чорний десерт Chornyi desert	1601	25.10.2023
22297004	02.09.2022	230462	Дебют Debiut	1601	25.10.2023
22297005	02.09.2022	230463	Вечорниця Vechornytsia	1601	25.10.2023
22297006	02.09.2022	230464	Сіана Siana	1601	25.10.2023
22297007	02.09.2022	230465	Кіра Kira	1601	25.10.2023
Півники <i>Iris</i> L. Iris					
22322004	05.12.2022	230504	Казантип Kazantyp	2075	10.10.2023
22322005	05.12.2022	230481	Дежавю Dezhaviu	2075	12.10.2023
22322006	05.12.2022	230505	Серпанок Serpanok	2075	10.10.2023
Канна індійська <i>Canna indica</i> L. Canna					
22324004	05.12.2022	230480	Адажіо Adazhio	2075	12.10.2023
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
21339003	01.04.2021	230458	Доропріпер Doropriper	2441	02.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
22339006	05.12.2022	230492	Олександра Oleksandra	2075	12.10.2023
Актинідія пурпурова x актинідія гостра Actinidia purpurea Rehd. x Actinidia arguta Planch. Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit					
23368002	12.04.2023	230576	Фортуна Fortuna	348	27.10.2023
23368003	12.04.2023	230577	Галаретка Halaretka	348	27.10.2023
Гірчиця біла Sinapis alba L. White Mustard					
23380001	01.09.2023	230578	КОЗАЧКА KOZACHKA	3223 3224 3225	
Лілійник гібридний Hemerocallis hybrida hort. Daylily Hybrid					
22498002	05.12.2022	230502	Оріон Orion	2075	10.10.2023
Монарда гібридна Monarda x hybrida hort. Bee Balm Hybrid					
22534001	20.12.2022	230326	Кияночка Kyianochka	348	04.10.2023
Чорнушка дамаська Nigella damascena L. Devil-in-a-bush					
22548001	20.12.2022	230585	Різдвяна зірочка Rizdviana zirochka	348	27.10.2023
Тритикале (дворучка) Triticosecale Witt. Triticale (both winter and spring sowing)					
21622001	16.01.2021	230557	Єгор Yehor	2610	12.10.2023
Ожина Rubus subgenus Eubatus sect. Moriferi & Ursini Blackberry, Loganberry, Boysenberry					
19631001	31.01.2019	230292	АПФ 190Т APF 190T	2499	02.10.2023
Полин д'Апрі Artemisia argyi H. Lev. & Vanion Chinese mugwort					
22671001	20.12.2022	230327	Срібне мереживо Sribne merezhyvo	348	04.10.2023
Первоцвіт Primula L. Auricula					
23680001	12.05.2023	230580	Чумацький Шлях Chumatskyi Shliakh	348	27.10.2023
23680002	15.05.2023	230581	Лісова пісня Lisova pisnia	348	27.10.2023
23680003	12.05.2023	230582	Веснянка Vesnianka	348	27.10.2023
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) Triticum aestivum L. Soft Wheat (Winter) (parental component)					
21900001	16.04.2021	230532	TP20ГВ607 TR20GW607	2597	20.10.2023
21900002	16.04.2021	230533	ТБ19ГВ303 TB19GW303	2597	20.10.2023
21900003	16.04.2021	230534	ТА19ГВ003 TA19GW003	2597	20.10.2023
21900004	16.04.2021	230535	ТБ19ГВ304 TB19GW304	2597	20.10.2023
21900005	16.04.2021	230536	ТА20ГВ005 TA20GW005	2597	20.10.2023
21900006	16.04.2021	230537	ТБ20ГВ305 TB20GW305	2597	20.10.2023
21900007	16.04.2021	230538	ТА19ГВ004 TA19HV004	2597	20.10.2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент Secale cereale L. Rye (Winter) – parental component					
21915001	25.01.2021	230500	Л204А L204A	1751	12.10.2023
21915002	25.01.2021	230501	Колосисте Kolosyste	1751	12.10.2023
Соняшник однорічний – батьківський компонент Helianthus annuus L. Sunflower – parental component					
20939035	03.02.2020	230551	7ПВДХ67Б 7PWDH67B	1688	18.10.2023
20939177	28.12.2020	230552	ПХ1032Б PH1032B	1688 1690	18.10.2023
21939035	10.11.2021	230553	7ПУГК32Р 7PUGQ32R	1688	18.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер патенту Number of patent	Назва сорту Variety denomination	Володілець патенту (код) Patent owner (code)	Дата видачі Date of granting
21939036	10.11.2021	230554	7ПВЛХ62Р	1688	18.10.2023
21939043	10.11.2021	230555	7РВЛН62Р	1688	18.10.2023
21939044	10.11.2021	230556	7ПУХД10Б 7РУНД10В 7ПУКЦ97Б 7РУКС97В	1688	18.10.2023
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus L. oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
20940013	27.10.2020	230477	К1Ф0А09 К1F0А09	1702	04.10.2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Notifications listed in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine

Відомості про сорти рослин, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію сорту та які внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on varieties of plants for which a decision was made on state registration of the variety and which are included in the State Register of varieties of plants suitable for distribution in Ukraine

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)						
21006001	05.10.2023	04.01.2021	Аурата Aurata	1581	1581	
23006001	18.10.2023	19.01.2023	Відеодур Videodur	1564	1564	
23006006	24.10.2023		БЕРІНГ BERING	2440	2440	
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn						
21009128	10.10.2023	16.12.2021	ЛІД2210Ц LID2210C	2890	2890	
21009139	10.10.2023	16.12.2021	ЕС КАРУ ES KARRU	2890	2890	
21009141	10.10.2023	16.12.2021	ЕС МІДВЕЙ ES MIDWAY	2890	2890	
21009142	24.10.2023	17.12.2021	ЛІД2020Ц LID2020C	2890	2890	
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)						
20011003	10.10.2023	12.11.2020	Вудленд Woodland	2739	2739	
20011004	10.10.2023	12.11.2020	Фостер Foster	2739	2739	
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)						
19012079	12.10.2023	30.07.2019	Євразія Yevraziia	1571	1571	
20012039	02.10.2023	12.08.2020	ЮСОН YuSON	1751	1751	бюлетень, випуск 9, 2023
20012040	02.10.2023	12.08.2020	Сонцедар Sontsedar	1751	1751	бюлетень, випуск 9, 2023
20012041	02.10.2023	19.08.2020	Гусар Husar	1751	1751	бюлетень, випуск 9, 2023
20012042	19.10.2023	02.11.2020	Новинка Novynka	2706	2706	
20012043	02.10.2023	20.11.2020	Носівочка Nosivochka	1990	1990	
20012044	16.10.2023	03.12.2020	НОВІК NOVIC	2653	485	
20012045	16.10.2023	03.12.2020	Соліфлор КС SOLIFLOR CS	2653	485	
21012001	02.10.2023	04.01.2021	Мізинка Mizynka	1581	1581	
21012002	02.10.2023	04.01.2021	Малуша Malusha	1581	1581	
21012003	10.10.2023	15.02.2021	Біла Bila	355	355	
21012004	10.10.2023	15.02.2021	Трояна Troiana	355	355	
21012005	10.10.2023	15.02.2021	Київська 22 Kyivska 22	355	355	
21012006	10.10.2023	15.02.2021	Синтетик 240 Syntetyk 240	355	355	
21012007	10.10.2023	18.02.2021	ЛГ Оптиміст LG Optimist	793	793	бюлетень, випуск 9, 2023

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21012010	10.10.2023	24.02.2021	Бісквіт Biskvit	2783	2783	
21012011	02.10.2023	17.03.2021	МІП Дарунок MIP Darunok	1589	2859	
21012012	02.10.2023	17.03.2021	МІП Відзнака MIP Vidznaka	1589	2859	
21012013	02.10.2023	17.03.2021	МІП Аеліта MIP Aelita	1589	2859	
21012014	02.10.2023	17.03.2021	МІП Довіра MIP Dovira	1589	2859	
21012015	05.10.2023	23.03.2021	Загадка одеська Zahadka odeska	1591	1591	
21012016	05.10.2023	23.03.2021	Вірність одеська Virnist odeska	1591	1591	
21012017	05.10.2023	23.03.2021	Етуаль Etual	1591	1591	
21012018	05.10.2023	23.03.2021	Творчість одеська Tvorchist odeska	1591	1591	
21012019	05.10.2023	23.03.2021	Епітет Epitet	1591	1591	
21012020	05.10.2023	23.03.2021	Дністрянка одеська Dnistrianka odeska	1591	1591	
21012021	05.10.2023	23.03.2021	Епіграф Epihraf	1591	1591	
21012030	10.10.2023	18.05.2021	Атрибут Attribut	807	807	
21012038	02.10.2023	12.07.2021	ФОРСАЙТ FORSAIT	2805 2806	2805 2806	
21012040	05.10.2023	22.07.2021	Пам'яті Горлача Pam'iat Horlacha	1635 2626	1635 1097	бюлетень, випуск 9, 2023
21012041	05.10.2023	22.07.2021	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	1635 2626	1635 1097	бюлетень, випуск 9, 2023
23012001	05.10.2023	09.01.2023	СОЕСКІ SOESKI	2890	2890	
23012039	24.10.2023	22.09.2023	Селебріті Celebrity	796	796	
23012040	24.10.2023	22.09.2023	Провіденс Providence	796	796	
23012041	24.10.2023	22.09.2023	Базіліо Basilio	796	796	
23012042	24.10.2023	22.09.2023	Престанс Prestance	796	796	
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)						
20013003	19.10.2023	13.05.2020	Танок Tanok	1626	1626	
20013004	19.10.2023	13.05.2020	Колос Поліський Kolos Poliskyi	1626	1626	
20013008	02.10.2023	04.12.2020	МІП Веснянка MIP Vesnianka	1589	2859	
20013012	10.10.2023	21.12.2020	Реліквія Relikviia	2753 2754 2755 2756 2753	2757 2754 2755 2756 2757	
22013001	10.10.2023	05.01.2022	Перібонка Peribonka	2739	2739	
22013002	12.10.2023	06.01.2022	ІС ЯРІЕЛЛА IS JARIELLA	2858	2858	
22013003	19.10.2023	24.01.2022	Сінді CINDY	2076 2616	880 2616	
Просо посівне <i>Panicum miliaceum</i> L. Common Millet						
21014001	05.10.2023	04.01.2021	Переможне Peremozhne	1581	1581	бюлетень, випуск 5, 2023
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)						
21015001	02.10.2023	25.01.2021	Хлібна нива Khibna nyva	1751	1751	бюлетень, випуск 9, 2023
21015002	02.10.2023	01.02.2021	Нива волошкова Nyva voloshkova	1581	1581	
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum						
23018001	24.10.2023		ЗЕАЛАНДІЯ ZEALANDIA	2890	2890	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)						
21019001	10.10.2023	24.02.2021	Тур Tur	2783	2783	
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)						
20020008	19.10.2023	02.11.2020	Генерал Heneral	2706	2706	
20020009	19.10.2023	02.11.2020	Незламний Nezlamnyi	2706	2706	
20020010	19.10.2023	02.11.2020	Шубін Shubin	2706	2706	
21020005	10.10.2023	03.11.2021	Брант Brant	1669	1669	
22020001	12.10.2023	06.01.2022	ІС МАЛТИГО IS MALTIGO	2858	2858	
22020004	19.10.2023	24.01.2022	Покоління Pokolinnia	2706	2706	
22020008	19.10.2023	24.01.2022	Ювента Juvanta	2302	2302	
22020009	19.10.2023	24.01.2022	Тася Tasja	2302	2302	
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)						
21022001	02.10.2023	01.02.2021	Златоуст Zlatoust	1581	1581	
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea						
18023003	05.10.2023	29.11.2018	Велетень Veleten	1591	1591	
21023001	02.10.2023	04.01.2021	Аякс Aiaks	1581	1581	
22023001	19.10.2023	24.01.2022	Протін Protin	2076	880	
Вігна промениста (квасоля золотиста, маш) <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek (<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.) Mung Bean						
20024001	10.10.2023	12.10.2020	Бераш Berash	2718	2718	
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea						
20028001	24.10.2023	16.11.2020	Октавіус Oktavius	1669	1669	
Льон низький (олійний, кудряш) <i>Linum humile</i> Mill. Linseed						
21035001	19.10.2023	11.02.2021	Ланселот Lanselot	1626	1626	
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower						
20039050	05.10.2023	06.11.2020	Ірінасол Irinasol	1498	1498	
21039083	31.10.2023	17.12.2021	ЕС ГАМА ES GAMA	2890	2890	
21039087	31.10.2023	17.12.2021	ЛІД1015Л СУ LID1015L SU	2890	2890	
21039088	18.10.2023	17.12.2021	ІНСАН 288 КЛП INSUN 288 CLP	2890	2890	
21039090	31.10.2023	17.12.2021	1047 Л КЛП 1047 L CLP	2890	2890	
21039091	18.10.2023	17.12.2021	ІНСАН 299 СУ INSUN 299 SU	2890	2890	
21039105	18.10.2023	28.12.2021	1018Л КЛП 1018L CLP	2890	2890	
22039018	05.10.2023	11.11.2022	Софіасол Sofiasol	1498	1498	
22039035	24.10.2023	22.11.2022	Н5Х493 КЛ N5H493 CL	1985	1985	
22039058	10.10.2023	19.12.2022	СТАРФАЕР STARFIRE	2720	2720	
23039002	12.10.2023		КСІЛО XILO	2440	2440	
23039003	31.10.2023	06.01.2023	НЕМО NEMO	2440	2440	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
23039010	18.10.2023	13.01.2023	ІНСАН 120 INSUN 120	2890	2890	
23039012	10.10.2023	13.01.2023	6027Л КЛП 6027L CLP	2890	2890	
23039014	10.10.2023	13.01.2023	Інсан 277 СУ Insun 277 SU	2890	2890	
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)						
20040039	10.10.2023	08.05.2020	Алекс Aleks	1669	1669	
20040040	10.10.2023	08.05.2020	Юстас Yustas	1669	1669	
21040027	10.10.2023	18.05.2021	Ромео Romeo	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040028	10.10.2023	18.05.2021	Кондор Condor	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040029	10.10.2023	18.05.2021	Десперадо Desperado	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040030	10.10.2023	18.05.2021	Юрек Jurek	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040031	10.10.2023	20.05.2021	Пірол Pirol	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040032	10.10.2023	20.05.2021	Даззлер Dazzler	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040033	10.10.2023	20.05.2021	ІНВ 2020 INV 2020	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
21040052	10.10.2023	18.05.2021	Фамулус Famulus	807	807	бюлетень, випуск 9, 2023
22040032	05.10.2023	30.04.2022	Янош Janosh	912	912	
23040048	05.10.2023	17.08.2023	Рамзес Ramses	2851	2851	
Ріпак (ярий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Spring)						
21041003	31.10.2023	21.12.2021	ІНВ300 КЛ ПС INV300 CL PS	2602	2602	
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean						
21045024	31.10.2023	17.12.2021	ЛІД Конструктор LID Constructor	2890	2890	
21045026	31.10.2023	17.12.2021	ЛІД Промотор LID Promotor	2890	2890	
22045026	18.10.2023	11.11.2022	Аннабелла Annabella	1498	1498	
23045013	31.10.2023	27.09.2023	Аурикула Auricula	2011	2011	
23045014	31.10.2023		Акасса Acassa	2011	2011	
Тополя <i>Populus</i> L. Poplar						
22086001	24.10.2023		Макс-4 Max-4	2888	2888	
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato						
20088001	24.10.2023	02.01.2020	АЛВЕРСТОН РАССЕТ Alverstone Russet	2660	2660	
20088002	24.10.2023	02.01.2020	Санред Sunred	2660	2660	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20088007	24.10.2023	02.01.2020	ТРАЙПЛ7 TRIPLE7	2660	2660	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20088009	24.10.2023	02.01.2020	Тайгер Tiger	2660	2660	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20088024	24.10.2023		Коразон Corazon	1652	1652	
20088025	24.10.2023		СПЕКТРА SPECTRA	1652	1652	
20088026	24.10.2023	30.12.2020	Камелія CAMELIA	2660	2660	бюлетень, випуск 1/2, 2023
20088027	24.10.2023	30.12.2020	Кардіма CARDYMA	2660 2765	2660 2765	бюлетень, випуск 1/2, 2023
21088004	24.10.2023	26.10.2021	Роксоланівська Roksolanivska	2828	2828	
23088009	18.10.2023	11.10.2023	Дейзі Daisy	2584	2584	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Баклажан <i>Solanum melongena</i> L. Egg Plant						
22093005	24.10.2023		МІРАБЕЛЬ MIRABELLE	1852	1852	
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage						
21096006	19.10.2023	03.08.2021	Сплеш болл Splash ball	2813	2813	
21096007	24.10.2023	09.09.2021	Ельза Elza	2819	2819	
21096011	19.10.2023	23.12.2021	Тайсон Tyson	2086	2086	
22096002	19.10.2023	18.01.2022	Кората Korata	2841	2841	
22096004	31.10.2023	08.02.2022	Кабінет Kabinet	1997	1997	
23096005	12.10.2023		МАРЛУ MARLOO	1833	1833	
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower						
21101002	31.10.2023		ЕЛЕКТРА ELECTRA	1050	1050	
21101004	31.10.2023		КЛЕМЕНТИН CLEMENTINE	1050	1050	
21101005	31.10.2023		ДЕПУРПЛ DEPURPLE	2643	1219	
23101004	12.10.2023	05.09.2023	ВАЙТОН WHITON	1833	1833	
23101005	12.10.2023		АЛСТОН ALSTON	1833	1833	
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn						
21103005	31.10.2023		НІКОЛЬ NICOLE	2087	2662	
21103008	24.10.2023		ПАССІОН PASSION	2522	744	
21103009	24.10.2023	01.12.2021	ВІЛЛІНГЕР WILLINGER	1852	1852	
21103010	24.10.2023	14.12.2021	Мегаза Megaza	2841	2841	
22103001	24.10.2023	05.01.2022	Шербет Sherbet	273	273	
22103002	24.10.2023	05.01.2022	Фрагман Fragman	273	273	
22103003	24.10.2023	05.01.2022	Макарон Macaron	273	273	
22103004	24.10.2023	05.01.2022	МУСС MOUSSE	273	273	
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion						
20106006	24.10.2023	10.11.2020	АЛМАНЗОРО ALMANZORO	1852	1852	
21106001	24.10.2023	04.02.2021	Саратога Saratoga	2529	1418	
21106005	19.10.2023	14.12.2021	Болбул Bolbul	2841	2841	
22106002	24.10.2023		Редровер Redrover	2086	2086	
22106005	24.10.2023	01.12.2011	СВ4774НВ SV4774NW	1852	1852	
22106006	24.10.2023		Фасто Fasto	2086	2086	
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot						
21109002	24.10.2023	09.09.2021	Нью Курода АС New Kuroda AS	2819	2819	
21109006	19.10.2023	30.12.2021	Карлав Karlav	2841	2841	
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber						
20110012	24.10.2023	10.11.2020	БРАНДІНО BRANDINO	1852	1852	
21110009	24.10.2023	22.11.2021	Дієз Diyez	1730	1730	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
22110011	10.10.2023	29.12.2022	Проскор Proscore	753	753	бюлетень, випуск 9, 2023
23110007	10.10.2023	03.08.2023	Фрайзер Fraser	1833	1833	
23110009	10.10.2023	11.08.2023	Фенікс де Люкс Feniks de Liuks	1163	1163	
23110010	05.10.2023		Маркетмор 70 Marketmore 70	1163		
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato						
21115016	31.10.2023		ХМ 9903 НМ 9903	2662	2662	
21115017	31.10.2023		ХМ 5900 НМ 5900	2662	2662	
21115034	24.10.2023	30.11.2021	ИНЦИПІТ INCIPIT	1852	1852	
22115019	10.10.2023	29.12.2022	Дрімболл Dreamboll	753	753	бюлетень, випуск 9, 2023
22115020	10.10.2023	29.12.2022	Геліказ Helicaz	753	753	бюлетень, випуск 9, 2023
23115014	02.10.2023	07.06.2023	Хібачі Hibachi	1730	1730	
23115020	12.10.2023		Керо Kero	2088	2088	
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish						
21118007	19.10.2023	22.12.2021	Радіс Radis	2841	2841	
21118008	19.10.2023	30.12.2021	Марвіс Marvis	2841	2841	
22118001	10.10.2023		Експо Expo	2813	2813	
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean						
20127009	31.10.2023	17.12.2020	ЕСКАДРОН ESCADRON	2644	1959	
22127001	24.10.2023		Контада Contada	1960	1960	
22127002	24.10.2023		Крома Croma	1960	1960	
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach						
23130001	12.10.2023		АПОЛЛО APOLLO	1833	1833	
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage						
23135001	12.10.2023	05.09.2023	КІСЕКІ KISEKI	1833	1833	
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon						
20146011	24.10.2023	10.11.2020	СВ3807BT SV3807WT	1852	1852	
20146012	24.10.2023	10.11.2020	ГРІН ДЖАР GREEN JAR	1852	1852	
21146006	24.10.2023	09.09.2021	Жако Zhako	2819	2819	
22146002	19.10.2023	07.02.2022	Медун Medun	2841	2841	
22146003	24.10.2023	22.02.2022	Чарльстон Грей Делюкс Charlston Hrei Deliuxs	1163	1163	
22146004	24.10.2023	22.02.2022	Грей Белле Hrei Belle	1163	1163	
22146005	31.10.2023		ЄЛОВ ЛАВ YELLOW LOVE	2020	2020	
22146006	31.10.2023		АМІНА AMINA	2662	2020	
22146009	24.10.2023	01.12.2022	БРІКСБЕРРІ BRYXBERRY	1852	1852	
Диня звичайна <i>Cucumis melo</i> L. Melon						
22147001	19.10.2023	07.02.2022	Мегарин Megarin	2841	2841	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash						
21148002	24.10.2023	09.09.2021	Еклер Ekler	2819	2819	
22148001	19.10.2023	18.01.2022	Контак Kontak	2841	2841	
23148002	10.10.2023	01.08.2023	Імператор Imperator	1833	1833	
23148003	12.10.2023	26.09.2023	Кефрен Kefren	1730	1730	
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover						
20155002	31.10.2023	23.06.2020	Любава Liubava	1658	1658	
20155003	19.10.2023	29.09.2020	Оплески Oplesky	1626	1626	
20155004	24.10.2023	15.10.2020	Андріана Andriana	1946	1946	
20155005	10.10.2023	26.11.2020	Атлант Носівський Atlant Nosivskyi	1990	1990	
23155001	05.10.2023	06.09.2023	МЕЛІФОР MELIFOR	3227	3227	
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)						
20177001	02.10.2023	12.08.2020	Оазис Oazys	1751	1751	бюлетень, випуск 6, 2022
20177004	10.10.2023	11.12.2020	Ворскла Vorskla	1943	1943	
21177002	10.10.2023	02.11.2021	Пірит Piryt	1669	1669	
21177003	02.10.2023	23.11.2021	Нітро Nitro	2805 2806	2805 2806	
Турнепс <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs. Turnip Rape						
23178001	24.10.2023		ФІНІТО FINITO	971	971	
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne						
23196001	05.10.2023	06.09.2023	МЕДИСАН MEDISAN	3227	3227	
23196002	31.10.2023		ІЗОЛА ISOLA	2440	2440	
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin						
22228002	24.10.2023	22.02.2022	Баттернат де Люкс Baternat de Liuks	1163	1163	
23228001	10.10.2023		ВІНАС VEENAS	1833	1833	
23228002	10.10.2023		Атлас Atlas	1833	1833	
Еспарцет виколистий <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin						
23234001	05.10.2023	06.09.2023	ВАЛЛОП VALLOR	3227	3227	
Льон звичайний (озимий) <i>Linum usitatissimum</i> L. Flax; Linseed						
21249001	12.10.2023	09.07.2021	ЛСЛ 1133 LSL 1133	2804	2804	
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear						
22258002	24.10.2023	20.12.2022	Вежа мускатна Vezha muskatna	1601	1601	
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum						
23261001	24.10.2023	23.05.2023	Октябрь Сан 2 Oktober San 2	3208	3208	
Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple						
23263001	31.10.2023	15.02.2023	Градиска Gradisca	3205	3205	
Ліщина велика (фундук) <i>Corylus maxima</i> Mill. Hazelnut						
22286002	19.10.2023	07.12.2022	Березокорій Berezokoryi	3090	3090	бюлетень, випуск 8, 2023

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Тритикале (яре) <i>Triticosecale</i> Witt.						
21288001	05.10.2023	04.01.2021	Кріпость харківська Kripost kharkivska	1581	1581	бюлетень, випуск 5, 2023
21288002	05.10.2023	04.01.2021	Опора харківська Opora kharkivska	1581	1581	бюлетень, випуск 5, 2023
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch.						
23294001	24.10.2023	13.07.2023	Рубі де Жардін Rubis des Jardins	3217	3217	
Агрбус звичайний <i>Ribes uva-crispa</i> L.						
23295001	10.10.2023	01.02.2023	Кам'яніград Kam'ianhrad	1601	1601	
23295002	10.10.2023	01.02.2023	Петрівка Petrivka	1601	1601	
23295003	10.10.2023	01.02.2023	Холодний яр Kholodnyi yar	1601	1601	
Вишня степова х вишня ланезіана (підщени) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i>						
23352001	24.10.2023	21.07.2023	ВСЛ 2.1 VSL 2.1	3218	3218	
Актинідія пурпурова х актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. x <i>Actinidia arguta</i> Planch.						
23368002	16.10.2023	12.04.2023	Фортуна Fortuna	348	348	
23368003	16.10.2023	12.04.2023	Галаретка Halaretka	348	348	
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L.						
21377002	19.10.2023	15.11.2021	Деметра Demetra	1626	1626	бюлетень, випуск 6, 2023
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L.						
23380001	05.10.2023	01.09.2023	КОЗАЧКА KOZACHKA	3223 3224 3225	3223 3224 3225	
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i>						
23421001	02.10.2023		Скайфос Skyphos	1730	1730	
Хризантема шовковицелиста <i>Chrysanthemum x morifolium</i> Ramat						
22438004	31.10.2023	05.12.2022	Коралове намисто Koralove namysto	2075	2075	
22438005	31.10.2023	05.12.2022	Прометей Prometei	2075	2075	
22438006	31.10.2023	05.12.2022	Рожева діадема Rozheva diadema	2075	2075	
Монарда гібридна <i>Monarda x hybrida</i> hort.						
22534001	05.10.2023	20.12.2022	Кияночка Kyianochka	348	348	бюлетень, випуск 8, 2023
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L.						
21539001	10.10.2023	24.02.2021	Білбері Bilberi	2783	2783	
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L.						
22548001	16.10.2023	20.12.2022	Різдвяна зірочка Rizdviana zirochka	348	348	
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L.						
23559001	24.10.2023	22.09.2023	Паддл Paddle	796	796	
23559002	24.10.2023	22.09.2023	Апперкот Uppercut	796	796	
23559003	24.10.2023	22.09.2023	Ескрім Escrime	796	796	
Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i> Mill.						
23601001	24.10.2023	28.04.2023	Медова ФТ23 Medova FT23	3211 2800	3211 2800	бюлетень, випуск 8, 2023

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
Ячмінь звичайний (дворучка) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (both winter and spring sowing)						
20612001	31.10.2023	01.12.2020	Русин Rusyn	1591	1591	
20612002	31.10.2023	01.12.2020	Еволюція Evolutsiia	1591	1591	
Тритикале (дворучка) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (both winter and spring sowing)						
21622001	19.10.2023	16.01.2021	Єгор Yehor	2610	2610	
Полин д'Апрі <i>Artemisia argyi</i> H. Lev. & Vanion Chinese mugwort						
22671001	05.10.2023	20.12.2022	Срібне мереживо Sribne merezhvyo	348	348	бюлетень, випуск 8, 2023
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula						
23680001	16.10.2023	12.05.2023	Чумацький Шлях Chumatskyi Shliakh	348	348	
23680002	16.10.2023	15.05.2023	Лісова пісня Lisova pisnia	348	348	
23680003	16.10.2023	12.05.2023	Веснянка Vesnianka	348	348	
Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщепна) <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. Cherry-plum; Myrobalan						
23681001	24.10.2023		Міробалан 29С Myrobalan 29C	3208		
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component						
21909114	24.10.2023		ПХ4Д3С PH4D3S	2715	2715	
21909115	24.10.2023		ПХ4Д3Ц PH4D3C	2715	2715	
21909121	24.10.2023		1ПТФТ47 1PTFT47	2715	2715	
21909124	24.10.2023		1ПВНВ47 1PWNV47	2715	2715	
21909204	10.10.2023	28.12.2021	ЕС7754 ES7754	2890	2890	
21909210	10.10.2023	28.12.2021	ЕГ7А71 EG7A71	2890	2890	
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component						
21915001	02.10.2023	25.01.2021	Л204А L204A	1751	1751	бюлетень, випуск 9, 2023
21915002	02.10.2023	25.01.2021	Колосисте Kolosyste	1751	1751	бюлетень, випуск 9, 2023
21915009	10.10.2023	24.06.2021	Л2177ПхЛ2184Н L2177PkhL2184N	1900	1900	
21915010	10.10.2023	24.06.2021	ХЮР035 HYR035	1900	1900	
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component						
19939087	10.10.2023		7ПВДХ67А 7PVDH67A	2715	2715	
20939146	10.10.2023		ПХ1032А PH1032A	2715	2715	
21939046	10.10.2023		7ПУГК32Р 7PUGQ32R	2715	2715	
21939047	10.10.2023		7ПВЛХ62Р 7PWLH62R	2715	2715	
21939055	10.10.2023		7ПУХД10А 7PUHD10A	2715	2715	
21939056	10.10.2023		7ПУКЦ97А 7PUKC97A	2715	2715	
21939087	31.10.2023	17.12.2021	Р8035М2ЖІ R8035M2JI	1435	1435	
21939089	31.10.2023	17.12.2021	Р8035М1ЖС R8035M1JS	1435	1435	
21939091	31.10.2023	17.12.2021	Р9ТК6С R9TQ6S	1435	1435	
21939094	31.10.2023	17.12.2021	Р15ЕІ2М R15EI2M	1435	1435	
21939098	31.10.2023	17.12.2021	Ф7АХ2МЖКОА F7AX2MJKOA	1435	1435	

Номер заявки Application number	Дата реєстрації Date of registration	Дата пріоритету Date of priority	Назва сорту Variety denomination	Заявник (код) Applicant (code)	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Опис морфологічних ознак сорту Description of morphological features of the variety
21939102	31.10.2023	17.12.2021	Ф19002МЖСА F19002MJSA	1435	1435	
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component						
23940014	31.10.2023	04.08.2023	Сінді КС Cindi CS	2890	2890	

Відомості щодо виданих свідоцтв про державну реєстрацію сортів, їх завірених копій та дублікати

Information on issued certificates of state registration of varieties, their certified copies and duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Агрис звичайний <i>Ribes uva-crispa</i> L. Gooseberry					
23295002	01.02.2023	230769	Петрівка Petrivka	1601	25.10.2023
23295003	01.02.2023	230770	Холодний яр Kholodnyi yar	1601	25.10.2023
23295001	01.02.2023	230768	Кам'яніград Kam'ianhrad	1601	25.10.2023
Актинідія пурпурова х актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. x <i>Actinidia arguta</i> Planch. Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit					
23368002	12.04.2023	230836	Фортуна Fortuna	348	27.10.2023
23368003	12.04.2023	230837	Галаретка Halaretka	348	27.10.2023
Буряк цукровий <i>Beta vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Doell Sugar Beet					
20069001	04.12.2020	220835	Дандріє Dandrieu	2552	18.10.2023
20069002	04.12.2020	220836	Резон Raison	2552	18.10.2023
20069003	04.12.2020	220837	Стив Steve	2552	18.10.2023
Вишня степова х вишня ланезіана <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry					
23352001	21.07.2023	230895	ВСЛ 2.1 VSL 2.1	3218	30.10.2023
Вігна промениста (квасоля золотиста, маш) <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek (<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.) Mung Bean					
20024001	12.10.2020	230771	Бераш Berash	2718	18.10.2023
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash					
23228001	01.08.2023	230812	ВІНАС VEENAS	1833	18.10.2023
23228002	03.08.2023	230813	Атлас Atlas	1833	18.10.2023
22228002	22.02.2022	230877	Баттернат де Люкс Baternat de Liuks	1163	31.10.2023
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard					
23380001	01.09.2023	230761	КОЗАЧКА KOZACHKA	3223	11.10.2023
23380001	01.09.2023	230761	КОЗАЧКА KOZACHKA	3224	11.10.2023
23380001	01.09.2023	230761	КОЗАЧКА KOZACHKA	3225	11.10.2023
Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea					
22023001	24.01.2022	230851	Протін Protin	880	31.10.2023
21023001	04.01.2021	230720	Аякс Aiaks	1581	18.10.2023
18023003	29.11.2018	230742	Велетень Veleten	1591	12.10.2023
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
20177004	11.12.2020	230772	Ворскла Vorskla	1943	23.10.2023
21177002	02.11.2021	230773	Пірит Piryt	1669	25.10.2023
21177003	23.11.2021	230722	Нітро Nitro	2805	12.10.2023
21177003	23.11.2021	230722	Нітро Nitro	2806	12.10.2023
20177001	12.08.2020	230721	Оазис Oazys	1751	12.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Грястиця збірна <i>Dactylis glomerata</i> L. Cocksfoot					
23182001	27.07.2023	230711	ДИСЕРОС DICEROS	971	05.10.2023
Еспарцет виколистий <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin					
23234001	06.09.2023	230743	ВАЛЛОП VALLOR	3227	11.10.2023
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
21015001	25.01.2021	230723	Хлібна нива Khlibna nyva	1751	12.10.2023
21015002	01.02.2021	230724	Нива волошкова Nyva voloshkova	1581	18.10.2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
21915002	25.01.2021	230726	Колосисте Kolosyste	1751	12.10.2023
21915009	24.06.2021	230774	Л2177ПхЛ2184Н L2177PkhL2184N	1900	18.10.2023
21915010	24.06.2021	230775	ХЮР035 HYR035	1900	18.10.2023
21915001	25.01.2021	230725	Л204А L204A	1751	12.10.2023
Кабачок <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>giraumontia</i> Filov Vegetable Marrow, Squash					
21148002	09.09.2021	230908	Еклер Ekler	2819	31.10.2023
23148002	01.08.2023	230814	Імператор Imperator	1833	18.10.2023
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon					
22146003	22.02.2022	230881	Чарльстон Грей Делюкс Charlston Hrei Deliuxs	1163	31.10.2023
22146004	22.02.2022	230882	Грей Белле Hrei Belle	1163	31.10.2023
21146006	09.09.2021	230903	Жако Zhako	2819	31.10.2023
Канна індійська <i>Canna indica</i> L. Canna					
22324005	05.12.2022	230695	Ісіда Isida	2075	12.10.2023
22324006	05.12.2022	230696	Маскарад Maskarad	2075	12.10.2023
22324004	05.12.2022	230694	Адажіо Adazhio	2075	12.10.2023
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage					
21096007	09.09.2021	230909	Ельза Elza	2819	31.10.2023
23096005	05.09.2023	230829	МАРЛУ MARLOO	1833	18.10.2023
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage					
23135001	05.09.2023	230830	КІСЕКІ KISEKI	1833	18.10.2023
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> L. Cauliflower					
23101004	05.09.2023	230831	ВАЙТОН WHITON	1833	18.10.2023
23101005	05.09.2023	230832	АЛСТОН ALSTON	1833	18.10.2023
Картопля <i>Solanum tuberosum</i> L. Potato					
20088001	02.01.2020	230896	АЛВЕРСТОН РАССЕТ Alverstone Russet	2660	31.10.2023
21088004	26.10.2021	230885	Роксоланівська Roksolanivska	2828	31.10.2023
20088027	30.12.2020	230900	Кардіма CARDYMA	2765	31.10.2023
20088027	30.12.2020	230900	Кардіма CARDYMA	2660	31.10.2023
20088026	30.12.2020	230901	Камелія CAMELIA	2660	31.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
20088009	02.01.2020	230899	Тайгер Tiger	2660	31.10.2023
20088002	02.01.2020	230897	Санред Sunred	2660	31.10.2023
20088007	02.01.2020	230898	ТРАЙПЛ7 TRIPLE7	2660	31.10.2023
Квасоля звичайна (овочева) <i>Phaseolus vulgaris</i> L. French Bean					
20127001	26.10.2020	221008	Апекс Apeks	2729	18.10.2023
22127002	07.02.2022	230887	Крома Croma	1960	27.10.2023
22127001	07.02.2022	230886	Контада Contada	1960	27.10.2023
20127002	26.10.2020	221009	Зоро Zoro	2729	18.10.2023
20127003	26.10.2020	221010	Кайен Kaïen	2729	18.10.2023
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
23155001	06.09.2023	230744	МЕЛІФОР MELIFOR	3227	11.10.2023
Костриця лучна <i>Festuca pratensis</i> Huds. Meadow Fescue					
23204001	27.07.2023	230718	ПАРДУС PARDUS	971	05.10.2023
Костриця очеретяна <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. Tall Fescue					
23205001	06.07.2023	230385	ФЕРДАРК VERDARK	971	05.10.2023
Костриця червона <i>Festuca rubra</i> L. Red Fescue, Creeping Fescue					
23377001	06.07.2023	230386	ФЕРФАЙН VERFINE	971	05.10.2023
Костриця шорстколиста <i>Festuca brevipila</i> R. Tracey					
23437001	06.07.2023	230388	ШАУН SHAUN	971	05.10.2023
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn					
20009081	26.10.2020	221018	I 4739	2729	18.10.2023
20009082	26.10.2020	221019	I 4739 I 3311	2729	18.10.2023
20009138	23.11.2020	230655	ПОПУЛЯРІО POPULIARIO	844	17.10.2023
21009128	16.12.2021	230815	ЛІД2210Ц LID2210C	2890	20.10.2023
21009139	16.12.2021	230816	ЕС КАРУ ES KARRU	2890	20.10.2023
21009141	16.12.2021	230817	ЕС МІДВЕЙ ES MIDWAY	2890	20.10.2023
22009134	16.12.2022	230650	Профундо Profundo	2011	12.10.2023
20009073	26.10.2020	221012	I 3553	2729	18.10.2023
21009166	29.12.2021	230712	I 3553 ЛГ31271	793	27.10.2023
20009079	26.10.2020	221016	І 4930	2729	18.10.2023
20009078	26.10.2020	221015	І 4930 І 3737	2729	18.10.2023
20009077	26.10.2020	221014	І 3737 І 3113	2729	18.10.2023
19009178	04.12.2019	230677	І 3113 ЛІКОРН	844	17.10.2023
20009075	26.10.2020	230185	ЛІКОРН LIKORN	2729	18.10.2023
20009076	26.10.2020	221013	I 3911 I 4545	2729	18.10.2023
20009072	26.10.2020	221011	I 4545 I 4314	2729	18.10.2023
20009080	26.10.2020	221017	I 4314 I 4141	2729	18.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component					
20909103	26.10.2020	221040	CB 8384	2729	18.10.2023
21909210	28.12.2021	230819	SV 8384	2890	20.10.2023
21909204	28.12.2021	230818	EG7A71	2890	20.10.2023
21909124	19.10.2021	230907	EC7754	2715	31.10.2023
21909121	19.10.2021	230906	ES7754	2715	31.10.2023
21909114	19.10.2021	230904	1ПВНВ47	2715	31.10.2023
20909102	26.10.2020	221039	1РВНВ47	2729	18.10.2023
20909101	26.10.2020	221038	1ПТФТ47	2729	18.10.2023
20909100	26.10.2020	221037	1РТФТ47	2729	18.10.2023
20909099	26.10.2020	221036	ПХ4Д3С	2729	18.10.2023
20909098	26.10.2020	221035	РН4Д3С	2729	18.10.2023
20909097	26.10.2020	221034	АГ 7208	2729	18.10.2023
21909115	19.10.2021	230905	АН 7208	2715	31.10.2023
Кукурудза цукрова <i>Zea mays</i> L. ssp. <i>saccharata</i> Sturt. Sweet Corn					
20103005	04.12.2020	220912	РП 2303	2567	18.10.2023
22103004	05.01.2022	230919	РР 2303	273	31.10.2023
22103003	05.01.2022	230918	КН 2803	273	31.10.2023
22103001	05.01.2022	230916	KN 2803	273	31.10.2023
22103002	05.01.2022	230917	КФ 2704	273	31.10.2023
Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i> Mill. Small-leaved Linden					
23601001	28.04.2023	230890	KF 2704	2800	31.10.2023
23601001	28.04.2023	230890	ГА 1804	3211	31.10.2023
Лілійник гібридний <i>Hemerocallis hybrida</i> hort. Daylily Hybrid					
22498002	05.12.2022	230697	НА 1804	2075	12.10.2023
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
23196001	06.09.2023	230745	ГО 1307	3227	11.10.2023
Монарда гібридна <i>Monarda x hybrida</i> hort. Bee Balm Hybrid					
22534001	20.12.2022	230760	НО 1307	348	27.10.2023
Морква <i>Daucus carota</i> L. Carrot					
21109002	09.09.2021	230912	ПХ4Д3Ц	2819	31.10.2023
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring)					
20011003	12.11.2020	230777	РН4Д3С	2739	18.10.2023
20011004	12.11.2020	230778	Вудленд	2739	18.10.2023
Огірок посівний <i>Cucumis sativus</i> L. Cucumber					
23110009	11.08.2023	230780	Фостер	1163	18.10.2023
21110015	30.12.2021	220695	Фенікс де Люкс	2841	18.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
22110011	29.12.2022	230779	Проскор Proscore	753	18.10.2023
23110007	03.08.2023	230820	Фрайзер Fraser	1833	18.10.2023
Ожина <i>Rubus subgenus Eubatus</i> sect. <i>Moriferi</i> & <i>Ursini</i> Blackberry, Loganberry					
19631001	31.01.2019	230360	АПФ 190Т APF 190T	2499	02.10.2023
Пажитниця багаторічна <i>Lolium perenne</i> L. Perennial Ryegrass					
23222003	27.07.2023	230719	АРВІКОЛА ARVICOLO	971	05.10.2023
23222004	27.07.2023	230717	СОРАЯ SORAYA	971	05.10.2023
23222002	06.07.2023	230413	ВЕРМІЛЬЙОН VERMILLION	971	05.10.2023
Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula					
23680003	12.05.2023	230840	Веснянка Vesnianka	348	27.10.2023
23680001	12.05.2023	230838	Чумацький Шлях Chumatskyi Shliakh	348	27.10.2023
23680002	15.05.2023	230839	Лісова пісня Lisova pisnia	348	27.10.2023
Півники <i>Iris</i> L. Iris					
22322006	05.12.2022	230700	Серпанок Serpanok	2075	12.10.2023
22322004	05.12.2022	230698	Казантип Kazantyp	2075	12.10.2023
22322005	05.12.2022	230699	Дежавю Dezhaviu	2075	12.10.2023
Полин д'Арті <i>Artemisia argyi</i> H. Lev. & Vanion Chinese mugwort					
22671001	20.12.2022	230746	Срібне мереживо Sribne merezhuvo	348	27.10.2023
Помідор їстівний <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomato					
22115005	07.02.2022	220698	Котіто Kotito	2841	18.10.2023
22115019	29.12.2022	230781	Дрімболл Dreamboll	753	18.10.2023
22115020	29.12.2022	230782	Геліказ Helicaz	753	18.10.2023
23115020	21.07.2023	230833	Керо Kero	2088	18.10.2023
Просо посівне <i>Panicum miliaceum</i> L. Common Millet					
21014001	04.01.2021	230747	Переможне Peremozhne	1581	18.10.2023
Пшениця м'яка (озима) (батьківський компонент) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (parental component)					
21900007	16.04.2021	230707	ТА19ГВ004 ТА19НВ004	2597	20.10.2023
21900001	16.04.2021	230701	ТР20ГВ607 ТР20ГВ607	2597	20.10.2023
21900002	16.04.2021	230702	ТБ19ГВ303 ТБ19ГВ303	2597	20.10.2023
21900003	16.04.2021	230703	ТА19ГВ003 ТА19ГВ003	2597	20.10.2023
21900004	16.04.2021	230704	ТБ19ГВ304 ТБ19ГВ304	2597	20.10.2023
21900005	16.04.2021	230705	ТА20ГВ005 ТА20ГВ005	2597	20.10.2023
21900006	16.04.2021	230706	ТБ20ГВ305 ТБ20ГВ305	2597	20.10.2023
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
22012033	20.06.2022	230429	Кнут Knut	947	18.10.2023
21012038	12.07.2021	230738	ФОРСАЙТ FORSAIT	2805	12.10.2023
21012040	22.07.2021	230755	Пам'яті Горлача Pam'iaty Horlacha	1097	12.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
21012040	22.07.2021	230755	Пам'яті Горлача Pam'iat Horlacha	1635	12.10.2023
21012041	22.07.2021	230756	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	1097	12.10.2023
21012041	22.07.2021	230756	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska	1635	12.10.2023
21012042	28.07.2021	230683	Слава Унави Slava Unavy	2610	12.10.2023
21012050	29.11.2021	230692	Алгері Algeri	2440	12.10.2023
22012023	26.05.2022	230423	РЖТ ТЕЛЕМАРК RGT TELEMARК	1783	18.10.2023
22012024	26.05.2022	230424	РЖТ СПЕЦІАЛІСТ RGT SPECIALIST	1783	18.10.2023
22012025	26.05.2022	230425	РЖТ ПРОВІЗН RGT PROVISION	1783	18.10.2023
22012026	26.05.2022	230426	Дебіан Debian	807	18.10.2023
22012031	20.06.2022	230427	Акаша Akasha	947	18.10.2023
21012035	09.07.2021	230417	Дженіс Jannis	2302	18.10.2023
22012032	20.06.2022	230428	Калбекс Kalbex	2616	18.10.2023
21012036	09.07.2021	230418	Фокс Foxx	2803	18.10.2023
22012034	20.06.2022	230430	Револьвер Revolver	947	18.10.2023
22012035	20.06.2022	230431	Факс Faxе	947	18.10.2023
23012001	09.01.2023	230766	СОЕСКІ SOESKI	2890	20.10.2023
23012011	26.05.2023	230434	РЖТ КРВЗЕР RGT KREUZER	1783	18.10.2023
23012012	26.05.2023	230435	РЖТ ДЕЛЛО RGT DELLO	1783	18.10.2023
23012029	04.08.2023	230436	Динаміт Dynamite	880	18.10.2023
23012029	04.08.2023	230436	Динаміт Dynamite	2616	18.10.2023
23012030	04.08.2023	230437	Нетта Netta	880	18.10.2023
23012030	04.08.2023	230437	Нетта Netta	2616	18.10.2023
23012037	08.09.2023	230691	ЛГ РОЗАРКА LG ROZARKA	793	27.10.2023
23012038	08.09.2023	230714	ЛГ АБРАЦО LG ABRAZO	793	27.10.2023
20012039	12.08.2020	230728	ЮСОН YuSON	1751	12.10.2023
22012032	20.06.2022	230428	Калбекс Kalbex	880	18.10.2023
21012011	17.03.2021	230734	МІП Дарунок MIP Darunok	2859	12.10.2023
20012040	12.08.2020	230729	Сонцедар Sontsedar	1751	12.10.2023
20012041	19.08.2020	230730	Гусар Husar	1751	12.10.2023
20012043	20.11.2020	230731	Носівочка Nosivochka	1990	24.10.2023
20012044	03.12.2020	230841	НОВІК NOVIC	485	20.10.2023
20012045	03.12.2020	230842	Соліфлор КС SOLIFLOR CS	485	20.10.2023
21012001	04.01.2021	230732	Мізинка Mizynka	1581	18.10.2023
21012002	04.01.2021	230733	Малуша Malusha	1581	18.10.2023
21012003	15.02.2021	230783	Біла Bila	355	31.10.2023
21012004	15.02.2021	230784	Трояна Troiana	355	31.10.2023
21012005	15.02.2021	230785	Київська 22 Kyivska 22	355	31.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
21012006	15.02.2021	230786	Синтетик 240 Syntetyk 240	355	31.10.2023
21012007	18.02.2021	230787	ЛГ Оптиміст LG Optimist	793	27.10.2023
21012038	12.07.2021	230738	ФОРСАЙТ FORSAIT	2806	12.10.2023
21012010	24.02.2021	230788	Бісквіт Biskvit	2783	18.10.2023
21012020	23.03.2021	230753	Дністрянка одеська Dnistrianka odeska	1591	12.10.2023
21012030	18.05.2021	230789	Атрибут Attribut	807	18.10.2023
21012024	16.04.2021	230709	БХВ20ГВ0010 BHW20GW0010	2597	20.10.2023
21012008	18.02.2021	230682	ЛГ Квітум LG Cvitum	793	27.10.2023
21012021	23.03.2021	230754	Епіграф Epihraf	1591	12.10.2023
21012034	09.07.2021	230416	Джубіло Jubilo	2302	18.10.2023
21012018	23.03.2021	230751	Творчість одеська Tvorchist odeska	1591	12.10.2023
21012017	23.03.2021	230750	Етуаль Etual	1591	12.10.2023
21012016	23.03.2021	230749	Вірність одеська Virmist odeska	1591	12.10.2023
21012015	23.03.2021	230748	Загадка одеська Zahadka odeska	1591	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230737	МІП Довіра MIP Dovira	2859	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230736	МІП Аеліта MIP Aelita	2859	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230735	МІП Відзнака MIP Vidznaka	2859	12.10.2023
21012023	16.04.2021	230708	БХВ20ГВ0009 BHW20GW0009	2597	20.10.2023
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring)					
20013012	21.12.2020	230790	Реліквія Relikviia	2757	27.10.2023
22013003	24.01.2022	230863	Сінді CINDY	880	31.10.2023
22013003	24.01.2022	230863	Сінді CINDY	2616	31.10.2023
22013001	05.01.2022	230791	Перібонка Peribonka	2739	18.10.2023
20013012	21.12.2020	230790	Реліквія Relikviia	2755	27.10.2023
20013012	21.12.2020	230790	Реліквія Relikviia	2754	27.10.2023
20013012	21.12.2020	230790	Реліквія Relikviia	2756	27.10.2023
20013012	21.12.2020	230790	Реліквія Relikviia	2753	27.10.2023
20013008	04.12.2020	230739	МІП Веснянка MIP Vesnianka	2859	12.10.2023
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat					
21539001	24.02.2021	230792	Білбері Bilberi	2783	18.10.2023
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring)					
23006001	19.01.2023	230850	Відеодур Videodur	1564	24.10.2023
23006003	06.09.2023	230713	КЕНОБІ KENOBI	2440	12.10.2023
21006001	04.01.2021	230757	Аурата Aurata	1581	18.10.2023
Рис посівний <i>Oryza sativa</i> L. Rice					
22017002	07.07.2022	230715	ШІМШЕК SHIMSHEK	2883	12.10.2023
22017001	07.07.2022	230716	КЕШАН KESHAN	2883	12.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
22040009	19.04.2022	230658	ЛГ АДЕЛІН LG ADELINE	793	27.10.2023
21040052	18.05.2021	230803	Фамулус Famulus	807	18.10.2023
21040053	09.07.2021	230449	Коріда Corida	880	18.10.2023
21040054	09.07.2021	230450	Кросбі Crosby	880	18.10.2023
22040008	19.04.2022	230657	ЛГ АЛЬПІНА LG ALPINE	793	27.10.2023
21040050	14.06.2021	230448	КАДРАН CADRAN	1783	18.10.2023
22040010	19.04.2022	230659	ЛГ АКАДЕМІК LG ACADEMIC	793	27.10.2023
22040011	19.04.2022	230660	ЛГ АТАКАМА LG ATACAMA	793	27.10.2023
22040014	14.04.2022	230662	ЛГ АРМАДА LG ARMADA	793	27.10.2023
21040049	14.06.2021	230684	РЖТ ПАРАДАЙЗ3 RGT PARADIZZE	1783	18.10.2023
23040042	14.06.2023	230455	В 386 ОЛ V 386 OL	807	18.10.2023
22040012	19.04.2022	230661	ЛГ АФРОДІТА LG APHRODITE	793	27.10.2023
23040048	17.08.2023	230762	Рамзес Ramses	2851	31.10.2023
22040037	26.05.2022	230452	БЛЕКМУН BLACKMOON	1783	18.10.2023
20040066	28.10.2020	230679	Скай Skaï	1702	04.10.2023
21040033	20.05.2021	230802	ІНВ 2020 INV 2020	807	18.10.2023
22040032	30.04.2022	230763	Янош Janosh	912	18.10.2023
20040040	08.05.2020	230795	Юстас Yustas	1669	25.10.2023
20040074	08.12.2020	230442	АМАЗЗОНІТ AMAZZONITE	1783	18.10.2023
20040075	08.12.2020	230443	АТЛЕТІК ATLETICK	1783	18.10.2023
21040015	05.04.2021	230526	Гумбольдт Humboldt	912	05.10.2023
21040027	18.05.2021	230796	Ромео Romeo	807	18.10.2023
21040028	18.05.2021	230797	Кондор Condor	807	18.10.2023
21040029	18.05.2021	230798	Десперадо Desperado	807	18.10.2023
21040032	20.05.2021	230801	Даззлер Dazzler	807	18.10.2023
21040030	18.05.2021	230799	Юрек Jurek	807	18.10.2023
21040031	20.05.2021	230800	Пірол Pirol	807	18.10.2023
20040039	08.05.2020	230794	Алекс Aleks	1669	25.10.2023
21040020	05.04.2021	230527	Турбо Turbo	912	05.10.2023
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
20940013	27.10.2020	230680	К1Ф0А09 K1F0A09	1702	04.10.2023
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum					
23261001	23.05.2023	230894	Октобер Сан 2 Oktober San 2	3208	30.10.2023
Соняшник однорічний <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower					
22039018	11.11.2022	230764	Софіясол Sofiasol	1498	12.10.2023
22039035	22.11.2022	230934	Н5Х493 КЛ N5H493 CL	1985	31.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
23039012	13.01.2023	230822	6027Л КЛП	2890	20.10.2023
23039014	13.01.2023	230823	6027L CLP	2890	20.10.2023
20039050	06.11.2020	230765	Інсан 277 СУ Insun 277 SU	1498	12.10.2023
Соняшник однорічний – батьківський компонент <i>Helianthus annuus</i> L. Sunflower – parental component					
21939056	10.11.2021	230809	7ПУКЦ97А	2715	18.10.2023
19939087	12.12.2019	230805	7РУКС97А	2715	18.10.2023
21939055	10.11.2021	230804	7ПВДХ67А	2715	18.10.2023
20939146	28.12.2020	230806	7РВДН67А	2715	18.10.2023
21939046	10.11.2021	230807	7ПУХД10А	2715	18.10.2023
21939047	10.11.2021	230808	7РУНД10А	2715	18.10.2023
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean					
22045026	11.11.2022	230849	ПХ1032А	1498	24.10.2023
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry					
23294001	13.07.2023	230937	РН1032А	3217	31.10.2023
Тополя <i>Populus</i> L. Poplar					
22086001	13.10.2022	230911	Рубі де Жардін Rubis des Jardins	2888	30.10.2023
Тритикале (дворучка) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (both winter and spring)					
21622001	16.01.2021	230866	Макс-4	2610	31.10.2023
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
21022001	01.02.2021	230741	Єгор	1581	18.10.2023
Тритикале (яре) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Spring)					
21288002	04.01.2021	230759	Ягор	1581	18.10.2023
21288001	04.01.2021	230758	Опора харківська Опора kharkivska	1581	18.10.2023
Троянда <i>Rosa</i> L. Rose					
22339006	05.12.2022	230710	Кріпость харківська Kripost kharkivska	2075	12.10.2023
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush					
22548001	20.12.2022	230843	Різдвяна зірочка Rizdviana zirochka	348	27.10.2023
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach					
23130001	05.09.2023	230835	АПОЛЛО	1833	18.10.2023
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter)					
21019001	24.02.2021	230810	АПОЛЛО	2783	18.10.2023
21019008	18.05.2021	230632	Тур	807	18.10.2023
21019009	09.07.2021	230470	Юлія	2302	18.10.2023
21019010	09.07.2021	230471	Мелія	2302	18.10.2023
21019011	09.07.2021	230472	Румкас	947	18.10.2023
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
22020009	24.01.2022	230872	Нептун	2302	31.10.2023
			Тася		

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Власник сорту (код) Variety owner (code)	Дата видачі Date of granting
21020005	03.11.2021	230811	Брант	1669	25.10.2023
22020008	24.01.2022	230871	Брант Ювента Juvanta	2302	31.10.2023

Відомості щодо виданих свідоцтв про авторство на сорти рослин та їх дублікати

Information on issued certificates of authorship for plant varieties and their duplicates

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter)					
20012039	12.08.2020	230610	ЮСОН YuSON	Власенко Світлана Володимирівна Vlasenko Svitlana Volodymyrivna	19.10.2023
20012039	12.08.2020	230610	ЮСОН YuSON	Масюк Ніна Олексіївна Masiuk Nina Oleksiivna	19.10.2023
20012039	12.08.2020	230610	ЮСОН YuSON	Панов Олександр Ігорович Panov Oleksandr Ihorovych	19.10.2023
20012039	12.08.2020	230610	ЮСОН YuSON	Ямкова Олена Вікторівна Yamkova Olena Viktorivna	19.10.2023
20012040	12.08.2020	230611	Сонцедар Sontsedar	Солошенко Ольга Вікторівна Soloshenko Olha Viktorivna	19.10.2023
20012040	12.08.2020	230611	Сонцедар Sontsedar	Ямкова Олена Вікторівна Yamkova Olena Viktorivna	19.10.2023
20012040	12.08.2020	230611	Сонцедар Sontsedar	Панов Олександр Ігорович Panov Oleksandr Ihorovych	19.10.2023
20012040	12.08.2020	230611	Сонцедар Sontsedar	Масюк Ніна Олексіївна Masiuk Nina Oleksiivna	19.10.2023
20012040	12.08.2020	230611	Сонцедар Sontsedar	Власенко Світлана Володимирівна Vlasenko Svitlana Volodymyrivna	19.10.2023
20012041	19.08.2020	230612	Гусар Husar	Масюк Ніна Олексіївна Masiuk Nina Oleksiivna	19.10.2023
20012041	19.08.2020	230612	Гусар Husar	Панов Олександр Ігорович Panov Oleksandr Ihorovych	19.10.2023
20012041	19.08.2020	230612	Гусар Husar	Ямкова Олена Вікторівна Yamkova Olena Viktorivna	19.10.2023
20012041	19.08.2020	230612	Гусар Husar	Власенко Світлана Володимирівна Vlasenko Svitlana Volodymyrivna	19.10.2023
21012003	15.02.2021	230654	Біла Bila	Гаврилюк Микола Микитович Havryliuk Mykola Mykytovych	31.10.2023
21012003	15.02.2021	230654	Біла Bila	Моргун Володимир Васильович Morhun Volodymyr Vasylovych	31.10.2023
21012003	15.02.2021	230654	Біла Bila	Рибалка Олександр Ілліч Rybalka Oleksandr Illich	31.10.2023
21012003	15.02.2021	230654	Біла Bila	Сандецька Надія Василівна Sandetska Nadiia Vasylivna	31.10.2023
21012004	15.02.2021	230655	Трояна Troiana	Гаврилюк Микола Микитович Havryliuk Mykola Mykytovych	31.10.2023
21012004	15.02.2021	230655	Трояна Troiana	Скрипльов Володимир Олександрович Skryplov Volodymyr Oleksandrovych	31.10.2023
21012004	15.02.2021	230655	Трояна Troiana	Моргун Володимир Васильович Morhun Volodymyr Vasylovych	31.10.2023
21012004	15.02.2021	230655	Трояна Troiana	Моргун Богдан Володимирович Morhun Bohdan Volodymyrovych	31.10.2023
21012005	15.02.2021	230656	Київська 22 Kyivska 22	Моргун Богдан Володимирович Morhun Bohdan Volodymyrovych	31.10.2023
21012005	15.02.2021	230656	Київська 22 Kyivska 22	Моргун Володимир Васильович Morhun Volodymyr Vasylovych	31.10.2023
21012005	15.02.2021	230656	Київська 22 Kyivska 22	Скрипльов Володимир Олександрович Skryplov Volodymyr Oleksandrovych	31.10.2023
21012005	15.02.2021	230656	Київська 22 Kyivska 22	Хоменко Лідія Олексіївна Khomenko Lidiia Oleksiivna	31.10.2023
21012005	15.02.2021	230656	Київська 22 Kyivska 22	Якимчук Руслан Андрійович Yakymchuk Ruslan Andriiovych	31.10.2023
21012006	15.02.2021	230657	Синтетик 240 Syntetyk 240	Моргун Володимир Васильович Morhun Volodymyr Vasylovych	31.10.2023
21012006	15.02.2021	230657	Синтетик 240 Syntetyk 240	Рибалка Олександр Ілліч Rybalka Oleksandr Illich	31.10.2023
21012006	15.02.2021	230657	Синтетик 240 Syntetyk 240	Моргун Богдан Володимирович Morhun Bohdan Volodymyrovych	31.10.2023
21012006	15.02.2021	230657	Синтетик 240 Syntetyk 240	Сандецька Надія Василівна Sandetska Nadiia Vasylivna	31.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Топко Ростислав Ігорович Topko Rostyslav Ihorovych	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Близнюк Богдана Валеріївна Blyzniuk Bohdana Valeriiivna	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Вологдіна Галина Борисівна Volohdina Halyna Borysivna	12.10.2023

Відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Рисін Артур Леонідович Rysin Artur Leonidovych	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Сіроштан Андрій Анатолійович Siroshthan Andrii Anatoliiovych	12.10.2023
21012011	17.03.2021	230616	МІП Дарунок MIP Darunok	Дергачов Олександр Леонідович Derhachov Oleksandr Leonidovych	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Лось Руслан Миколайович Los Ruslan Mykolaiovych	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Вологдіна Галина Борисівна Volohdina Halyna Borysivna	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Дергачов Олександр Леонідович Derhachov Oleksandr Leonidovych	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Дубовик Наталія Сергіївна Dubovyk Nataliia Serhiivna	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Правдзіва Ірина Володимирівна Pravdziva Iryna Volodymyrivna	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Прокопік Наталія Іванівна Prokopik Nataliia Ivanivna	12.10.2023
21012012	17.03.2021	230617	МІП Відзнака MIP Vidznaka	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Близнюк Богдана Валеріївна Blyzniuk Bohdana Valeriivna	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Сіроштан Андрій Анатолійович Siroshthan Andrii Anatoliiovych	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Пірич Аліна Володимирівна Pirych Alina Volodymyrivna	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Вологдіна Галина Борисівна Volohdina Halyna Borysivna	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Галушка Сергій Валерійович Halushka Serhii Valeriiovych	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Дергачов Олександр Леонідович Derhachov Oleksandr Leonidovych	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Заїма Олексій Андрійович Zaima Oleksii Andriiovych	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	12.10.2023
21012013	17.03.2021	230618	МІП Аеліта MIP Aelita	Правдзіва Ірина Володимирівна Pravdziva Iryna Volodymyrivna	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Гуменюк Олександр Володимирович Humeniuk Oleksandr Volodymyrovych	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Кочмарський Валентин Сергійович Kochmarskyi Valentyn Serhiiovych	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Кириленко Віра Вікторівна Kyrylenko Vira Viktorivna	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Янін Павло Геннадійович Yanin Pavlo Hennadiiovych	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Сіроштан Андрій Анатолійович Siroshthan Andrii Anatoliiovych	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Пірич Аліна Володимирівна Pirych Alina Volodymyrivna	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Демидов Олександр Анатолійович Demydov Oleksandr Anatoliiovych	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Вологдіна Галина Борисівна Volohdina Halyna Borysivna	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Замліла Ніна Петрівна Zamlila Nina Petrivna	12.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Близнюк Богдана Валеріївна Blyzniuk Bohdana Valeriivna	12.10.2023
21012014	17.03.2021	230619	МІП Довіра MIP Dovira	Місюра Інна Іванівна Misiura Inna Ivanivna	12.10.2023
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter)					
21015001	25.01.2021	230605	Хлібна нива Khlіbna niva	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	19.10.2023
21015001	25.01.2021	230605	Хлібна нива Khlіbna niva	Романюк Оксана Олександрівна Romaniuk Oksana Oleksandrivna	19.10.2023
21015001	25.01.2021	230605	Хлібна нива Khlіbna niva	Мандровська Світлана Миколаївна Mandrovskaya Svitlana Mykolaivna	19.10.2023
21015001	25.01.2021	230605	Хлібна нива Khlіbna niva	Мазур Зоя Олександрівна Mazur Zoia Oleksandrivna	19.10.2023
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring)					
20020019	26.11.2020	220526	Носівчанин Nosivchanyn	Сизенко Олена Євгенівна Syzenko Olena Ievhenivna	10.10.2023
20020019	26.11.2020	220526	Носівчанин Nosivchanyn	Сардак Марія Іванівна Sardak Mariia Ivanivna	10.10.2023
20020019	26.11.2020	220526	Носівчанин Nosivchanyn	Буняк Наталія Миколаївна Buniak Nataliia Mykolaivna	10.10.2023
20020019	26.11.2020	220526	Носівчанин Nosivchanyn	Дворська Світлана Володимирівна Dvorska Svitlana Volodymyrivna	10.10.2023
20020019	26.11.2020	220526	Носівчанин Nosivchanyn	Буняк Наталія Михайлівна Buniak Nataliia Mykhailivna	10.10.2023
20020019	26.11.2020	220526	Носівчанин Nosivchanyn	Сардак Микола Олексійович Sardak Mykola Oleksiiovych	10.10.2023
21020005	03.11.2021	230663	Брант Brant	Дорошук Василь Олексійович Doroshuk Vasyl Oleksiiovych	25.10.2023
21020005	03.11.2021	230663	Брант Brant	Смолій Світлана Іванівна Smolii Svitlana Ivanivna	25.10.2023
21020005	03.11.2021	230663	Брант Brant	Маренюк Олександр Борисович Mareniuk Oleksandr Borysovych	25.10.2023
21020005	03.11.2021	230663	Брант Brant	Нежбірська Людмила Іванівна Nezhbirska Liudmyla Ivanivna	25.10.2023
21020005	03.11.2021	230663	Брант Brant	Корнійчук Олександр Васильович Korniichuk Oleksandr Vasylovych	25.10.2023
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter)					
19022005	14.11.2019	220537	Щедре Носівське Shchedre Nosivske	Приймачук Михайло Іванович Pryimachuk Mykhailo Ivanovych	12.10.2023
19022005	14.11.2019	220537	Щедре Носівське Shchedre Nosivske	Буняк Олександр Іванович Buniak Oleksandr Ivanovych	10.10.2023
19022005	14.11.2019	220537	Щедре Носівське Shchedre Nosivske	Буняк Наталія Миколаївна Buniak Nataliia Mykolaivna	10.10.2023
Ріпак (озимий) <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter)					
20040066	28.10.2020	230536	Скай Skaі	Комарова Ірина Борисівна Komarova Iryna Borysivna	04.10.2023
20040066	28.10.2020	230536	Скай Skaі	Калінова Марія Григорівна Kalinova Mariia Hryhorivna	04.10.2023
20040066	28.10.2020	230536	Скай Skaі	Сеник Руслана Володимирівна Senyk Ruslana Volodymyrivna	04.10.2023
Конюшина лучна (червона) <i>Trifolium pratense</i> L. Red Clover					
23155001	06.09.2023	230625	МЕЛІФОР MELIFOR	Скрипка Олександр Миколайович Skrypka Oleksandr Mykolaiovych	11.10.2023
23155001	06.09.2023	230625	МЕЛІФОР MELIFOR	Іванська Аліна Олександрівна Ivanska Alina Oleksandrivna	11.10.2023
23155001	06.09.2023	230625	МЕЛІФОР MELIFOR	Починок Віталій Михайлович Pochynok Vitalii Mykhailovych	11.10.2023
Горошок посівний (вика) (ярий) <i>Vicia sativa</i> L. Common Vetch (Spring)					
20177001	12.08.2020	220654	Оазис Oazys	Гагін Андрій Олександрович Hahin Andrii Oleksandrovych	19.10.2023
20177001	12.08.2020	220654	Оазис Oazys	Бровко Сергій Миколайович Brovko Serhii Mykolaiovych	19.10.2023
20177001	12.08.2020	220654	Оазис Oazys	Синьогуб Сергій Васильович Synohub Serhii Vasylovych	19.10.2023
20177001	12.08.2020	220654	Оазис Oazys	Орлов Станіслав Дмитрович Orlov Stanislav Dmytrovych	19.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
Люцерна посівна <i>Medicago sativa</i> L. Lucerne					
23196001	06.09.2023	230626	МЕДИСАН MEDISAN	Починок Віталій Михайлович Pochynok Vitalii Mykhailovych	11.10.2023
23196001	06.09.2023	230626	МЕДИСАН MEDISAN	Скрипка Олександр Миколайович Skrypka Olexsandr Mykolaiovych	11.10.2023
23196001	06.09.2023	230626	МЕДИСАН MEDISAN	Маменко Павло Миколайович Mamenko Pavlo Mykolaiovych	11.10.2023
Еспарцет виколистий <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop. Sainfoin					
23234001	06.09.2023	230624	ВАЛЛОП VALLOR	Колодяжний Олександр Юрійович Kolodiaznyi Olexsandr IUriiovych	11.10.2023
23234001	06.09.2023	230624	ВАЛЛОП VALLOR	Починок Віталій Михайлович Pochynok Vitalii Mykhailovych	11.10.2023
23234001	06.09.2023	230624	ВАЛЛОП VALLOR	Скрипка Олександр Миколайович Skrypka Olexsandr Mykolaiovych	11.10.2023
Смородина чорна <i>Ribes nigrum</i> L. Black Currant					
22297001	02.09.2022	220942	Єдність Yednist	Терещенко Яна Юріївна Tereshchenko IAna IUriivna	25.10.2023
22297001	02.09.2022	220942	Єдність Yednist	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
22297002	02.09.2022	220943	Мережка Merezhka	Терещенко Яна Юріївна Tereshchenko IAna IUriivna	25.10.2023
22297002	02.09.2022	220943	Мережка Merezhka	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
22297003	02.09.2022	220944	Чорний десерт Chorny desert	Терещенко Яна Юріївна Tereshchenko IAna IUriivna	25.10.2023
22297003	02.09.2022	220944	Чорний десерт Chorny desert	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
22297004	02.09.2022	220945	Дебют Debiut	Терещенко Яна Юріївна Tereshchenko IAna IUriivna	25.10.2023
22297004	02.09.2022	220945	Дебют Debiut	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
22297005	02.09.2022	220946	Вечорниця Vechornytsia	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
22297005	02.09.2022	220946	Вечорниця Vechornytsia	Терещенко Яна Сергіївна Tereshchenko IAna Serhiivna	25.10.2023
Порічки <i>Ribes rubrum</i> L. Red Currant					
07082001	03.03.2007	08587	Ватра Vatra	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
Гірчиця біла <i>Sinapis alba</i> L. White Mustard					
23380001	01.09.2023	230628	КОЗАЧКА KOZACHKA	Коновалов Давид Віталійович Konovalov Davyd Vitaliiiovych	11.10.2023
23380001	01.09.2023	230628	КОЗАЧКА KOZACHKA	Коновалова Світлана Анатоліївна Konovalova Svitlana Anatoliivna	11.10.2023
23380001	01.09.2023	230628	КОЗАЧКА KOZACHKA	Починок Віталій Михайлович Pochynok Vitalii Mykhailovych	11.10.2023
Монарда гібридна <i>Monarda x hybrida</i> hort. Bee Balm Hybrid					
22534001	20.12.2022	230344	Кияночка Kyianochka	Кораблєва Ольга Анатоліївна Korablova Olha Anatoliivna	04.10.2023
22534001	20.12.2022	230344	Кияночка Kyianochka	Рахметов Джамал Бахлулович Rakhmetov Dzhamal Bakhluovich	04.10.2023
22534001	20.12.2022	230344	Кияночка Kyianochka	Свиденко Людмила Вікторівна Svydenko Liudmyla Viktorivna	04.10.2023
22534001	20.12.2022	230344	Кияночка Kyianochka	Газнюк Марія Олександрівна Hazniuk Mariia Olexsandrivna	04.10.2023
Лохина щиткова <i>Vaccinium corymbosum</i> L. Blueberry; High Bush Blueberry					
13501001	02.12.2013	150537	BB001 VV001	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
18501001	19.07.2018	191272	BB006 VV006	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
18501002	19.07.2018	191273	BB008 VV008	Ярещенко Олександр Миколайович Yareschenko Olexsandr Mykolaiovych	25.10.2023
Полин д'Арті <i>Artemisia argyi</i> H. Lev. & Vanion Chinese mugwort					
22671001	20.12.2022	230345	Срібне мереживо Sribne merezhyvo	Багацька Тетяна Сергіївна Bahatska Tetiana Serhiivna	04.10.2023
22671001	20.12.2022	230345	Срібне мереживо Sribne merezhyvo	Газнюк Марія Олександрівна Hazniuk Mariia Olexsandrivna	04.10.2023

Номер заявки Application number	Дата подання Filing date	Номер свідоцтва Number of certificate	Назва сорту Variety denomination	Автор(и) сорту(ів) Author(s) of Variety	Дата видачі Date of granting
22671001	20.12.2022	230345	Срібне мереживо Sribne merezhyvo	Корабльова Ольга Анатоліївна Korablova Olha Anatoliivna	04.10.2023
22671001	20.12.2022	230345	Срібне мереживо Sribne merezhyvo	Рахметов Джамал Бахлулович Rakhmetov Dzhamal Bakhulovych	04.10.2023
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component					
21915001	25.01.2021	230607	Л204А L204A	Романюк Оксана Олександрівна Romaniuk Oksana Oleksandrivna	19.10.2023
21915001	25.01.2021	230607	Л204А L204A	Колібабчук Тетяна Володимирівна Kolibabchuk Tetiana Volodymyrivna	19.10.2023
21915001	25.01.2021	230607	Л204А L204A	Корнєєва Мирослава Олександрівна Kornieieva Myroslava Oleksandrivna	19.10.2023
21915001	25.01.2021	230607	Л204А L204A	Мазур Зоя Олександрівна Mazur Zoia Oleksandrivna	19.10.2023
21915001	25.01.2021	230607	Л204А L204A	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	19.10.2023
21915002	25.01.2021	230608	Л204А Колосисте Kolosyste	Романюк Оксана Олександрівна Romaniuk Oksana Oleksandrivna	19.10.2023
21915002	25.01.2021	230608	Колосисте Kolosyste	Роїк Микола Володимирович Roik Mykola Volodymyrovych	19.10.2023
21915002	25.01.2021	230608	Колосисте Kolosyste	Мазур Зоя Олександрівна Mazur Zoia Oleksandrivna	19.10.2023
21915002	25.01.2021	230608	Колосисте Kolosyste	Колібабчук Тетяна Володимирівна Kolibabchuk Tetiana Volodymyrivna	19.10.2023
21915002	25.01.2021	230608	Колосисте Kolosyste	Корнєєва Мирослава Олександрівна Kornieieva Myroslava Oleksandrivna	19.10.2023
Ріпак (озимий) – батьківський компонент <i>Brassica napus</i> L. <i>oleifera</i> Rape Seed (Winter) – parental component					
20940013	27.10.2020	230537	K1F0A09 K1F0A09	Комарова Ірина Борисівна Komarova Iryna Borysivna	04.10.2023
20940013	27.10.2020	230537	K1F0A09 K1F0A09	Тарасова Галина Арнольдівна Tarasova Halyna Arnoldivna	04.1.2023
20940013	27.10.2020	230537	K1F0A09 K1F0A09	Лісняк Ганна Данилівна Lisniak Hanna Danylivna	04.10.2023

Інші відомості, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Other notifications listed in the Plant Varieties Register in Ukraine

Відповідно до листа Міністерства аграрної політики та продовольства України № 21-1331-09/24068 від 17.10.2023 «Про погодження внесення змін» щодо сорту малини ПОЛАНА (заявка № 20296003) стосовно виправлення технічної помилки, а саме внесення зміни коду заявника, змінено код заявника 1951 (Інститут огородництва) на код 2835 (Інститут Огородництва).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1765 від 05.10.2023 «Про державну реєстрацію сорту» здійснено державну реєстрацію майнового права на поширення сорту шляхом

набуття права підтримувача заявником Товариством з обмеженою відповідальністю «Свितязь» сорту огірка посівного Маркетмор 70 (заявка № 23110010).

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1769 від 06.10.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини стосовно сортів рослин згідно з переліком.

ПЕРЕЛІК

сортів рослин, щодо яких вносяться зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні

№ з/п	Назва таксону	Номер заявки	Назва сорту	Рік реєстрації	№ свідоцтва	Ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту рослини	
						Зазначені відомості	Запропоновані зміни до відомостей
1	Соняшник однорічний	20039009	Террасол	2021	211277	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірасол-Сід»-Україна»	Товариство з обмеженою відповідальністю «МІРАСОЛ СІД ГРУП»
2	Соняшник однорічний	18039009	Бонасол ЖМР	2020	200139		
3	Соняшник однорічний	18039008	Тріполі	2020	201231		
4	Соняшник однорічний	18039007	Булерія	2020	201242		
5	Соняшник однорічний	17039065	Інесол	2020	200109		
6	Соняшник однорічний	14039001	Кастело	2016	161003		
7	Соняшник однорічний	14039002	Гіперсол	2016	161004		
8	Соняшник однорічний	14039003	Сірокко	2016	160743		
9	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939134	ХА900	2022	220811		
10	Соняшник однорічний – батьківський компонент	20939133	БР0Л8015	2022	220810		
11	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939044	2603Х1093	2020	200149		
12	Соняшник однорічний – батьківський компонент	17939045	113 Р	2020	200150		

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1786 від 09.10.2023 «Про внесення змін до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» внесено зміни до відомостей, що містяться в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в

Україні, щодо ім'я (найменування) власника майнового права на поширення сорту пшениці м'якої (озимої) Артеміда (заява № 02007022, рік реєстрації – 2008, свідоцтво № 08233), виключивши слова «Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»».

Перелік сортів рослин, придатних для поширення в Україні

List of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Відомості про сорти рослин, які занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Information on plant varieties entered into the State Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник (и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарські: злаки Agricultural: Field cereal											
Пшениця м'яка (озима) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Winter) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
© 20012039	ЮСОН ЮСОН / YuSON	C3	1751	1751	1751		2023	ЛП			
© 21012001	Мізинка Мізинка / Mizynka	C3	1581	1581	1581		2023	ЛП			
© 21012002	Малуша Малуша / Malusha	C3	1581	1581	1581		2023	ЛП			
© 20012042	Новинка Новинка / Novynka	C3	2706	2706	2706		2023	ЛП			
© 21012007	ЛГ Оптиміст LG Optimist / LG Optimist	C3	793	793	793		2023	ЛП			
© 20012040	Сонцедар Сонцедар / Sontsedar	C3	1751	1751	1751		2023	ЛП			
© 20012041	Гусар Гусар / Husar	C3	1751	1751	1751		2023	ЛП			
19012079	Євразія Євразія / Yevraziia	C3	1571	1571			2023	ЛП			
© 21012012	МІП Відзнака МІП Відзнака / MIP Vidznaka	C3	1589	2859	2859		2023	ЛП			
© 21012040	Пам'яті Горлача Пам'яті Горлача / Pam'iaty Horlacha	C3	1635 2626	1635 1097	1635 1097		2023	ЛП			
© 21012041	Трембіта білоцерківська Trembita bilotserkivska / Trembita bilotserkivska	C3	1635 2626	1635 1097	1635 1097		2023	ЛП			
21012005	Київська 22 Kyivska 22 / Kyivska 22	F1	355	355			2023	ЛП			
© 21012015	Загадка одеська Загадка одеська / Zahadka odeska	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
21012003	Біла Біла / Bila	C3	355	355			2023	ЛП			
© 21012016	Вірність одеська Вірність одеська / Virnist odeska	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
© 21012017	Етуаль Етуаль / Etual	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
© 21012018	Творчість одеська Творчість одеська / Tvorchist odeska	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
© 21012019	Епітет Epitet / Epitet	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
© 21012020	Дністрянка одеська Дністрянка одеська / Dnistrianka odeska	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
21012004	Трояна Трояна / Troiana	C3	355	355			2023	ЛП			
21012006	Синтетик 240 Синтетик 240 / Syntetyk 240	C3	355	355			2023	ЛП			
© 21012014	МІП Довіра МІП Довіра / MIP Dovira	C3	1589	2859	2859		2023	ЛП			
20012044	НОВІК NOVIC / NOVIC	C3	2653	485			2023	ЛП			
20012045	Соліфлор КС SOLIFLOR CS / SOLIFLOR CS	C3	2653	485			2023	ЛП			
© 21012011	МІП Дарунок МІП Дарунок / MIP Darunok	C3	1589	2859	2859		2023	ЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
© 20012043	Носівочка <i>Nosivochka / Nosivochka</i>	C3	1990	1990	1990		2023	ЛП			
23012001	СОЕСКИ <i>SOESKI / SOESKI</i>	C3	2890	2890			2023				
23012039	Селебріті <i>Celebrity / Celebrity</i>	C3	796	796			2023				
23012041	Базіліо <i>Basilio / Basilio</i>	C3	796	796			2023				
23012040	Провіденс <i>Providence / Providence</i>	C3	796	796			2023				
21012010	Бісквіт <i>Biskvit / Biskvit</i>	C3	2783	2783			2023	ЛП			
© 21012013	МІП Аеліта <i>MIP Aelita / MIP Aelita</i>	C3	1589	2859	2859		2023	ЛП			
© 21012021	Епіграф <i>Epihraf / Epihraf</i>	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
© 21012038	ФОРСАЙТ <i>FORSAIT / FORSAIT</i>	C3	2805 2806	2805 2806	2805 2806		2023	ЛП			
© 21012030	Атрибут <i>Attribut / Attribut</i>	C3	807	807	807		2023	ЛП			
23012042	Престанс <i>Prestance / Prestance</i>	C3	796	796			2023				
Пшениця м'яка (яра) <i>Triticum aestivum</i> L. Soft Wheat (Spring) (<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol.; <i>Triticum vulgare</i> Host.; <i>Triticum hybernum</i> L.; <i>Triticum cereale</i> Schrank; <i>Triticum sativum</i> Lam.)											
© 20013004	Колос Поліський <i>Kolos Poliskyi / Kolos Poliskyi</i>	C3	1626	1626	1626		2023	ЛП			
© 20013008	МІП Веснянка <i>MIP Vesnianka / MIP Vesnianka</i>	C3	1589	2859	2859		2023	ЛП			
20013012	Реліквія <i>Relikviia / Relikviia</i>	C3	2753 2754 2755 2756 2757	2753 2754 2755 2756 2757			2023	ЛП			
© 20013003	Танок <i>Tanok / Tanok</i>	C3	1626	1626	1626		2023	ЛП			
© 22013001	Перібонка <i>Peribonka / Peribonka</i>	C3	2739	2739	2739		2023	ЛП			
22013002	ІС ЯРІЕЛЛА <i>IS JARIELLA / IS JARIELLA</i>	C3	2858	2858			2023	ЛП			
© 22013003	Сінді <i>Cindy / CINDY</i>	C3	2076 2616	880 2616	880 2616		2023	ЛП			
Пшениця тверда (яра) <i>Triticum durum</i> Desf. Durum Wheat (Spring) (<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) Husn.; <i>Triticum turgidum</i> ssp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i>; <i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>turgidum</i> conv. <i>durum</i> (Desf.) MacKey; <i>Triticum turgidum</i> L.; <i>Triticum sativum durum</i> Pers.; <i>Triticum vulgare durum</i> Alef.; <i>Triticum vulgare</i> Vill. s. str.; <i>Triticum durum</i> Koern.; <i>Triticum sativum durum</i> Hackel; <i>Triticum tenax</i> B. <i>durum</i> Asch. et Graebn.; <i>Triticum alatum</i> Peterm.; <i>Triticum dicoccum tenaces</i> Perc.; <i>Triticum pyramidale</i> Pers.)											
© 21006001	Аурата <i>Aurata / Aurata</i>	C3	1581	1581	1581		2023	Л			
23006006	БЕРІНГ <i>BERING / BERING</i>	C3	2440	2440			2023				
23006001	Відеодур <i>Videodur / Videodur</i>	C3	1564	1564			2023				
Пшениця спельта (озима) <i>Triticum spelta</i> L. Spelt, Dinkel Wheat, Hulled Wheat (<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>spelta</i> (L.) Thell.)											
21539001	Білбері <i>Bilberi / Bilberi</i>	C3	2783	2783			2023	ЛП			
Жито посівне (озиме) <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
© 21015001	Хлібна нива <i>Khlibna niva / Khlibna niva</i>	C	1751	1751	1751		2023	ЛП			
© 21015002	Нива волошкова <i>Nyva voloshkova / Nyva voloshkova</i>	C	1581	1581	1581		2023	ЛП			
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент <i>Secale cereale</i> L. Rye (Winter) – parental component (<i>Triticum secale</i> Link; <i>Triticum cereale</i> Salisb.)											
© 21915001	Л204А <i>L204A / L204A</i>	C3	1751	1751	1751		2023				
© 21915010	ХЮР035 <i>HYR035 / HYR035</i>	C3	1900	1900	1900		2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
® 21915002	Колосисте <i>Kolosiste</i> / <i>Kolosyste</i>	C3	1751	1751	1751		2023				
® 21915009	Л2177ПхЛ2184Н <i>L2177PxL2184N</i> / <i>L2177PkhL2184N</i>	F1	1900	1900	1900		2023				
Тритикале (озиме) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Winter) (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus; x <i>Triticale</i>; x <i>Triticosecale</i> Wittmack)											
® 21022001	Златоуст <i>Zlatoust</i> / <i>Zlatoust</i>	C3	1581	1581	1581		2023	ЛП			
Тритикале (яре) <i>Triticosecale</i> Witt. Triticale (Spring) (<i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus; x <i>Triticale</i>; x <i>Triticosecale</i> Wittmack)											
® 21288001	Кріпость харківська <i>Kripost' kharkivska</i> / <i>Kripost' kharkivska</i>	C3	1581	1581	1581		2023	ЛП			
® 21288002	Опора харківська <i>Opora kharkivska</i> / <i>Opora kharkivska</i>	C3	1581	1581	1581		2023	ЛП			
Овес посівний (ярий) <i>Avena sativa</i> L. Oat (Spring) (<i>Avena byzantina</i> K. Koch; <i>Avena byzantina</i> var. <i>alba</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>albomutica</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>anopla</i> Mordv.; <i>Avena byzantina</i> var. <i>byzantina</i> K. Koch; <i>Avena byzantina</i> var. <i>cinnamomea</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov; <i>Avena byzantina</i> var. <i>cremea</i> Mordv. ex Rodionova & Soldatov); <i>Avena volgensis</i> (Vavilov) Nevski)											
® 20011003	Вудленд <i>Woodland</i> / <i>Woodland</i>	C3	2739	2739	2739		2023	ЛП			
® 20011004	Фостер <i>Foster</i> / <i>Foster</i>	C3	2739	2739	2739		2023	ЛП			
Ячмінь звичайний (озимий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Winter) (<i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i>; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
21019001	Тур <i>Tur</i> / <i>Tur</i>	C3	2783	2783			2023	ЛП			
Ячмінь звичайний (ярий) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (Spring) (<i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i>; <i>Zeocroton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
® 20020010	Шубін <i>Shubin</i> / <i>Shubin</i>	C3	2706	2706	2706		2023	СП			
® 20020008	Генерал <i>General</i> / <i>General</i>	F1	2706	2706	2706		2023	СП			
® 20020009	Незламний <i>Nezlamnyi</i> / <i>Nezlamnyi</i>	C3	2706	2706	2706		2023	СП			
® 21020005	Брант <i>Brant</i> / <i>Brant</i>	C3	1669	1669	1669		2023	СЛП			
® 22020004	Покоління <i>Pokolinnia</i> / <i>Pokolinnia</i>	C3	2706	2706	2706		2023	СЛП			
22020001	ІС МАЛТИГО <i>IS MALTIGO</i> / <i>IS MALTIGO</i>	C3	2858	2858			2023	ЛП			
22020009	Тася <i>Tasja</i> / <i>Tasja</i>	C3	2302	2302			2023	ЛП			
22020008	Ювента <i>Juvanta</i> / <i>Juvanta</i>	C3	2302	2302			2023	ЛП			
Кукурудза звичайна <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn (<i>Zea americana</i>; <i>Zea alba</i>; <i>Zea vulgaris</i> Mill.; <i>Mays zea</i> Gaertn; <i>Zea segetalis</i> Salisb.; <i>Mays americana</i> Baumg.; <i>Thalasia mays</i> O. Kuntze.)											
21009139	ЕС КАРУ <i>ES KARRU</i> / <i>ES KARRU</i>	F1	2890	2890			2023				
21009142	ЛІД2020Ц <i>LID2020C</i> / <i>LID2020C</i>	F1	2890	2890			2023				
21009128	ЛІД2210Ц <i>LID2210C</i> / <i>LID2210C</i>	F1	2890	2890			2023				
21009141	ЕС МІДВЕЙ <i>ES MIDWAY</i> / <i>ES MIDWAY</i>	F1	2890	2890			2023				
Кукурудза звичайна – батьківський компонент <i>Zea mays</i> L. Maize, Corn – parental component											
21909114	ПХ4ДЗС <i>PH4D3S</i> / <i>PH4D3S</i>	C3	2715	2715			2023				
21909115	ПХ4ДЗЦ <i>PH4D3C</i> / <i>PH4D3C</i>	C3	2715	2715			2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21909121	1ПТФТ47 1PTFT47 / 1PTFT47	C3	2715	2715			2023				
21909124	1ПВНВ47 1PWNV47 / 1PWNV47	C3	2715	2715			2023				
21909210	ЕГ7А71 EG7A71 / EG7A71	C3	2890	2890			2023				
21909204	ЕС7754 ES7754 / ES7754	C3	2890	2890			2023				
Ячмінь звичайний (дворучка) <i>Hordeum vulgare</i> L. Barley (both winter and spring sowing) (<i>Hordeum distichum</i> jessen; <i>Hordeum lagunculiforme</i> (Bachteev) Bachteev ex Nikif.; <i>Hordeum vulgare</i> L. convar <i>distichon</i> L.; <i>Hordeum vulgare</i> L. ssp <i>polystichum</i> Hall Schinz et Kell; <i>Hordeum vulgare</i> (L.) emend. Vav. et Bacht.; <i>Hordeum distichum</i> L.; <i>Hordeum distichon</i> L. emend. Lam.; <i>Hordeum aestivum</i> Hall; <i>Hordeum zeocriton</i> L.; <i>Zeocriton distichon</i> ; <i>Zeocriton commune</i> Beauv.; <i>Hordeum vulgare</i> ssp. <i>distichum</i> grex <i>culta</i> Regel; <i>Hordeum sativum</i> Jessen; <i>Hordeum hexastichum</i> L.)											
© 20612001	Русин Rusyn / Rusyn	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
© 20612002	Еволюція Evolutsiia / Evoliutsiia	C3	1591	1591	1591		2023	ЛП			
Сільськогосподарські: бобові Agricultural: Field pulse Горох посівний (зерновий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (<i>Pisum arvense</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L. convar <i>axiphium</i> Alef; <i>Pisum sativum</i> L. convar <i>medullare</i> Alef emend C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. convar <i>sativum</i> ; <i>Pisum uniflorum</i> Hort.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i>) Gov.)											
© 22023001	Протін Protin / Protin	C3	2076	880	880		2023	Л			
© 18023003	Велемень Veleten / Veleten	C3	1591	1591	1591		2023	Л			
© 21023001	Аякс Aiaks / Aiaks	C3	1581	1581	1581		2023	ЛП			
Нут звичайний <i>Cicer arietinum</i> L. Chick-Pea (<i>Cicer grossum</i> Salisb.; <i>Cicer sativum</i> Schkuhr; <i>Cicer physodes</i> Rchb.; <i>Cicer rotundum</i> Jord.; <i>Cicer sintensii</i> Hausskn.; <i>Cicer edessanum</i> Stapf.)											
© 20028001	Октавіус Oktaviys / Oktavius	C3	1669	1669	1669		2023	СЛ			
Горох посівний (озимий) <i>Pisum sativum</i> L. Pea (Winter) (<i>Pisum arvense</i> L.; <i>Pisum sativum</i> L. convar <i>axiphium</i> Alef; <i>Pisum sativum</i> L. convar <i>medullare</i> Alef emend C. O. Lehm; <i>Pisum sativum</i> L. convar <i>sativum</i> ; <i>Pisum sativum</i> L. spp. <i>sativum</i> conv. <i>speciosum</i> Dierb.; <i>Pisum macrospermum</i> Hort.; <i>Pisum vulgare</i> Jundz.; <i>Pisum sativum</i> L. (s. <i>amplissima</i>) Gov.)											
23559003	Ескрім Escrime / Escrime	C3	796	796			2023				
23559001	Паддл Paddle / Paddle	C3	796	796			2023				
23559002	Апперкот Uppercut / Uppercut	C3	796	796			2023				
Соя культурна <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soya Bean (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill; <i>Glycine hispida</i> var. <i>lutea</i> Skvortsov; <i>Glycine soja</i> (L.) Merr.; <i>Glycine hispida</i> var. <i>brunnea</i> Skvortsov; <i>Glycine gracilis</i> Skvortsov; <i>Phaseolus max</i> L.; <i>Dolichos soja</i> L.; <i>Soja hispida</i> Moench; <i>Phaseolus sordilis</i> Salisb.; <i>Soja japonica</i> Savi; <i>Soja angustifolia</i> Miq.; <i>Glycine tabacina</i> ; <i>Glycine tomentosa</i> Benth.; <i>Glycine hispida</i> (Moench) Maxim.; <i>Soja soja</i> Karst.; <i>Soja max</i> Piper)											
21045026	ЛІД Промотор LID Promotor / LID Promotor	C3	2890	2890			2023				
22045026	Аннабелла Annabella / Annabella	C3	1498	1498			2023				
23045014	Акасса Acassa / Acassa	C3	2011	2011			2023				
23045013	Аурикула Auricula / Auricula	C3	2011	2011			2023				
21045024	ЛІД Конструктор LID Constructor / LID Constructor	C3	2890	2890			2023				
Сільськогосподарські: круп'яні Agricultural: Field groats Просо посівне <i>Panicum miliaceum</i> L. Common Millet (<i>Milium panicum</i> Mill.; <i>Milium esculentum</i> Moench; <i>Panicum milium</i> Pers.; <i>Leptoloma miliacea</i> Smith.)											
© 21014001	Переможне Peremozhne / Peremozhne	C3	1581	1581	1581		2023				
Сорго звичайне (двокольорове) <i>Sorghum bicolor</i> L. Sorghum (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench; <i>Holcus sorghum</i> ; <i>Holcus bicolor</i> L.; <i>Holcus arduini</i> Gmel.; <i>Andropogon bicolor</i> Roxb.; <i>Andropogon halepensis</i> var. <i>bicolor</i> Vined et Druce.)											
23018001	ЗЕАЛАНДІЯ ZEALANDIA / ZEALANDIA	F1	2890	2890			2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Сільськогосподарський: олійні та прядивні Agricultural: Oil and Fibre Соняшник однорічний Helianthus annuus L. Sunflower (Helianthus annuus [unranked] lenticularis (Douglas) Cockerell; Helianthus annuus subsp. annuus L.; Helianthus annuus subsp. jaegeri (Heiser) Heiser; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)											
20039050	Ірінасол Irinasol / Irinasol	F1	1498	1498			2023				
22039018	Софіасол Sofiasol / Sofiasol	F1	1498	1498			2023				
22039058	СТАРФАЕР STARFIRE / STARFIRE	C3	2720	2720			2023				
23039002	КСІЛО XILO / XILO	F1	2440	2440			2023				
21039105	1018Л КЛП 1018L CLP / 1018L CLP	F1	2890	2890			2023				
23039010	ІНСАН 120 INSUN 120 / INSUN 120	F1	2890	2890			2023				
21039087	ЛІД1015Л СУ LID1015L SU / LID1015L SU	F1	2890	2890			2023				
23039003	НЕМО NEMO / NEMO	F1	2440	2440			2023				
21039083	ЕС ГАМА ES GAMA / ES GAMA	F1	2890	2890			2023				
23039012	6027Л КЛП 6027L CLP / 6027L CLP	F1	2890	2890			2023				
21039088	ІНСАН 288 КЛП INSUN 288 CLP / INSUN 288 CLP	F1	2890	2890			2023				
22039035	Н5Х493 КЛ N5H493 CL / N5H493 CL	F1	1985	1985			2023				
23039014	Інсан 277 СУ Insun 277 SU / Insun 277 SU	F1	2890	2890			2023				
21039090	1047 Л КЛП 1047 L CLP / 1047 L CLP	F1	2890	2890			2023				
21039091	ІНСАН 299 СУ INSUN 299 SU / INSUN 299 SU	F1	2890	2890			2023				
Соняшник однорічний – батьківський компонент Helianthus annuus L. Sunflower – parental component (Helianthus annuus [unranked] lenticularis (Douglas) Cockerell; Helianthus annuus subsp. annuus L.; Helianthus ovatus Lehm.; Helianthus colossus O. Ktze.; Helianthus erythrocarpus Bartl.; Helianthus multiflorus Hook.; Helianthus grandiflorus Wender.; Helianthus cultus Venzl.; Helianthus ruderalis Venzl.)											
20939146	ПХ1032А PH1032A / PH1032A	C3	2715	2715			2023				
19939087	7ПВДХ67А 7PWDH67A / 7PWDH67A	C3	2715	2715			2023				
21939047	7ПВЛХ62Р 7PWLH62R / 7PWLH62R	C3	2715	2715			2023				
21939055	7ПУХД10А 7PUHD10A / 7PUHD10A	C3	2715	2715			2023				
21939046	7ПУГК32Р 7PUGQ32R / 7PUGQ32R	C3	2715	2715			2023				
21939056	7ПУКЦ97А 7PUKC97A / 7PUKC97A	C3	2715	2715			2023				
21939087	Р8035М2ЖІ R8035M2JI / R8035M2JI	C3	1435	1435			2023				
21939089	Р8035М1ЖС R8035M1JS / R8035M1JS		1435	1435			2023				
21939098	Ф7АХ2МЖКОА F7AX2MJKOA / F7AX2MJKOA		1435	1435			2023				
21939102	Ф19002МЖСА F19002MJSA / F19002MJSA		1435	1435			2023				
21939091	Р9ТК6С R9TQ6S / R9TQ6S		1435	1435			2023				
21939094	Р15ЕІ2М R15EI2M / R15EI2M		1435	1435			2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Пінак (озимий) Brassica napus L. oleifera Rape Seed (Winter) (Brassica napus var. napus; Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus; Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk; Brassica napus L. var. oleifera Metzg.; Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)											
20040039	Алекс Алекс / Aleks	П	1669	1669	1669		2023	СЛ			
20040040	Юстас Юстас / Yustas	П	1669	1669	1669		2023	СЛП			
21040027	Ромео Ромео / Romeo	F1	807	807	807		2023	Л			
21040028	Кондор Condor / Condor	F1	807	807	807		2023	ЛП			
21040029	Десперадо Desperado / Desperado	F1	807	807	807		2023	Л			
21040030	Юрек Jurek / Jurek	F1	807	807	807		2023	ЛП			
21040032	Даззлер Dazzler / Dazzler	F1	807	807	807		2023	Л			
21040033	ІНВ 2020 INV 2020 / INV 2020	F1	807	807	807		2023	Л			
21040052	Фамулус Famulus / Famulus	F1	807	807	807		2023	П			
22040032	Янош Janosh / Janosh	F1	912	912			2023				
21040031	Пірол Piro / Piro	F1	807	807	807		2023	Л			
23040048	Рамзес Ramses / Ramses	F1	2851	2851			2023	СЛП			
Пінак (озимий) – батьківський компонент Brassica napus L. oleifera Rape Seed (Winter) – parental component (Brassica napus var. napus; Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus; Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk; Brassica napus L. var. oleifera Metzg.; Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)											
23940014	Сінді КС Cindi CS / Cindi CS	C3	2890	2890			2023				
Пінак (ярий) Brassica napus L. oleifera Rape Seed (Spring) (Brassica napus var. napus; Brassica napus L. emend. Metzg. ssp. napus; Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk; Brassica napus L. var. oleifera Metzg.; Brassica oleifera Moench.; Brassica oleifera Delile; Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg.; Brassica rapa L. ssp. napus Briquet.)											
21041003	ІНВ300 КЛ ПС INV300 CL PS / INV300 CL PS	F1	2602	2602			2023				
Льон низький (олійний, кудряш) Linum humile Mill. Linseed (Proles brevicaule Vav. et Ell)											
21035001	Ланселот Ланселот / Lancelot	C3	1626	1626	1626		2023	СЛП			
Гірчиця біла Sinapis alba L. White Mustard (Raphanus albus Crantz; Sinapis hispida Tenore; Bonnania officinalis Presl; Napus leucosinapis Schimper et Sponner.; Sinapis album Chev.; Eruca alba Noulet; Brassica alba Rabenhorst; Crucifera lampsana Krause; Sinapis dissecta Lag.; Brassica dissecta Schmalh.)											
23380001	КОЗАЧКА КОЗАЧКА / KOZACHKA		3223 3224 3225	3223 3224 3225	3223 3224 3225		2023	СЛП	корм		
Льон звичайний (озимий) Linum usitatissimum L. Flax; Linseed (Linum humile Mill.; Linum usitatissimum L. f. elongate; Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell, Proles elongata Vav et Ell)											
21249001	ЛСЛ 1133 LSL 1133 / LSL 1133	C3	2804	2804	2804		2023	СЛП			
Сільськогосподарські: картопля Agricultural: Potato Картопля Solanum tuberosum L. Potato (Solanum tuberosum ssp. tuberosum; Solanum tuberosum var. chiloense DC.; Solanum tuberosum var. cultum DC.; Solanum tuberosum var. sabini DC.; Solanum fonckii Phil.; Solanum andigenum var. digitobatosum Varg.; Solanum andigenum var. carhua Varg.)											
20088009	Тайгер Tiger / Tiger		2660	2660	2660		2023	П			
20088007	ТРАЙПЛ7 TRIPLE7 / TRIPLE7		2660	2660	2660		2023	ЛП			
20088002	Санред Sunred / Sunred		2660	2660	2660		2023	ЛП			
20088001	АЛВЕРСТОН РАССЕТ Alverstone Russet / Alverstone Russet		2660	2660			2023	ЛП			
20088027	Кардіма CARDYMA / CARDYMA		2660 2765	2660 2765	2660 2765		2023	ЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
21088004	Роксоланівська <i>Roksolanivska</i> / <i>Roksolanivska</i>		2828	2828			2023	П			
23088009	Дейзі <i>Daisy</i> / <i>Daisy</i>		2584	2584			2023				
® 20088026	Камелія <i>CAMELIA</i> / <i>CAMELIA</i>		2660	2660	2660		2023	ЛП			
20088024	Коразон <i>Corazon</i> / <i>Corazon</i>		1652	1652			2023	П			
20088025	СПЕКТРА <i>SPECTRA</i> / <i>SPECTRA</i>		1652	1652			2023	ЛП			
Сільськогосподарські: кормові Agricultural: Fodder											
Костриця червона Festuca rubra L. Red Fescue, Creeping Fescue (Festuca rubra L. sensu lato; Festuca rubra L. s. str.; Festuca ovina var. rubra Smith; Festuca duriuscula var. rubra Wood.; Festuca oregana Festucaasey; Festuca ovina ssp. rubra Hook.; Festuca rubra var. littoralis Vasey; Festuca vallicola; Festuca earlei)											
® 21377002	Деметра <i>Demetra</i> / <i>Demetra</i>	П	1626	1626	1626		2023	СЛП			
Горошок посівний (вика) (ярий) Vicia sativa L. Common Vetch (Spring) (Vicia amphicarpa L.; Vicia notate Gilib.; Vicia leucosperma Moench; Vicia segetalis Thuill.; Faba sativa Bernh.; Vicia communis Rouy et Foucaud.)											
® 20177001	Оазис <i>Oazys</i> / <i>Oazys</i>	СЗ	1751	1751	1751		2023	ЛП			
® 21177003	Нітро <i>Nitro</i> / <i>Nitro</i>	СЗ	2805 2806	2805 2806	2805 2806		2023	П			
20177004	Ворскла <i>Vorskla</i> / <i>Vorskla</i>	СЗ	1943	1943			2023	ЛП			
® 21177002	Пірит <i>Piryt</i> / <i>Piryt</i>	СЗ	1669	1669	1669		2023	П			
Еспарцет виколистий Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin (Onobrychis sativa Lam.)											
® 23234001	ВАЛЛОР <i>VALLOR</i> / <i>VALLOR</i>	С	3227	3227	3227		2023	СЛП	корм		
Конюшина лучна (червона) Trifolium pratense L. Red Clover (Trifolium purpureum Gilib. (non Lois.); Trifolium sativum Crome; Trifolium pratense var. foliosum Brand; Trifolium foliosum (Brand) Min.)											
® 20155005	Атлант Носівський <i>Atlant Nosivskiy</i> / <i>Atlant Nosivskiy</i>	С	1990	1990	1990		2023	ЛП			
20155002	Любава <i>Liubava</i> / <i>Liubava</i>	П	1658	1658			2023	ЛП			
® 20155004	Андріана <i>Andriana</i> / <i>Andriana</i>	С	1946	1946	1946		2023	ЛП			
® 20155003	Оплески <i>Oplesky</i> / <i>Oplesky</i>	П	1626	1626	1626		2023	ЛП			
® 23155001	МЕЛІФОР <i>MELIFOR</i> / <i>MELIFOR</i>	С	3227	3227	3227		2023				
Люцерна посівна Medicago sativa L. Lucerne (Medicago falcata Lam. (non L.); Medicago coerulea Less.)											
® 23196001	МЕДИСАН <i>MEDISAN</i> / <i>MEDISAN</i>	С	3227	3227	3227		2023	СЛП	корм		
23196002	ІЗОЛА <i>ISOLA</i> / <i>ISOLA</i>	П	2440	2440	2023						
Тритикале (дворучка) Triticosecale Witt. Triticale (both winter and spring sowing) (Triticosecale Wittm. ex A. Camus; x Triticale; x Triticosecale Wittmack)											
® 21622001	Егор <i>Yehor</i> / <i>Yehor</i>	С	2610	2610	2610		2023				
Сільськогосподарські: овочеві Agricultural: Vegetable											
Баклажан Solanum melongena L. Egg Plant (Solanum longum L.; Melongena teres Mill; Solanum undatum Lam.; Solanum esculentum Dun.)											
22093005	МІРАБЕЛЬ <i>MIRABELLE</i> / <i>MIRABELLE</i>	F1	1852	1852			2023				
Диня звичайна Cucumis melo L. Melon (Melo sativus Sarg.; Melo adana Pang.; Cucumis melo convar. adana (Pang.) Greb.)											
22147001	Мегарин <i>Megarín</i> / <i>Megarín</i>	F1	2841	2841			2023	СЛЗГр	свж		
Кабачок Cucurbita pepo var. giraumontia Filov Vegetable Marrow, Squash											
22148001	Контак <i>Kontak</i> / <i>Kontak</i>	F1	2841	2841			2023	СЛП	свж, конс, пер		
23148002	Імператор <i>Imperator</i> / <i>Imperator</i>	F1	1833	1833			2023	СЛП			

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
23148003	Кефрен Kefren / Kefren	F1	1730	1730			2023				
21148002	Еклер Ekler / Ekler		2819	2819			2023	С	свж		
Кавун звичайний <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Watermelon (<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai ssp. <i>vulgaris</i> Fursa var. <i>vulgaris</i> ; <i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.; <i>Cucurbita citrullus</i> L.; <i>Momordica lanata</i> Thunb.; <i>Cucumis sativus</i> Battich; <i>Citrullus pasteca</i> Sageret; <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Mansf.)											
20146012	ГРІН ДЖАР GREEN JAR / GREEN JAR	F1	1852	1852			2023	СЛПЗГр	свж		
20146011	СВ3807ВТ SV3807WT / SV3807WT	F1	1852	1852			2023	СЛП	свж		
22146002	Медун Medun / Medun	F1	2841	2841			2023	СЛЗГр	свж		
® 22146004	Грей Белле Грей Белле / Hrei Belle	С3	1163	1163	1163		2023	СЛП	свж		
® 22146003	Чарльстон Грей Делюкс Чарльстон Грей Делюкс / Charlston Hrei Deluiks	П	1163	1163	1163		2023	СЛП	свж		
22146005	ЄЛОВ ЛАВ YELLOW LOVE / YELLOW LOVE	F1	2020	2020			2023	СЛП	свж		
22146006	АМІНА AMINA / AMINA	F1	2662	2020			2023	СЛП	свж		
22146009	БРІКСБЕРРІ BRYXBERRY / BRYXBERRY	F1	1852	1852			2023				
21146006	Жако Zhako / Zhako		2819	2819			2023	СЛ	свж		
Капуста білоголова <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alba</i> DC. White Cabbage (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> (L.) Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.; <i>Brassica capitata</i> DC.; <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>capitata</i> laevis Metzq.; <i>Brassica oleracea</i> L.; <i>Brassica</i> (White Cabbage))											
® 21096006	Сплеш болл Splash ball / Splash ball	F1	2813	2813	2813		2023	СЛПЗГр	свж		
22096002	Кората Korata / Korata	F1	2841	2841			2023	СЛП	свж, пер		
® 21096011	Тайсон Tyson / Tyson	F1	2086	2086	2086		2023	СЛПЗГр	свж		
23096005	МАРЛУ MARLOO / MARLOO	F1	1833	1833			2023	СЛП			
22096004	Кабінет Kabinet / Kabinet	F1	1997	1997			2023				
21096007	Ельза Elza / Elza		2819	2819			2023	ЗГр	свж		
Капуста пекінська <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>pekinensis</i> (Lour.) Kitam. Chinese Cabbage (<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt; <i>Brassica campestris</i> subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) G. Olsson; <i>Brassica pe-tsai</i> L. H. Bailey; <i>Brassica pekinensis</i> (Lour.) Rupr.; <i>Brassica rapa</i> subvar. <i>pe-tsai</i> (L. H. Bailey) Kitam.; <i>Brassica rapa</i> var. <i>glabra</i> Regel; <i>Brassica pekinensis</i> L.; <i>Sinapis cernua</i> Thunb.; <i>Sinapis pekinensis</i> Lour.; <i>Brassica cernua</i> (Thunb.) Forbes et Hemsley; <i>Brassica Pe-tsai</i> Bailey)											
23135001	КІСЕКІ KISEKI / KISEKI	F1	1833	1833			2023	СЛП			
Капуста цвітна <i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i> Cauliflower (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef.; <i>Brassica cauliflora</i> (Mill.) Lizg.; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> Plenck; <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.; <i>Brassica botrytis</i> Mill.; <i>Brassica cauliflora</i> Garsaul; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> Helm; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cauliflora</i> DC. et subvar. <i>cymosa</i> Lam.; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>asparagoides</i> f. <i>albida</i> et f. <i>violascens</i> Thell.; <i>Brassica asparagoides</i> Dalechampi)											
21101005	ДЕПУРПЛ DEPURPLE / DEPURPLE	F1	2643	1219			2023				
21101002	ЕЛЕКТРА ELECTRA / ELECTRA	F1	1050	1050			2023	СЛ	свж		
21101004	КЛЕМЕНТИН CLEMENTINE / CLEMENTINE	F1	1050	1050			2023	СЛ	свж		
23101005	АЛСТОН ALSTON / ALSTON	F1	1833	1833			2023	СЛП			
23101004	ВАЙТОН WHITON / WHITON	F1	1833	1833			2023	СЛП			
Вігна промениста (квасоля золотиста, маш) <i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek (<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.) Mung Bean (<i>Phaseolus radiatus</i> L.)											
® 20024001	Бераш Berash / Berash	С3	2718	2718	2718		2023	СЛ	зерно		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Квасоля звичайна (овочева) Phaseolus vulgaris L. French Bean (Phaseolus vulgaris (L.) Savi; Phaseolus nanus L.; Phaseolus romanus; Phaseolus gonospermus; Phaseolus saponaceus; Phaseolus sphaericus; Phaseolus haematocarpus Savi; Phaseolus compressus DC.; Phaseolus angulosus Schuebl. et Martens; Phaseolus capensis Hort.; Phaseolus cruentus Hort.; Phaseolus zedra; Phaseolus subglobosus Fingerh.; Phaseolus vexillatus Blanco; Phaseolus melanospermus Fingerh.; Phaseolus dimidiatus Haberte; Phaseolus pictus Cav.; Phaseolus nigricans Haberte)											
20127009	ЕСКАДРОН ESCADRON / ESCADRON	C3	2644	1959			2023	СЛП	свж		
22127002	Крома Croma / Croma	C3	1960	1960			2023	СЛП	пер		
22127001	Контада Contada / Contada	C3	1960	1960			2023	СЛП	пер		
Кукурудза цукрова Zea mays L. ssp. saccharata Sturt. Sweet Corn (Zea mays L. saccharata Koern.)											
® 22103003	Макарон Macaron / Macaron	F1	273	273	273		2023	ЛП	н		
® 22103004	МУСС MOUSSE / MOUSSE	F1	273	273	273		2023	ЛП	н		
21103005	НИКОЛЬ NICOLE / NICOLE	F1	2087	2662			2023	СЛП	н		
® 22103001	Шербет Sherbet / Sherbet	F1	273	273	273		2023	ЛП	н		
® 22103002	Фрагман Fragman / Fragman	F1	273	273	273		2023				
21103008	ПАССИОН PASSION / PASSION		2522	744			2023				
21103010	Мегаза Megaza / Megaza		2841	2841			2023	СЛП	свж, конс		
21103009	ВІЛЛІНГЕР WILLINGER / WILLINGER		1852	1852			2023				
Морква Daucus carota L. Carrot (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Arcang. var. sativus Hoffm.; Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Schubl. et G. Martens; Daucus sativus (Hoffm.) Roehl.; Daucus carota L. (pro parte); Daucus carota L. var. sativus Hoffm.; Daucus carota L. ssp. sativus A. Hayek; Daucus sativus Zagor.)											
21109006	Карлав Karlav / Karlav	F1	2841	2841			2023	СЛП	свж, пер		
21109002	Нью Куро́да АС New Kuroda AS / New Kuroda AS		2819	2819			2023	СЛ	свж		
Огірок посівний Cucumis sativus L. Cucumber (Cucumis sativus chlar Forsk.; Cucumis esculentus Salisb.; Cucumis muricatus Willd.)											
20110012	БРАНДІНО BRANDINO / BRANDINO	F1	1852	1852			2023	СЛП	свж		
® 22110011	Проскор Proscore / Proscore	F1	753	753	753		2023	ЗГр	свж, зс, конс		
23110007	Фрайзер Fraser / Fraser	F1	1833	1833			2023	ЗГр			
® 23110009	Фенікс де Люкс Feniks de Liuks / Feniks de Liuks	П	1163	1163	1163		2023	ЗГр	свж, пер		
23110010	Маркетмор 70 Marketmore 70 / Marketmore 70	C3	1163	1163			2023	ЗГр	свж, пер		
21110009	Дієз Diyez / Diyez		1730	1730			2023	СЛП	свж, пер		
Помідор їстівний Solanum lycopersicum L. Tomato (Lycopersicon esculentum P. Mill.; Lycopersicon esculentum Mill.; Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farwell; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. esculentum; Lycopersicon esculentum P. Mill. nom. cons. var. cerasiforme (Dun.) A. Gray; Lycopersicon pomumamori Moench; Solanum litoridum Salisb.; Solanum foliosum Link; Lycopersicon esculentum Alef.; Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst.; Lycopersicon lycopersicon Britt. et Brown; Lycopersicon esculentum Mill. ssp. esculentum Prokh.)											
21115017	ХМ 5900 HM 5900 / HM 5900	F1	2662	2662			2023	СЛП	свж		
21115016	ХМ 9903 HM 9903 / HM 9903	F1	2662	2662			2023	СЛП	свж		
® 22115019	Дрімболл Dreamboll / Dreamboll	F1	753	753	753		2023	ЗГр	пер, зс		
23115014	Хібачі Hibachi / Hibachi	F1	1730	1730			2023	ЗГр	свж		
23115020	Керо Kero / Kero	F1	2088	2088			2023	ЗГр			
21115034	ИНЦИПІТ INCIPIT / INCIPIT		1852	1852			2023				

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
© 22115020	Геліказ <i>Helicaz</i> / <i>Helicaz</i>		753	753	753		2023	ЗГр	свж, пер, зс		
Редька посівна (редиска) <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> Pers. Radish, Garden Radish, European Radish (<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i> ; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radicula</i> Pers.; <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>radiculus</i> Pers.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus</i> prol. <i>radiculus</i> Pers.; <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> DC.; <i>Raphanus sativus minor</i> Dod.; <i>Raphanus raphanistrum</i> ssp. <i>sativus</i> Thell.; <i>Raphanus sativus niger</i> Pers.; <i>Raphanus sativus major</i> Schubler et Mart.)											
21118008	Марвіс <i>Marvis</i> / <i>Marvis</i>	F1	2841	2841			2023	СЛ	свж		
21118007	Радіс <i>Radis</i> / <i>Radis</i>	F1	2841	2841			2023				
22118001	Експо <i>Expo</i> / <i>Expo</i>		2813	2813			2023	СЛПЗГр	свж		
Салат посівний головчастий <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>capitata</i> Lettuce, Head Lettuce (<i>Lactuca sativa</i> L. convar. <i>sativa</i> var. <i>capitata</i>)											
23421001	Скайфос <i>Skyphos</i> / <i>Skyphos</i>	C	1730	1730			2023	ЗГр	свж		
Цибуля городня <i>Allium cepa</i> L. Onion, Echalion (<i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> G. Don; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> Helm; <i>Allium cepa</i> L. var. <i>viviparum</i> (Metzg.) Alef.; <i>Allium esculentum</i> Salisb.; <i>Cepa vulgaris</i> Renault; <i>Cepa esculenta</i> Rafin; <i>Porrum cepa</i> (L.) Rchb.)											
20106006	АЛМАНЗОРО <i>ALMANZORO</i> / <i>ALMANZORO</i>	F1	1852	1852			2023	СЛП	свж		
21106001	Саратога <i>Saratoga</i> / <i>Saratoga</i>	F1	2529	1418			2023	СЛП	свж, пер		
22106002	Редровер <i>Redrover</i> / <i>Redrover</i>	F1	2086	2086			2023	СЛП	свж, пер		
22106006	Фасто <i>Fasto</i> / <i>Fasto</i>	F1	2086	2086			2023	СЛП	свж, пер		
21106005	Болбул <i>Bolbul</i> / <i>Bolbul</i>		2841	2841			2023	СЛ	свж, пер		
22106005	СВ4774НВ <i>SV4774NW</i> / <i>SV4774NW</i>		1852	1852			2023				
Шпинат городній <i>Spinacia oleracea</i> L. Spinach (<i>Spinacia domestica</i> Borkh.)											
23130001	АПОЛЛО <i>APOLLO</i> / <i>APOLLO</i>	F1	1833	1833	2023	СЛП					
Гарбуз мускатний <i>Cucurbita moschata</i> Duch. Butternut, Butternut Squash, Cheese Pumpkin (<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne; <i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. ex Poir.)											
22228002	Баттернат де Люкс <i>Batternat de Liuks</i> / <i>Batternat de Liuks</i>	C3	1163	1163			2023	СЛП	свж, пер		
23228001	ВІНАС <i>VEENAS</i> / <i>VEENAS</i>	F1	1833	1833			2023	СЛП			
23228002	Атлас <i>Atlas</i> / <i>Atlas</i>	F1	1833	1833			2023				
Монарда гібридна <i>Monarda x hybrida</i> hort. Bee Balm Hybrid											
© 22534001	Кияночка <i>Kyianochka</i> / <i>Kyianochka</i>		348	348	348		2023	СЛП	дкр		
Турнепс <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs. Turnip Rape (<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>campestris</i> (L.) A. R. Clapham; <i>Brassica campestris</i> L.; <i>Brassica campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i> ; <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>silvestris</i> (Lam.) Janch.)											
23178001	ФІНІТО <i>FINITO</i> / <i>FINITO</i>	C	971	971			2023				
Плодові та ягідні Fruit and Berry Яблуна домашня <i>Malus domestica</i> Borkh. Apple (<i>Malus pumila</i> Mill var. <i>domestica</i> ; <i>Purus malus</i> L.; <i>Malus communis</i> Lam.)											
23263001	Градиска <i>Gradisca</i> / <i>Gradisca</i>		3205	3205			2023	СЛП	свж	осін	
Груша звичайна <i>Pyrus communis</i> L. Pear (<i>Pyrus communis</i> L. var. <i>sativa</i> DC.; <i>Pyrus pyrastra</i> Borkh.; <i>Pyrus sativa</i> Koch; <i>Pyrus achras</i> Gaertn.; <i>Pyrus domestica</i> Medic.)											
22258002	Вежа мускатна <i>Vezha muskatna</i> / <i>Vezha muskatna</i>		1601	1601			2023	СЛП	свж	осін	
Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщеп) Cherry-plum; Myrobalan (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. (<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>nigra</i> ; <i>Prunus divaricata</i> Ledeb.; <i>Prunus sogdiana</i> Vassilcz.)											
23681001	Міробалан 29С <i>Myrobalan 29C</i> / <i>Myrobalan 29C</i>		3208	3208			2023	СЛП	підщ.		

Заявка № Application №	Назва сорту Variety denomination	Метод створення Method propagating	Заявник(и) Applicant(s)	Власник Owner	Володілець патенту Patent holder	Підтримувач Maintainer	Рік реєстрації Registration year	Рекомендована зона для вирощування Recommended zones for growing	Напрямок використання Purpose	Група стиглості Group of ripeness	Якість Quality
Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L. Plum (<i>Prunus</i> L. subg. <i>prunus</i> ; <i>Prunus</i> subg. <i>prunus</i> ; <i>Prunus communis domestica</i> Huds.; <i>Prunus oeconomica</i> Borkh.)											
23261001	Октобер Сан 2 Октобер Сан 2 / Oktober San 2		3208	3208			2023	СЛП	ун	пс	
Агрбус звичайний <i>Ribes uva-crispa</i> L. Gooseberry (<i>Grossularia reclinata</i> (L.) Mill.; <i>Ribes reclinatum</i> L.; <i>Ribes grossularia</i> L.; <i>Ribes spinosum</i> Gilib.; <i>Ribes caucasicum</i> Adams; <i>Grossularia vulgaris</i> Spach.)											
® 23295002	Петрівка Петрівка / Petrivka		1601	1601	1601		2023	ЛП	ун	пс	
® 23295003	Холодний яр Холодний яр / Kholodnyi yar		1601	1601	1601		2023	ЛПЗГр	ун	рс	
® 23295001	Кам'янград Кам'янград / Kam'ianhrad		1601	1601	1601		2023	ЛП	ун	пс	
Суниця садова <i>Fragaria ananassa</i> Duch. Strawberry (<i>Fragaria</i> x <i>ananassa</i> Duch.; <i>Fragaria grandiflora</i> Ehrh. non (L.) Crantz)											
23294001	Рубі де Жардін Rubis des Jardins / Rubis des Jardins		3217	3217			2023				
Ліщина велика (фундук) <i>Corylus maxima</i> Mill. Hazelnut (<i>Corylus avellana</i> L.)											
® 22286002	Березокорій Березокорій / Berezokoryi		3090	3090	3090		2023	СЛП	підщ.		
Вишня степова x вишня ланезіана (підщени) <i>Prunus fruticosa</i> (Pall.) Woron. x <i>Prunus lannesiana</i> Steppe Cherry x Oshima Cherry (<i>Prunus fruticosa</i> Pall. x <i>Prunus serrulata</i> Lindl. var. <i>lannesiana</i> (Carriere) Makino)											
23352001	ВСЛ 2.1 ВСЛ 2.1 / VSL 2.1		3218	3218			2023	СЛП	підщ.		
Актинідія пурпурова x актинідія гостра <i>Actinidia purpurea</i> Rehd. x <i>Actinidia arguta</i> Planch. Purple Actinidia x Hardy Kiwifruit (<i>Actinidia purpurea</i> x <i>Actinidia arguta</i>)											
® 23368003	Галаретка Галаретка / Halaretka		348	348	348		2023	ЛП	ун	сс	
® 23368002	Фортуна Fortuna / Fortuna		348	348	348		2023	Л	ун	др	
Декоративні та лікарські Ornamental and Healing Первоцвіт <i>Primula</i> L. Auricula											
® 23680002	Лісова пісня Лісова пісня / Lisova pisnia		348	348	348		2023	ЛП	озл		
® 23680003	Веснянка Веснянка / Vesnianka		348	348	348		2023	ЛП	озл		
® 23680001	Чумацький Шлях Чумацький Шлях / Chumatskyi Shliakh		348	348	348		2023	ЛП	озл		
Хризантема шовковицелиста <i>Chrysanthemum</i> x <i>morifolium</i> Ramat Chrysanthemum (<i>Chrysanthemum japonense</i> x <i>Chrysanthemum morifolium</i> ; <i>Chrysanthemum morifolium</i> x <i>Chrysanthemum morifolium</i> ; <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.; <i>Chrysanthemum x grandiflorum</i> (Ramat.) Kitam.; <i>Chrysanthemum hortorum</i> W. T. Mill.; <i>Dendranthema x grandiflorum</i> (Ramat.) Kitamura; <i>Dendranthema morifolium</i> Tzelev; Hybrids between <i>Chrysanthemum vestitum</i> and <i>Chrysanthemum x morifolium</i> ; <i>Chrysanthemum x grandiflorum</i> Ramat)											
22438005	Прометей Прометей / Prometei		2075	2075			2023	СЛП	озл		
22438006	Рожева діадема Рожева діадема / Rozheva diadema		2075	2075			2023	СЛП	озл		
22438004	Коралове намисто Коралове намисто / Koralove namysto		2075	2075			2023	СЛП	озл		
Чорнушка дамаська <i>Nigella damascena</i> L. Devil-in-a-bush											
® 22548001	Різдвяна зірочка Різдвяна зірочка / Rizdviana zirochka	СЗ	348	348	348		2023	ЛП	ун		
Полин д'Апрі <i>Artemisia argyi</i> H. Lev. & Vanion Chinese mugwort											
® 22671001	Срібне мереживо Срібне мереживо / Sribne merezhyvo		348	348	348		2023	ЛП	озл, дкр		
Лісові Forest Тополя <i>Populus</i> L. Poplar											
22086001	Макс-4 Мак-4 / Max-4		2888	2888			2023	СЛП	ун		
Липа серцелиста <i>Tilia cordata</i> Mill. Small-leaved Linden											
® 23601001	Медова ФТ23 Медова ФТ23 / Medova FT23		3211 2800	3211 2800	3211 2800		2023	СЛП			

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ЗЛАКИ

Жито посівне (озиме)
Жито посівне (озиме) – батьківський компонент
Кукурудза звичайна
Кукурудза звичайна – батьківський компонент
Овес посівний (ярий)
Пшениця м'яка (озима)
Пшениця м'яка (яра)
Пшениця спельта (озима)
Пшениця тверда (яра)
Пшениця туранська
Тритикале (озиме)
Тритикале (яре)
Ячмінь звичайний (дворучка)
Ячмінь звичайний (озимий)
Ячмінь звичайний (ярий)



Офіційні описи сортів рослин та показники господарської придатності

Official descriptions plant varieties and indices of value for cultivation and use

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 21015012 Назва сорту: ЗУ Барезі **Заявник (код):** 1900 **Власник сорту (код):** 1900

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230599**

Дата пріоритету: 24.06.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230381

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптиль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	нещільне	3	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 21015010 Назва сорту: ЗУ Перспектив **Заявник (код):** 1900 **Власник сорту (код):** 1900

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230598**

Дата пріоритету: 24.06.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230380

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	пізній	7	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	коротка	3	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 21015002 Назва сорту: Нива волошкава **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент №** 230597

Дата пріоритету: 01.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230724

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
7	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	сильна	7	
13	Соломина: опушення під колосом	дуже щільне	9	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	довга	7	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	велика	7	
20	Зернівка: за довжиною	довга	7	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,07	5,46
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,46	5,67
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,39	0,21
+, - до усередненої урожайності, %		22,9	3,8
Довірчий інтервал, т/га		0,26	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		277	268
Висота рослини, см		135,9	143,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		39,5	35,7
Череззерниця, %		2,6	6,2
Вміст білка, %		10,6	9,4
Число падіння, с		170,1	226
Стійкість до вилягання, бал		5	7
Стійкість до обсіпання, бал		8	7
Стійкість до посухи, бал		7	5
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	8
Стійкість проти снігової плісняви, бал		9	9
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Жито посівне (озиме) *Secale cereale* L.

Заявка № 21015009 Назва сорту: Рефлектор **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230528**

Дата пріоритету: 14.06.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230541

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару за інтенсивністю	темне	2	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптіль: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	довга	7	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	дуже довга	9	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Соломина: опушення під колосом	нещільне	3	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	середня	5	
20	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка № 21915009 Назва сорту: Л2177ПхЛ2184Н **Заявник (код):** 1900 **Власник сорту (код):** 1900

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230600**

Дата пріоритету: 24.06.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідectво про державну реєстрацію № 230774

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Колеоптіль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	коротка	3	
7	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
9	Час початку колосіння	пізній	7	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	помірної щільності	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	коротка	3	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	середня	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	середньої щільності	5	
18	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	мала	3	
20	Зернівка: за довжиною	середня	5	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Жито посівне (озиме) – батьківський компонент *Secale cereale* L.

Заявка № 21915010 Назва сорту: ХЮР035 **Заявник (код):** 1900 **Власник сорту (код):** 1900

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230601**

Дата пріоритету: 24.06.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230775

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоїдність	диплоїд	2	
2	Зернівка: забарвлення алеїронового шару за інтенсивністю	світле	1	
3	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слаба	1	
4	Колеоптіль: за довжиною	короткий	3	
5	Прапорцевий листок: піхва за довжиною	середня	5	
6	Прапорцевий листок: пластинка за довжиною	середня	5	
7	Рослина: габітус	розлогий	7	
8	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
9	Час початку колосіння	середній	5	
10	Підпрапорцевий листок: пластинка за довжиною	довга	7	
11	Підпрапорцевий листок: пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Соломина: опушення під колосом	відсутнє або дуже нещільне	1	
14	Рослина: за довжиною (з колосом та остюками)	середня	5	
15	Соломина: відстань між верхнім вузлом та колосом	довга	7	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
17	Колос: за щільністю	щільний	7	
18	Колос: положення в просторі	напівпохиле	7	
19	Зернівки: маса 1000 шт.	мала	3	
20	Зернівка: за довжиною	коротка	3	
21	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
22	Тип розвитку	озимий	1	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка № 21009001 Назва сорту:** Булат херсонський **Заявник (код):** 3221**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 30.10.2023 **Патент № 230637****Дата пріоритету:** 04.01.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волость: час цвітіння	від раннього до середнього	4	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	до середнього
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабе	3	до помірного
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	до середньої
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно заплілюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	до великого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	до середньої кількості
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	сильне	7	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009002 Назва сорту: Дарунок херсонський **Заявник (код):** 3221

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.10.2023 **Патент № 230638**

Дата пріоритету: 04.01.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	сильна	3	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від середнього до пізнього	6	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	велике	7	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидний	5	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.**Заявка №** 21009004 **Назва сорту:** Січковий **Заявник (код):** 3221**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 30.10.2023 **Патент №** 230640**Дата пріоритету:** 05.01.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	до середнього
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	до сильного
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	до сильного
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	дуже сильне	9	

Вид: Кукурудза звичайна *Zea mays* L.

Заявка № 21009003 Назва сорту: Ярик Заявник (код): 3221

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.10.2023 Патент № 230639

Дата пріоритету: 05.01.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	до слабого
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	до ледь похилого
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зерна. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	до великого
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівок	жовте	3	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	слабке	3	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909124 Назва сорту: 1ПВНВ47 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідство про державну реєстрацію № 230907

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабке	1	
8	Волость: час цвітіння	ранній	3	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	помірне	5	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волость: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабке	3	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нїжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовто-оранжеве	4	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	оранжеве	5	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909121 Назва сорту: 1ПФТ47 **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230906

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	помірне	5	
2	Перший листок: форма верхівки	округла	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	середньої щільності	5	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	середня	5	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	вузька	3	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	малий	3	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	зубовидноподібний	4	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.**Заявка № 21909114 Назва сорту:** ПХ4ДЗС **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230904**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	пряме	1	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	пізній	7	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	дуже малий	1	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	помірно похиле	5	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	пізній	7	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	слабке	3	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	довга	7	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	середнє	5	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: нїжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Кукурудза звичайна – батьківський компонент *Zea mays* L.

Заявка № 21909115 Назва сорту: ПХ4ДЗЦ **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230905

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	сильне	7	
2	Перший листок: форма верхівки	від округлої до лопатоподібної	4	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	малий	3	
6	Листок: положення пластинки у просторі	ледь похиле	3	
7	Стебло: зигзагоподібність	відсутня або дуже слабка	1	
8	Волоть: час цвітіння	середній	5	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабе	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	помірне	5	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	малий	3	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	відсутні або дуже мала	1	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	помірне	5	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	нещільне	3	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	слабе	3	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	довга	7	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	середній	5	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	ознака не визначається	0	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	ознака не визначається	0	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	ознака не визначається	0	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	ознака не визначається	0	
36	Качан: тип зернівки	проміжний	3	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	ознака не визначається	0	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	жовто-оранжеве	4	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	помірне	5	

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.**Заявка №** 20011003 **Назва сорту:** Вудленд **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230575**Дата пріоритету:** 12.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230777**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
2	Найнижчі листки: опушення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	середній	5	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	помірна	5	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	горизонтальне	5	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: восковий наліт	сильний	7	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски	відсутній	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність воскового нальоту нижньої квіткової луски	дуже слабка	1	
15	Рослина: за висотою	висока	7	
16	Волоть: за довжиною	довга	7	
17	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
18	Первинна зернівка: остистість	сильна	7	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	біле	1	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	слабке	3	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	середні	5	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	3	
26	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,59	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,42	3,95
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,17	-0,09
+, - до усередненої урожайності, %		-3,7	-2,2
Довірчий інтервал, т/га		0,31	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб		89	87
Висота рослини, см		88,5	81,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		37,9	35,7
Вміст білка, %		12,2	12
Плівковість, %		24,3	24,3
Стійкість до вилягання, бал		7	8
Стійкість до обсіпання, бал		9	8
Стійкість до посухи, бал		6	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти корончастої іржі, бал		8	7
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Овес посівний (ярий) *Avena sativa* L.

Заявка № 20011004 **Назва сорту:** Фостер **Заявник (код):** 2739 **Власник сорту (код):** 2739

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент №** 230563

Дата пріоритету: 12.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230778

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус	прямий	1	
2	Найнижчі листки: опушення піхви	слабке	3	
3	Листкова пластинка: опушення країв листка	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час викидання волоті (на 50% волотей видно перший вторинний колосок)	ранній	3	
6	Стебло: опушення найвищого вузла	наявне	9	
7	Стебло: інтенсивність опушення найвищого вузла	помірна	5	
8	Волоть: орієнтація гілочок	розкидиста	3	
9	Волоть: положення гілочок	напівпряме	3	
10	Волоть: положення вторинних колосків	поникле	2	
11	Колоскові луски: восковий наліт	слабкий	3	
12	Колоскові луски: за довжиною	середні	5	
13	Первинна зернівка: восковий наліт нижньої квіткової луски	відсутній	1	
14	Первинна зернівка: інтенсивність воскового нальоту нижньої квіткової луски	дуже слабка	1	
15	Рослина: за висотою	низька	3	
16	Волоть: за довжиною	коротка	3	
17	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
18	Первинна зернівка: остистість	помірна	5	
19	Первинна зернівка: нижня квіткова луска за довжиною	середня	5	
20	Зернівка: забарвлення нижньої квіткової луски	жовте	2	
21	Первинна зернівка: опушення спинки нижньої квіткової луски	відсутнє	1	
22	Первинна зернівка: опушення основи	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Первинна зернівка: базальні волоски за довжиною	короткі	3	
24	Первинна зернівка: стрижень другої зернівки за довжиною	середній	5	
25	Тип розвитку	ярий	3	
26	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		4,59	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), ц/га		4,72	4,18
+, - до усередненої урожайності, ц/га		0,13	0,14
+, - до усередненої урожайності, %		2,8	3,5
Довірчий інтервал, ц/га		0,31	0,18
Тривалість періоду вегетації, діб		93	87
Висота рослини, см		79,5	78
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		40,6	37,9
Вміст білка, %		11,9	12,2
Плівковість, %		23,3	24,4
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до обсіпання, бал		9	7
Стійкість до посухи, бал		8	5
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти корончастої іржі, бал		8	6
Стійкість проти твердої сажки, бал		9	8
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал		9	9
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012030 Назва сорту:** Атрибут **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230583**Дата пріоритету:** 18.05.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230789**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабе	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	дрібна	3	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабе	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	до сильного
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,70	8,50	8,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,37	1,53	2,26
+, - до усередненої урожайності, %	44,5	22,0	36,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	277	271	269
Висота рослини, см	82,8	83,8	88,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,7	42,7	40,6
Вміст білка, %	13,6	13,4	12,7
Вміст сирової клейковини, %	29,3	26,2	26,2
Показник альвеографа (W), о.а.	252,3	266,3	245
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	960	900	940
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	цін	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012003 Назва сорту:** Біла **Заявник (код):** 355 **Власник сорту (код):** 355**Дата пріоритету:** 15.02.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230783**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,78	8,14	7,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,45	1,17	1,15
+, - до усередненої урожайності, %	27,2	16,8	18,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	272	266	266
Висота рослини, см	93,7	94,8	101,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,7	43,3	43,5
Вміст білка, %	13,6	13,5	12,9
Вміст сирої клейковини, %	28,4	26	25,1
Показник альвеографа (W), о.а.	313,7	333	279,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820	800	960
Стійкість до вилягання, бал	8	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012010 Назва сорту: Бісквіт Заявник (код): 2783 Власник сорту (код): 2783

Дата пріоритету: 24.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230788

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска: Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска: Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска: Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска: Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска: Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,30	7,64	7,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,97	0,67	0,88
+, - до усередненої урожайності, %	18,2	9,6	14,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	266
Висота рослини, см	93	96,1	99,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,5	47,2	44,8
Вміст білка, %	13,4	13,6	13
Вміст сирої клейковини, %	25,8	25,6	25,3
Показник альвеографа (W), о.а.	247	235	232,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	900	955	990
Стійкість до вилягання, бал	6	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	6	7
Стійкість проти бурі і їжі, бал	8	7	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012016 Назва сорту:** Вірність одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.10.2023 **Патент №** 230513**Дата пріоритету:** 23.03.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230749**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні або зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,10	8,14	7,84
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,77	1,17	1,58
+, - до усередненої урожайності, %	33,2	16,8	25,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	272	266	265
Висота рослини, см	90,5	91,4	93
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,8	42,4	40,7
Вміст білка, %	13,3	13	13
Вміст сирої клейковини, %	27,2	25,5	27
Показник альвеографа (W), о.а.	270,7	282,3	276
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	915	1010	930
Стійкість до вилягання, бал	7	4	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012035 Назва сорту: Дженіс Заявник (код): 2302 Власник сорту (код): 2302

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230546

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230417

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	до дуже сильного
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	вузька	3	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,44	8,45	8,39
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,11	1,48	2,13
+, - до усередненої урожайності, %	39,6	21,2	34,0
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	276	271	269
Висота рослини, см	85,1	88,4	92,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,6	44,1	45,5
Вміст білка, %	13,5	13,7	13,1
Вміст сирової клейковини, %	29,2	27,7	26,1
Показник альвеографа (W), о.а.	265	277	245,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1010	960	925
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	8
Стійкість проти бурі і ржі, бал	7	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012034 Назва сорту: Джубіло Заявник (код): 2302 Власник сорту (код): 2302

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230545

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230416

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	до дуже сильного
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабе	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	до сильного
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012020 Назва сорту: Дністрянка одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 **Патент № 230517**

Дата пріоритету: 23.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230753

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	сильне	7	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,20	8,38	8,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,87	1,41	1,89
+, - до усередненої урожайності, %	35,1	20,2	30,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	271	266	265
Висота рослини, см	88,9	85	92,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,5	43,3	41,4
Вміст білка, %	13,5	12,6	12,5
Вміст сирової клейковини, %	26,6	24,6	24,7
Показник альвеографа (W), о.а.	288	267,3	246
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	830	935
Стійкість до вилягання, бал	6	4	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	8
Стійкість проти бурі і ржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цпн	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012021 Назва сорту:** Епіграф **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.10.2023 **Патент №** 230518**Дата пріоритету:** 23.03.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230754**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	довгий	7	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,27	8,32	7,85
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,94	1,35	1,59
+, - до усередненої урожайності, %	36,4	19,4	25,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	271	266	264
Висота рослини, см	82,5	80	84,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,2	43,8	44,2
Вміст білка, %	14	13,2	12,8
Вміст сирової клейковини, %	28,1	25,3	27,7
Показник альвеографа (W), о.а.	278,3	299,5	283
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820	955	1010
Стійкість до вилягання, бал	7	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012019 Назва сорту: Епітет Заявник (код): 1591 Власник сорту (код): 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 Патент № 230516

Дата пріоритету: 23.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230752

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	велике	7	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	довгий	7	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,03	8,29	7,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,70	1,32	1,40
+, - до усередненої урожайності, %	31,9	18,9	22,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	272	266	265
Висота рослини, см	86,1	85,6	88,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,4	42,8	42,2
Вміст білка, %	14	13,5	13,1
Вміст сирової клейковини, %	27,2	26,4	24,5
Показник альвеографа (W), о.а.	295,3	279	266,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	780	800	885
Стійкість до вилягання, бал	6	4	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	7
Стійкість проти борошністої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі і ржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012017 Назва сорту:** Етуаль **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.10.2023 **Патент №** 230514**Дата пріоритету:** 23.03.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230750**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,08	8,26	8,05
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,75	1,29	1,79
+, - до усередненої урожайності, %	32,8	18,5	28,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	266
Висота рослини, см	85,1	85,6	90,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,3	46,9	44,7
Вміст білка, %	13,5	13,2	13
Вміст сирової клейковини, %	26,6	26,4	26,3
Показник альвеографа (W), о.а.	307,5	306,5	280
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	830	970	933,3
Стійкість до вилягання, бал	6	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 19012079 Назва сорту: Євразія Заявник (код): 1571 Власник сорту (код): 1571

Дата пріоритету: 30.07.2019

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230825

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,52	8,08	7,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,19	1,11	1,40
+, - до усередненої урожайності, %	41,1	15,9	22,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	269	268
Висота рослини, см	82,7	84,5	88,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39	41,1	44,1
Вміст білка, %	13,7	13,8	13
Вміст сирої клейковини, %	28,1	27,4	25,1
Показник альвеографа (W), о.а.	282,5	269	239
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	780	973,3	920
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		3	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		1,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 21012015 **Назва сорту:** Загадка одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.10.2023 **Патент №** 230512**Дата пріоритету:** 23.03.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023**Свідectво про державну реєстрацію №** 230748**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	до помірного
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,07	8,32	7,91
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,74	1,35	1,65
+, - до усередненої урожайності, %	32,6	19,4	26,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	265
Висота рослини, см	83,9	91,2	89,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45	46,9	46,3
Вміст білка, %	13,7	13,1	12,6
Вміст сирової клейковини, %	27,2	25,3	24,8
Показник альвеографа (W), о.а.	305,3	305,5	285
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	950	1000	1023,3
Стійкість до вилягання, бал	6	4	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012032 Назва сорту: 3У Віллем **Заявник (код):** 2513 **Власник сорту (код):** 2513

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230564**

Дата пріоритету: 27.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230414

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на півхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012033 Назва сорту: 3У Шамаль **Заявник (код):** 2657 **Власник сорту (код):** 1223

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент №** 230565

Дата пріоритету: 27.05.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230415

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска: Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска: Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска: Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска: Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска: Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012005 Назва сорту: Київська 22 Заявник (код): 355 Власник сорту (код): 355

Дата пріоритету: 15.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230785

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,44	8,87	8,56
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,11	1,90	2,30
+, - до усередненої урожайності, %	39,6	27,3	36,7
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	268	267
Висота рослини, см	94,9	94,9	102,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,4	48,2	48,7
Вміст білка, %	13,1	13,3	12,8
Вміст сирої клейковини, %	27,6	27	25,1
Показник альвеографа (W), о.а.	225	248	233
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	910	1005	853,3
Стійкість до вилягання, бал	7	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012002 Назва сорту:** Малуша **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230608**Дата пріоритету:** 04.01.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230733**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,37	8,63	8,20
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,04	1,66	1,94
+, - до усередненої урожайності, %	38,3	23,8	31,0
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	268	266
Висота рослини, см	86,2	86,4	89,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,3	43,8	43,2
Вміст білка, %	13,1	12,6	12,3
Вміст сирової клейковини, %	26,1	24,7	24,7
Показник альвеографа (W), о.а.	239,5	247	253
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	815	876,7	860
Стійкість до вилягання, бал	7	6	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012001 Назва сорту: Мізинка **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230607**

Дата пріоритету: 04.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230732

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	до середнього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,36	8,39	7,82
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,03	1,42	1,56
+, - до усередненої урожайності, %	38,1	20,4	24,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	268	265
Висота рослини, см	83,6	84,2	91,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	42,2	43,1	45,1
Вміст білка, %	13,1	13	12,8
Вміст сирової клейковини, %	26,3	27,6	26,1
Показник альвеографа (W), о.а.	268,7	280,3	254
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	930	946,7	1066,7
Стійкість до вилягання, бал	8	6	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	9	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	6	7
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012013 Назва сорту:** МІП Аеліта **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 2859**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230541**Дата пріоритету:** 17.03.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230736**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,78	8,05	7,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,45	1,08	1,12
+, - до усередненої урожайності, %	27,2	15,5	17,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	268	268
Висота рослини, см	99	102,3	104,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,6	47,9	47,8
Вміст білка, %	13,2	13,6	13,1
Вміст сирової клейковини, %	27,9	27,9	27
Показник альвеографа (W), о.а.	195	226,5	233,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	845	853,3
Стійкість до вилягання, бал	7	4	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012012 Назва сорту: МІП Відзнака Заявник (код): 1589 Власник сорту (код): 2859

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230540

Дата пріоритету: 17.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230735

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,15	8,43	7,72
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,82	1,46	1,46
+, - до усередненої урожайності, %	34,1	20,9	23,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	266
Висота рослини, см	94	92,3	94
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,6	45	47,2
Вміст білка, %	13,3	13,1	12,8
Вміст сирової клейковини, %	26,9	26,2	26,8
Показник альвеографа (W), о.а.	279,5	245,7	229,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840	925	800
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цпн	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012011 Назва сорту:** МІП Дарунок **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 2859**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230539**Дата пріоритету:** 17.03.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230734**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,35	7,80	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,02	0,83	0,97
+, - до усередненої урожайності, %	19,1	11,9	15,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	266
Висота рослини, см	102,1	104,8	106,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,4	46,8	48,6
Вміст білка, %	14	13,2	13,5
Вміст сирової клейковини, %	28,3	26,8	27,4
Показник альвеографа (W), о.а.	321,5	278	259,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	920	910	950
Стійкість до вилягання, бал	7	4	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		5	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	слн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012014 Назва сорту: МІП Довіра Заявник (код): 1589 Власник сорту (код): 2859

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230542

Дата пріоритету: 17.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230737

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,61	7,99	7,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,28	1,02	0,88
+, - до усередненої урожайності, %	24,0	14,6	14,1
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	268	267
Висота рослини, см	104,6	100,5	101,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,5	45,7	46,2
Вміст білка, %	13,4	12,9	13,3
Вміст сирої клейковини, %	27,5	26	27,1
Показник альвеографа (W), о.а.	228,5	252	199
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	970	953,3	1015
Стійкість до вилягання, бал	7	4	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	7
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 20012042 **Назва сорту:** Новинка **Заявник (код):** 2706 **Власник сорту (код):** 2706**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230606**Дата пріоритету:** 02.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230860**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	до сильного
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	наявний	9	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,93	8,03	7,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,60	1,06	1,33
+, - до усередненої урожайності, %	30,0	15,2	21,2
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	266	266
Висота рослини, см	98,8	95,5	101,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,6	46,9	44,8
Вміст білка, %	13,7	12,6	12,6
Вміст сирової клейковини, %	28,6	24,4	26
Показник альвеографа (W), о.а.	244,7	259,7	223
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	915	993,3	973,3
Стійкість до вилягання, бал	6	4	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	6	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	6
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		7,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 20012044 Назва сорту: НОВІК Заявник (код): 2653 Власник сорту (код): 485

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230841

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	розлогий	7	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	сильне	7	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,28	6,90	6,27
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	8,05	8,33	8,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,77	1,43	2,36
+, - до усередненої урожайності, %	52,5	20,7	37,6
Довірчий інтервал, т/га	0,35	0,27	0,21
Тривалість періоду вегетації, діб	274	268	266
Висота рослини, см	78,9	77,3	84,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	39,5	42,7	42,9
Вміст білка, %	14,2	13,1	13,1
Вміст сирової клейковини, %	29,2	25,3	25
Показник альвеографа (W), о.а.	232	260	217
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	720	900	890
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	7
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		5,5	
Блок	2	2	2
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 20012043 **Назва сорту:** Носівочка **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.10.2023 **Патент №** 230511**Дата пріоритету:** 20.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідectво про державну реєстрацію №** 230731**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабе	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	до середнього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,10	7,65	6,72
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,77	0,68	0,46
+, - до усередненої урожайності, %	14,4	9,8	7,3
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	266
Висота рослини, см	86,3	86	90,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48,2	50,9	50,6
Вміст білка, %	13,6	13,1	13,5
Вміст сирової клейковини, %	27,9	26,3	26,5
Показник альвеографа (W), о.а.	250,5	241	245,5
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	790	770	840
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	6	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		4,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012006 Назва сорту: Синтетик 240 Заявник (код): 355 Власник сорту (код): 355

Дата пріоритету: 15.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230786

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	до середнього
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	червоне	2	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,88	8,53	8,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,55	1,56	1,91
+, - до усередненої урожайності, %	29,1	22,4	30,5
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	267	267
Висота рослини, см	92,4	95,3	98,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,6	45,2	45,1
Вміст білка, %	13,4	13,1	12,8
Вміст сирової клейковини, %	26,5	25,9	24,4
Показник альвеографа (W), о.а.	295,3	298,6	272
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	750	830	820
Стійкість до вилягання, бал	6	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	8	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		9	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		8,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 20012045 **Назва сорту:** Соліфлор КС **Заявник (код):** 2653 **Власник сорту (код):** 485**Дата пріоритету:** 03.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.10.2023**Свідство про державну реєстрацію №** 230842**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	ланцетна	4	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,74	8,59	8,26
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,41	1,62	2,00
+, - до усередненої урожайності, %	45,2	23,2	31,9
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	269	268	266
Висота рослини, см	89,6	90,3	97,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,6	41,6	43,3
Вміст білка, %	13,3	12,9	13,1
Вміст сирої клейковини, %	27,1	26	26,7
Показник альвеографа (W), о.а.	257	270	308,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	820	930	910
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		7,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цін	цін	цін

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012018 Назва сорту: Творчість одеська **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 **Патент № 230515**

Дата пріоритету: 23.03.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230751

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	до помірного
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,98	8,30	7,74
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,65	1,33	1,48
+, - до усередненої урожайності, %	31,0	19,1	23,6
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	273	267	266
Висота рослини, см	85,4	88,8	92,4
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,8	44,2	42,6
Вміст білка, %	14,2	13	12,8
Вміст сирової клейковини, %	27,9	25,6	25,6
Показник альвеографа (W), о.а.	278	279	274,8
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	860	830	936,7
Стійкість до вилягання, бал	5	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	8
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		9,0	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 21012004 Назва сорту:** Трояна **Заявник (код):** 355 **Власник сорту (код):** 355**Дата пріоритету:** 15.02.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію № 230784****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	з дуже значним перегином	5	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,28	7,93	8,35
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,95	0,96	2,09
+, - до усередненої урожайності, %	36,6	13,8	33,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	276	269	268
Висота рослини, см	99,9	101,1	107,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,4	48,8	45,9
Вміст білка, %	14	13,6	13
Вміст сирової клейковини, %	28,9	27,8	25,7
Показник альвеографа (W), о.а.	245	243	237
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	905	916,7	923,3
Стійкість до вилягання, бал	7	4	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	9
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	9	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал	9		
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	8,0		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 21012036 Назва сорту: Фокс **Заявник (код):** 2803 **Власник сорту (код):** 2803

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230547**

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230418

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	прямий	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на п'хві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	дуже сильне	9	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначається	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	шилоподібні	3	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	дуже сильний	9	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 21012038 **Назва сорту:** ФОРСАЙТ **Заявник (код):** 2805 2806 **Власник сорту (код):** 2805 2806**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.10.2023 **Патент №** 230519**Дата пріоритету:** 12.07.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідство про державну реєстрацію №** 230738**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	сильний	7	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	помірне	5	
23	Нижня квіткова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Зернівка: за довжиною	довга	7	
28	Зернівка: за шириною	широка	7	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	мале	3	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квіткова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	помірне	5	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овально-ланцетна	3	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,33	6,97	6,26
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	7,51	8,05	7,79
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,18	1,08	1,53
+, - до усередненої урожайності, %	40,9	15,5	24,4
Довірчий інтервал, т/га	0,07	0,05	0,04
Тривалість періоду вегетації, діб	274	268	266
Висота рослини, см	84,3	83,5	91,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,8	42,9	43
Вміст білка, %	13,5	13,2	12,5
Вміст сирової клейковини, %	26,2	25,1	24,6
Показник альвеографа (W), о.а.	251	280,7	245,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	740	850	915
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	9
Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал		7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал		6,5	
Блок	1	1	1
Напрямок використання	Ф	цїн	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 20013006 Назва сорту: Бромонт Заявник (код): 2739

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230584

Дата пріоритету: 12.11.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	щільний	7	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 22013002 **Назва сорту:** ІС ЯРІЕЛЛА **Заявник (код):** 2858 **Власник сорту (код):** 2858**Дата пріоритету:** 06.01.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.10.2023**Свідство про державну реєстрацію №** 230826**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска: Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	скошене	1	
20	Нижня колоскова луска: Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска: Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска: Зубець: за формою	ознака не визначалась	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,92	5,06	4,21
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,08	0,40	0,26
+, - до усередненої урожайності, %	2,8	8,6	6,6
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	88	92	89
Висота рослини, см	58,9	75,3	74,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	32,4	39,1	42,3
Вміст білка, %	15,2	14,2	14,4
Вміст сирої клейковини, %	29,6	27,6	28,9
Показник альвеографа (W), о.а.	247	261,7	253,7
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1105	1015	885
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	4	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	7	9
Напрямок використання	ф	цїн	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 20013004 **Назва сорту:** Колос Поліський **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент №** 230610

Дата пріоритету: 13.05.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230862

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нещільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначалась	0	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,05	4,89	3,99
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,21	0,23	0,04
+, - до усередненої урожайності, %	7,4	4,9	1,0
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	91	93	89
Висота рослини, см	94,4	100,5	95,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	32,2	39,1	40
Вміст білка, %	14,6	14,6	16,6
Вміст сирової клейковини, %	30	29,8	35
Показник альвеографа (W), о.а.	236	263,7	278,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	903,3	1065	1145
Стійкість до вилягання, бал	7	3	6
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	3	6	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	9	6
Стійкість проти бурі і ржі, бал	7	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	9
Напрямок використання	ф	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 20013008 **Назва сорту:** МІП Веснянка **Заявник (код):** 1589 **Власник сорту (код):** 2859**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230566**Дата пріоритету:** 04.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230739**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	дуже сильний	9	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	дуже сильний	9	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	короткі	3	
16	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	3	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	дуже широке	9	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	округле	2	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кінь	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,80	5,30	4,27
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,96	0,64	0,32
+ , - до усередненої урожайності, %	33,8	13,7	8,1
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	93	94	92
Висота рослини, см	87,2	95,1	94,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37	45,2	45,3
Вміст білка, %	13,9	14,3	14,5
Вміст сирової клейковини, %	27,9	28,4	29,9
Показник альвеографа (W), о.а.	207	246	214
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	870	980	780
Стійкість до вилягання, бал	8	4	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	4	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22013001 Назва сорту: Перібонка Заявник (код): 2739 Власник сорту (код): 2739

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230567

Дата пріоритету: 05.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230791

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	слабко виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	сильний	7	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	1,86	4,69	4,06
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,98	0,03	0,11
+, - до усередненої урожайності, %	-34,5	0,6	2,8
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	81	89	92
Висота рослини, см	57,5	77,5	80,2
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	29	41,8	43,8
Вміст білка, %	15,7	14,4	14,4
Вміст сирої клейковини, %	32,3	29,2	29,3
Показник альвеографа (W), о.а.	362,3	295,2	335,6
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1145	1145	960
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	8
Стійкість до посухи, бал	4	6	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	6	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	7	9
Напрямок використання	слн	слн	слн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 20013012 **Назва сорту:** Реліквія **Заявник (код):** 2753 2754 2755 2756 2757**Власник сорту (код):** 2753 2754 2755 2756 2757**Дата пріоритету:** 21.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230790**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	середні	5	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	помірне	5	
18	Нижня колоскова луска: Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска: Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска: Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска: Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кінь	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	відсутній або дуже слабкий	1	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,25	4,71	4,19
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,41	0,05	0,24
+, - до усередненої урожайності, %	14,4	1,1	6,1
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	93	93	91
Висота рослини, см	81,6	93,7	96,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	32,1	39,7	39,7
Вміст білка, %	13,9	13,5	14,3
Вміст сирової клейковини, %	27,6	27,3	29,2
Показник альвеографа (W), о.а.	245	246	221
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	890	915	1025
Стійкість до вилягання, бал	8	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	3	6	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	5
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Напрямок використання	Ф	Ф	Ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 22013003 Назва сорту: Сінді Заявник (код): 2076 2616 Власник сорту (код): 880 2616

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230548

Дата пріоритету: 24.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230863

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	низька	3	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	середній	5	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	середнє	5	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	темне	7	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина/ ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	короткий	3	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	тупі	1	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	ознака не визначалась	0	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,73	5,19	4,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,11	0,53	0,19
+, - до усередненої урожайності, %	-3,9	11,4	4,8
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	89	92	91
Висота рослини, см	59,6	75	75
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	31,4	39,8	41,7
Вміст білка, %	13,7	13,7	13,6
Вміст сирової клейковини, %	29,2	26,7	27
Показник альвеографа (W), о.а.	272	271,5	284,3
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	1030	935	923,3
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	4	7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	6
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	7
Стійкість проти мухи шведської, бал	7	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	7	9
Напрямок використання	цїн	цїн	цїн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця м'яка (яра) *Triticum aestivum* L.**Заявка №** 20013003 **Назва сорту:** Танок **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230609**Дата пріоритету:** 13.05.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230861**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Колос: восковий наліт	помірний	5	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу і найближчим вузлом)	помірно виповнена	5	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	пірамідальна	1	
12	Колос: за щільністю	нешільний	3	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3	
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок в середині колоса)	вузьке	3	
19	Нижня колоскова луска: Плече за формою	піднесене	4	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	5	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначалась	0	
24	Зернівка: забарвлення	біле	1	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Зернівка: за довжиною	середня	5	
28	Зернівка: за шириною	середня	5	
29	Зернівка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
30	Зернівка: за крупністю	середня	5	
31	Язичок: виявлення	середній	5	
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1	
33	Вушка: за формою	гострі	2	
34	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3	
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	яйцеподібна	1	
36	Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки	слабкий	3	
37	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,84	4,66	3,95
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,01	4,55	3,90
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,17	-0,11	-0,05
+, - до усередненої урожайності, %	6,0	-2,4	-1,3
Довірчий інтервал, т/га	0,18	0,19	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	91	92	90
Висота рослини, см	85,6	92,9	92,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	31,7	38,6	40,6
Вміст білка, %	14,6	15,1	16,4
Вміст сирової клейковини, %	30,8	30,5	34,9
Показник альвеографа (W), о.а.	223	238,3	216
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	840	905	890
Стійкість до вилягання, бал	8	4	5
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	4	6	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	6
Стійкість проти бурої іржі, бал	7	7	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	8
Стійкість проти мухи шведської, бал	8	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	9
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця спельта (озима) *Triticum spelta* L.

Заявка № 21539001 Назва сорту: Білбері Заявник (код): 2783 Власник сорту (код): 2783

Дата пріоритету: 24.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230792

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
2	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутні або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	слабкий	3	
9	Рослина: за висотою (стебло, колос)	середня	5	
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабо виповнена	3	
11	Колос: форма (вигляд збоку)	веретеноподібна	5	
12	Колос: за щільністю	дуже нещільний	1	
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	дуже довгий	9	
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні зубці	2	
15	Колос: довжина зубців / остюків на верхівці за довжиною	дуже короткі	1	
16	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3	
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	широке	7	
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	пряме	3	
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	дуже короткий	1	
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3	
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	середньо зігнутий	3	
24	Зернівка: забарвлення	інше	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
26	Тип розвитку	ознака не визначалась	0	
27	Лише для сортів пшениці шарозерної. Колос (остистий): зазубленість остюків	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	
29	Лише для сортів пшениці шарозерної. Рослина: тенденція до вилягання	ознака не визначається	0	
30	Лише для сортів пшениці шарозерної. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
31	Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки	помірний	5	
32	Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,75	5,48	4,90
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	4,63	6,63	6,48
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,88	1,15	1,58
+, - до усередненої урожайності, %	23,5	21,0	32,2
Довірчий інтервал, т/га	0,50	0,47	0,29
Тривалість періоду вегетації, діб	276	266	271
Висота рослини, см	105,9	104,1	110,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,7	48,7	59,9
Вміст білка, %	15,1	14,9	14
Вміст клейковини, %	31,6	30,8	27,7
Показник альвеографа (W), о.а.	157	110	84
Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл	750	760	740
Стійкість до вилягання, бал	7	5	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	8	5
Стійкість проти бурі іржі, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	9	9
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	9
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	9	7
Морозостійкість за штучного проморожування, бал	5,5		
Блок	1	1	1
Напрямок використання	ф	ф	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка № 21006001 Назва сорту:** Аурата **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 30.10.2023 **Патент №** 230647**Дата пріоритету:** 04.01.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023**Свідectво про державну реєстрацію №** 230757**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	мала	3	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабо забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідална	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	яйцеподібна	3	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	довгий	7	
35	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної. Рослина: час досягання зерна	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,14	3,54	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	2,88	4,31	
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,74	0,77	
+, - до усередненої урожайності, %	34,6	21,8	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,21	
Тривалість періоду вегетації, діб	89	90	
Висота рослини, см	86,2	91,5	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	35,9	41,1	
Вміст білка, %	14,8	14,4	
Стійкість до вилягання, бал	8	6	
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	6	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	8	8	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрямок використання	х	х	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Пшениця туранська *Triticum turgidum* L. subsp. *uranicum* (Jakubz.) A. Love & D. Love

Заявка № 21663002 Назва сорту: Пектораль **Заявник (код):** 2706

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230612**

Дата пріоритету: 03.02.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптель: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	дуже висока	9	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	видовжена	5	
16	Нижня колоскова луска: Плече: за формою	піднесене з наявністю другої вершини	5	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	прямий	1	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	світло-коричневе	2	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	короткий	3	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабо забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	довгий	7	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	3	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	короткий	3	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної. Колос: ламкість	ознака не визначалась	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної. Зернівка: маса	ознака не визначалась	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної рослина: час досягання зерна	ознака не визначалась	0	

Вид: Пшениця туранська *Triticum turgidum* L. subsp. *turanicum* (Jakubz.) A. Love & D. Love**Заявка № 21663001 Назва сорту:** Сармат **Заявник (код):** 2706**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230611**Дата пріоритету:** 06.01.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптель: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	велика	7	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	пізній	7	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	помірний	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Соломина: опушення верхнього вузла	слабке	3	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	дуже видовжена	7	
16	Нижня колоскова луска: Плече: за формою	піднесене з наявністю другої вершини	5	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	середній	5	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	2	
20	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	наявне	9	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	коричневе	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опушення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	помірне	5	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за досягання	слабо забарвлене	2	
26	Колос: форма	пірамідальна	1	
27	Колос: за щільністю	щільний	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	середній	5	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1	
33	Язичок: за формою	трикутний	2	
34	Язичок: за довжиною	середній	5	
35	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Лише для сортів пшениці двозерної. Колос: ламкість	ознака не визначалась	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної. Зернівка: маса	ознака не визначалась	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної рослина: час досягання зерна	ознака не визначалась	0	

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 21022001 Назва сорту: Златоуст **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230615**

Дата пріоритету: 01.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230741

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	відсутня або дуже слабка	1	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	ранній	3	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	середньо виповнена	5	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	нещільний	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	широкий	7	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	гладенька	9	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	сильна	7	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначена	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,12	5,33
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,94	6,12
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,82	0,79
+, - до усередненої урожайності, %		29,7	14,8
Довірчий інтервал, т/га		0,22	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб		277	269
Висота рослини, см		87,4	101,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		50	46
Череззерниця, %		4,3	5,9
Вміст білка, %		11	11,3
Вміст морозобійних зерен, %		0	3,5
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до обсіпання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		9	5
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	7
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	7
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt.**Заявка №** 21288001 **Назва сорту:** Кріпость харківська **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 02.05.2023 **Патент №** 230285**Дата пріоритету:** 04.01.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230758**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за плодючістю	ознака не визначалась	0	
2	Колеоптіль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	дуже довгий	9	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	дуже великий	9	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	нещільний	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	вузький	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричнєве	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	поникле	9	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,57	3,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,57	3,72
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,00	-0,06
+, - до усередненої урожайності, %		0,0	-1,6
Довірчий інтервал, т/га		0,48	0,26
Тривалість періоду вегетації, діб		96	95
Висота рослини, см		79,9	81,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		47,8	41,6
Череззерниця, %		3,9	6,6
Вміст білка, %		13,6	13,9
Вміст пророслих зерен, %		1	0,4
Стійкість до вилягання, бал		9	9
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	6
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		7	7
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Тритикале (яре) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 21288002 Назва сорту: Опора харківська **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.05.2023 **Патент № 230286**

Дата пріоритету: 04.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230759

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за плоідністю	ознака не визначалась	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	відсутня або дуже слабка	1	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	ранній	3	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на півхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	помірно щільне	5	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	вузький	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	світле	3	
26	Тип розвитку	ярий	3	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	нааявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,57	3,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,90	3,85
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,33	0,07
+, - до усередненої урожайності, %		7,2	1,9
Довірчий інтервал, т/га		0,48	0,26
Тривалість періоду вегетації, діб		95	94
Висота рослини, см		84,1	91,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		45,3	41,4
Череззерниця, %		5,3	5,9
Вміст білка, %		13,8	13,8
Вміст пророслих зерен, %		1	0,4
Стійкість до вилягання, бал		6	8
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	7
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		7	5
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (дворучка) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 20612002 Назва сорту: Еволюція **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230634**

Дата пріоритету: 01.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230955

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: зависотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	веретеноподібна	7	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначалася	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовженоеліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалася	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалася	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Ярий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,06	4,00	2,96
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,86	4,51	3,97
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,80	0,51	1,01
+, - до усередненої урожайності, %	87,4	12,7	34,1
Довірчий інтервал, т/га	0,60	0,55	0,45
Тривалість періоду вегетації, діб	80	79	73
Висота рослини, см	55,4	58,2	56,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,3	50,6	45,4
Вміст білка, %	13,5	13,7	12,4
Вирівняність зерна, %	94,2	97,1	91,1
Стійкість до вилягання, бал	6	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	7	5
Стійкість проти борошнистої роси, бал	6	8	6
Стійкість проти бурого іржі, бал	6	7	7
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	6	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Озимий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,09	5,41	5,14
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	5,99	7,14	7,15
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,90	1,73	2,01
+, - до усередненої урожайності, %	46,5	32,0	39,1
Довірчий інтервал, т/га	0,86	0,60	0,47
Тривалість періоду вегетації, діб	263	264	254
Висота рослини, см	89,1	87,2	89,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	43,1	48,8	46,3
Вміст білка, %	11,5	11,1	10,7
Стійкість до вилягання, бал	6	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	8	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	8
Стійкість проти бурого іржі, бал	7	8	8
Стійкість проти гельмінтоспороозу, бал	8	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	8
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (дворучка) *Hordeum vulgare* L.**Заявка №** 20612001 **Назва сорту:** Русин **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.10.2023 **Патент №** 230633**Дата пріоритету:** 01.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230954**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	відсутній або дуже слабкий	1	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: зависотою (стебло, колос та остюки)	низька	3	до середньої
13	Колос: кількість рядів	більше двох	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначалася	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівка	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовженоеліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівкових сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	широкий (біля основи остюка напливи)	3	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	неповне	1	
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабо виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалася	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалася	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Ярий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,06	4,00	2,96
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,71	4,27	3,81
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,65	0,27	0,85
+, - до усередненої урожайності, %	80,1	6,8	28,7
Довірчий інтервал, т/га	0,60	0,55	0,45
Тривалість періоду вегетації, діб	80	79	74
Висота рослини, см	56,1	57,2	59,6
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	40,8	50,7	43,9
Вміст білка, %	13,3	13,8	12,7
Вирівняність зерна, %	95,6	97,1	91,9
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	6
Стійкість до посухи, бал	6	7	5
Стійкість проти борошнистої роси, бал	6	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	6	7	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	6	7	7
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	8
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Озимий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,09	5,41	5,14
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,16	6,73	7,08
+, - до усередненої урожайності, т/га	2,07	1,32	1,94
+, - до усередненої урожайності, %	50,6	24,4	37,7
Довірчий інтервал, т/га	0,86	0,60	0,47
Тривалість періоду вегетації, діб	262	264	254
Висота рослини, см	84,3	89,7	89,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,2	48,8	47,1
Вміст білка, %	11,9	11,7	11,1
Стійкість до вилягання, бал	6	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	9	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 21019009 Назва сорту:** Мелія **Заявник (код):** 2302 **Власник сорту (код):** 2302**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230559**Дата пріоритету:** 09.07.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230470**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	висока	7	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	помірна	5	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 21019011 Назва сорту: Нептун **Заявник (код):** 2545 **Власник сорту (код):** 947

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230561**

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230472

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	сильне забарвлення	3	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшквата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рудиментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 21019010 Назва сорту:** Румкас **Заявник (код):** 2302 **Власник сорту (код):** 2302**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230560**Дата пріоритету:** 09.07.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230471**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	наявне	9	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	відсутнє	1	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначається	0	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	пряме	1	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	сильне забарвлення	3	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	широкий (біля основи остюка напливи)	3	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 21019001 Назва сорту: Тур Заявник (код): 2783 Власник сорту (код): 2783

Дата пріоритету: 24.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230810

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє	1	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	ознака не визначається	0	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	слабка	3	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	шість	2	
14	Колос: форма	циліндрична	5	
15	Колос: за щільністю	щільний	7	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	середній	2	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колоса: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	ознака не визначається	0	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	помірне	5	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	наявне	9	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	озимий	1	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшувата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	ознака не визначалась	0	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	ознака не визначалась	0	
43	Квіткова луска: форма основи	скошена	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	4,38	5,46	4,96
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,33	7,24	6,46
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,95	1,78	1,50
+, - до усередненої урожайності, %	44,5	32,6	30,2
Довірчий інтервал, т/га	0,70	0,69	0,45
Тривалість періоду вегетації, діб	262	265	255
Висота рослини, см	83,8	86,1	84,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	37,2	44,9	39
Вміст білка, %	11,4	11,7	11,6
Стійкість до вилягання, бал	6	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	7
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі і ржі, бал	9	8	6
Стійкість проти гельмінтоспозу, бал	9	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	8	9	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	5	8	7
Блок	2	2	2
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 21020005 Назва сорту:** Брант **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.10.2023 **Патент №** 230635**Дата пріоритету:** 03.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230811**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	пряме	1	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: забування внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,60	5,75	4,51
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,26	0,56	0,47
+, - до усередненої урожайності, %	7,8	10,8	11,6
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	85	88	83
Висота рослини, см	53,2	59,9	54,9
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41	49,9	45,2
Вміст білка, %	11,8	13	11,9
Вирівняність зерна, %	89,7	98,8	93,9
Стійкість до вилягання, бал	9	6	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	7	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	7	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 20020008 Назва сорту: Генерал **Заявник (код):** 2706 **Власник сорту (код):** 2706

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230616**

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230867

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,81	4,84	4,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,47	-0,35	0,23
+, - до усередненої урожайності, %	14,1	-6,7	5,7
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	87	85	80
Висота рослини, см	83,1	66,7	71,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,1	52,1	46,7
Вміст білка, %	12,8	13,7	14,1
Вирівняність зерна, %	94,3	98,2	96,7
Стійкість до вилягання, бал	6	5	4
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	7
Стійкість до посухи, бал	8	6	5
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 22020001 Назва сорту:** ІС МАЛТИГО **Заявник (код):** 2858 **Власник сорту (код):** 2858**Дата пріоритету:** 06.01.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230827****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	сильна	7	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нешільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,42	5,43	4,50
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,08	0,24	0,46
+, - до усередненої урожайності, %	2,4	4,6	11,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	83	88	83
Висота рослини, см	53,6	60,6	60,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	46,5	52,2	49,1
Вміст білка, %	12,6	12,7	12
Вирівняність зерна, %	94,7	99,1	98,4
Стійкість до вилягання, бал	9	7	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	5	8	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	7	7	8
Стійкість проти гельмінтоспорозу, бал	7	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 20020009 Назва сорту: Незламний **Заявник (код):** 2706 **Власник сорту (код):** 2706

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230617**

Дата пріоритету: 02.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230868

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	короткий	3	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борідки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабо виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,88	4,87	4,09
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,54	-0,32	0,05
+, - до усередненої урожайності, %	16,2	-6,2	1,2
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	88	85	81
Висота рослини, см	79,9	69,1	71,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	45,2	52,8	46,4
Вміст білка, %	12,6	12,9	14
Вирівняність зерна, %	94,2	98,4	96,1
Стійкість до вилягання, бал	6	4	6
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	7	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	5
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка № 22020004 Назва сорту:** Покоління Заявник (код): 2706 Власник сорту (код): 2706**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент № 230619****Дата пріоритету:** 24.01.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230870****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	відсутня або дуже слабка	1	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	сильна	7	
10	Колос: восковий наліт	сильний	7	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	середній	5	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: забування внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшквата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,33	5,29	4,42
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,01	0,10	0,38
+, - до усередненої урожайності, %	-0,3	1,9	9,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	84	88	81
Висота рослини, см	55,1	64,1	64,5
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48	53,9	48,3
Вміст білка, %	12,5	12,8	12,3
Вирівняність зерна, %	96,7	99,2	97,3
Стійкість до вилягання, бал	8	5	7
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	7	7	8
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	9
Стійкість проти гельмінтоспороїзу, бал	7	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 22020009 Назва сорту: Тася Заявник (код): 2302 Власник сорту (код): 2302

Дата пріоритету: 24.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230872

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	паралельне	1	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної борізки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	фронтальне	1	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	білясте	1	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	відсутній або рундментарний	1	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,69	6,14	4,86
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	0,95	0,82
+, - до усередненої урожайності, %	10,5	18,3	20,3
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	82	88	82
Висота рослини, см	56,3	63	61,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	47,2	54,4	48,9
Вміст білка, %	11,1	12,4	11,1
Вирівняність зерна, %	95	99,2	97,9
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	пв	зерн	пв

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.**Заявка №** 20020010 **Назва сорту:** Шубін **Заявник (код):** 2706 **Власник сорту (код):** 2706**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230618**Дата пріоритету:** 02.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230869**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напівпрямий	3	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	помірний	5	
11	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	середня	5	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	рівні	2	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	довгі	2	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшківата	1	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	наявне	9	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3	
38	Язичок: ступінь виявлення	сильний	7	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,99	5,01	4,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,65	-0,18	0,30
+, - до усередненої урожайності, %	19,5	-3,5	7,4
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	87	84	80
Висота рослини, см	75,7	67,7	70,8
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,9	53,9	45,9
Вміст білка, %	12,9	13,3	13,9
Вирівняність зерна, %	94,8	98,6	95,8
Стійкість до вилягання, бал	6	5	5
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	8	7	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	7	6
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	8	7
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	7	6
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	9	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 22020008 Назва сорту: Ювента Заявник (код): 2302 Власник сорту (код): 2302

Дата пріоритету: 24.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230871

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (форма куща)	напіврозлогий	5	
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9	
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірна	5	
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	середня	5	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5	
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	наявне	9	
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	помірна	5	
10	Колос: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
11	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	
12	Рослина: за довжиною (стебло, колос та остюки)	коротка	3	
13	Колос: кількість рядів	два	1	
14	Колос: форма	пірамідальна	3	
15	Колос: за щільністю	нещільний	3	
16	Колос: за довжиною (з остюками)	довгий	3	
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	довгі	7	
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5	
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	малий	3	
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	відхилене	3	
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3	
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1	
23	Зернівка: плівчастість	наявна	9	
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	відсутня або дуже слабка	1	
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	слабке	3	
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1	
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2	
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	слабке забарвлення	2	
29	Тип розвитку	ярий	3	
30	Колос: остюки	наявні	9	
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5	
32	Зернівка: форма	еліптична	3	
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	грубозморшкувата	9	
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	1	
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2	
36	Вушка: форма верхівки	шилоподібна	3	
37	Вушка: охоплення соломини	повне	2	
38	Язичок: ступінь виявлення	середній	5	
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	слабко виповнена	3	
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9	
41	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
42	Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів)	розвинутий	2	
43	Квіткова луска: форма основи	не скошена	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	3,34	5,19	4,04
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,40	6,11	4,66
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,06	0,92	0,62
+, - до усередненої урожайності, %	1,8	17,7	15,3
Довірчий інтервал, т/га	0,13	0,11	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	84	88	83
Висота рослини, см	57,1	62,3	60,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	48,6	57,1	51,2
Вміст білка, %	11,3	12	11,6
Вирівняність зерна, %	95,7	99,2	98,5
Стійкість до вилягання, бал	9	8	8
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	6
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал	8	9	8
Стійкість проти гельмінтоспориозу, бал	8	8	5
Стійкість проти внутрішньостеблових шкідників, бал	7	9	9
Блок	1	1	1
Напрямок використання	пв	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: БОБОВІ

Горох посівний (зерновий)
Квасоля звичайна (зернова)
Нут звичайний



Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 21023001 Назва сорту: Аякс Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 30.10.2023 Патент № 230636

Дата пріоритету: 04.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230720

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціяція	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	довге	7	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (ozn. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	довгий	7	
16	Прилисток: за шириною	широкий	7	
17	Прилисток: розмір	великий	7	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціяції стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	середня	5	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітков	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	помірний	5	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (ozn. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	велика	7	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насінина: форма	еліптична	1	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,76	2,53
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		3,06	2,52
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,30	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %		10,9	-0,4
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		79	80
Висота рослини, см		91,1	79,9
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		197,5	184,6
Придатність до механізованого збирання, бал		7,6	8,1
Висота прикріплення нижнього бобу, см		66,6	57,2
Стійкість до вилягання, бал		5	5
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		5	6
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	5
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		9	9
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал		7	7
Стійкість проти антракнозу, бал		8	8
Вміст білка, %		24,7	25,1
Блок		3	3
Напрямок використання		зерн	зерн
Якість		сбіл	сбіл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 18023003 Назва сорту: Велетень **Заявник (код):** 1591 **Власник сорту (код):** 1591

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 **Патент № 230509**

Дата пріоритету: 29.11.2018

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230742

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	довге	7	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (ozn. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	середня	5	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	три	5	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	округла	3	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	довга	7	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	довга	7	
36	Квітконос: кількість приквітів	середня	2	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (ozn. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	сферична	5	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,76	2,53
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		2,76	2,20
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,00	-0,33
+, - до усередненої урожайності, %		0,0	-13,0
Довірчий інтервал, т/га		0,25	0,16
Тривалість періоду вегетації, діб		78	78
Висота рослини, см		83,1	99,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		212,7	204,3
Придатність до механізованого збирання, бал		7,8	7,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см		45,8	58,3
Стійкість до вилягання, бал		4	4
Стійкість до обсіпання, бал		7	8
Стійкість до посухи, бал		7	6
Стійкість проти пероноспорозу, бал		6	8
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		9	9
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал		7	7
Стійкість проти антракнозу, бал		7	7
Вміст білка, %		24,9	25,5
Блок		3	3
Напрямок використання		зерн	зерн
Якість		сбіл	сбіл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.**Заявка №** 21023005 **Назва сорту:** Оркестра **Заявник (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230594**Дата пріоритету:** 20.12.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	коротка	3	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	середній	5	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	слабка	3	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітков	середня	2	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насіннина: форма	циліндрична	2	
49	Насіннина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насіннини і простим типом крохмальних зерен. Насіннина: зморшкуватість сім'ядолей	відсутня	1	
51	Лише сорти з насіннінами із складним типом крохмальних зерен. Насіннина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: мармуровість насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінневій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насіннина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінневої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: забарвлення насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.**Заявка № 21023006 Назва сорту:** Остінато **Заявник (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230595**Дата пріоритету:** 20.12.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	середня	5	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	коротка	3	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	пізній	7	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітнонос: верхівка (шпора) за довжиною	середня	5	
34	Квітнонос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітнонос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітнонос: кількість приквітків	середня	2	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	відсутній або частковий	1	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	відсутнє	1	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	наявні	9	
46	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшкуватість сім'ядолей	відсутня	1	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насінневій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	темніше за насінневу шкірку	2	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.

Заявка № 22023001 Назва сорту: Протін **Заявник (код):** 2076 **Власник сорту (код):** 880

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230526**

Дата пріоритету: 24.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230851

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціяція	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (ozn. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	коротка	3	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	довгий	7	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціяції стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	вигнута	7	
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5	
31	Квітка: чашолисток за шириною	вузький	3	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	гостра	2	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітков	середня	2	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	ознака не визначається	0	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (ozn. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насінневих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
48	Насіннина: форма	циліндрична	2	
49	Насіннина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насіннини і простим типом крохмальних зерен. Насіннина: зморшкуватість сім'ядолей	відсутня	1	
51	Лише сорти з насіннинами із складним типом крохмальних зерен. Насіннина: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насіннина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: мармуровість насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: фіолетові чи рожеві плями на насінневій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насіннина: забарвлення рубчика	не відрізняється від насінневої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насіннина: забарвлення насінневої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,99	2,78
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		3,36	2,46
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,37	-0,32
+, - до усередненої урожайності, %		12,4	-11,5
Довірчий інтервал, т/га		0,23	0,13
Тривалість періоду вегетації, діб		81	84
Висота рослини, см		66,5	66,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 14%), г		243,3	238,7
Придатність до механізованого збирання, бал		8,1	8,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см		48,7	45,4
Стійкість до вилягання, бал		5	8
Стійкість до обсіпання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	7
Стійкість проти гнилей кореневих, бал		9	9
Стійкість проти аскохітозу (боби, зерно), бал		7	7
Стійкість проти антракнозу, бал		7	8
Вміст білка, %		25,9	25,5
Блок		4	4
Напрямок використання		зерн	зерн
Якість		сбіл	сбіл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Горох посівний (зерновий) *Pisum sativum* L.**Заявка №** 21023007 **Назва сорту:** Симбіоз **Заявник (код):** 1783**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230596**Дата пріоритету:** 20.12.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	коротке	3	
5	Стебло: кількість вузлів (перший фертильний вузол включно)	велика	7	
6	Листки: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	відсутні	1	
9	Листок: максимальна кількість листочків	ознака не визначається	0	
10	Листочок: розмір	ознака не визначається	0	
11	Листочок: за довжиною	ознака не визначається	0	
12	Листочок: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Листочок: положення найширшої частини	ознака не визначається	0	
14	Листочок: зубчастість	ознака не визначається	0	
15	Прилисток: за довжиною	середній	5	
16	Прилисток: за шириною	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	коротка	3	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	не щільна	3	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	довгий	7	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	середній	5	
24	Рослина: час цвітіння	середній	5	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
28	Квітка: парус за шириною	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	пряма	5	
30	Квітка: хвилястість паруса	помірна	5	
31	Квітка: чашолисток за шириною	середній	5	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітков	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	довгий	7	
38	Біб: за шириною	широкий	7	
39	Біб: пергаментний шар	суцільний	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	відсутній або дуже слабкий	1	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (озн. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
47	Нестигле насіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насінина: форма	циліндрична	2	
49	Насінина: тип крохмальних зерен	простий	1	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насінина: зморшуватість сім'ядолей	відсутня	1	
51	Лише сорти з насінинами із складним типом крохмальних зерен. Насінина: інтенсивність зморшуватості сім'ядолей	ознака не визначається	0	
52	Насінина: забарвлення сім'ядолей	жовте	2	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насінина: забарвлення рубчика	темніше за насіннєву шкірку	2	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насінина: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.**Заявка № 21025001 Назва сорту:** Садгорянка **Заявник (код):** 2723**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.10.2023 **Патент №** 230625**Дата пріоритету:** 07.09.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилі	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: зморшуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	округла	3	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно над листками	3	
15	Квітка: розмір приквітков	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	короткий	3	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	помірний	5	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	жовте	1	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	наявна	9	
30	Біб: ступінь вигину	помірний	5	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	довгий	7	
34	Біб: вигин дзьобика	відсутній або дуже слабкий	1	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабо шерехата	3	
36	Біб: звуження (в сухому стані)	відсутнє або дуже слабке	1	
37	Насіння: маса	велика	7	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	вузька	3	
42	Насіння: за довжиною	середня	5	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	пізній	7	
49	Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMV)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,9. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 12. Тривалість періоду вегетації, дб – 83. Кількість бобів на рослині, шт. – 12. Вміст білка, % – 23. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 9. Дружність достигання, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 470. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum*) – 8, аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Нут звичайний *Cicer arietinum* L.

Заявка № 20028001 Назва сорту: Октавіус **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230632**

Дата пріоритету: 16.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230893

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус (після цвітіння)	прямий	1	
2	Рослина: галуження	помірне	5	
3	Рослина: за висотою (за повного розвитку бобів)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листочок: розмір	середній	5	
7	Квітка: забарвлення	біле	1	
8	Біб: плодоніжка за довжиною	довга	7	
9	Біб: розмір	середній	5	
10	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
12	Біб: кількість насінин	переважно одна	1	
13	Насінина: забарвлення (через місяць після збирання)	бежеве	2	
14	Насінина: інтенсивність забарвлення (як для озн. 13)	помірна	5	
15	Насіння: маса	середня	5	
16	Насінина: форма	від кулястої до кутастої	2	
17	Насінина: ребристість	відсутня або дуже слабка	1	
18	Час цвітіння (80% рослин із щонайменше однією квіткою)	ранній	3	
19	Час достигання насіння	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,5. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 20. Вміст білка, % – 25. Висота рослин, см – 65. Маса 1000 зерен, г – 310. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз – 7; кореневі гнилі – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): зернівка – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КРУП'ЯНІ

Просо посівне



Вид: Просо посівне *Panicum miliaceum* L.

Заявка № 21014001 Назва сорту: Переможне **Заявник (код):** 1581 **Власник сорту (код):** 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.05.2023 **Патент № 230281**

Дата пріоритету: 04.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230747

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Прапорцевий листок: положення листкової пластинки	пряме	1	
2	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
4	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
5	Прапорцевий листок: за шириною	широкий	7	
6	Стебло: кількість вузлів	мала	3	
7	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	коротке	3	
8	Стебло: міжвузля за товщиною	товсте	7	
9	Час виявлення волоті	середній	5	
10	Рослина: за висотою (стебло та волоть)	середня	5	
11	Волоть: кут відхилення гілочок	дуже гострий	1	
12	Волоть: положення у просторі	помірно похиле	3	
13	Волоть: головна вісь за довжиною (без квітконіжки)	дуже довга	9	
14	Волоть: за шириною	середня	5	
15	Волоть: за щільністю	нещільна	3	
16	Волоть: ступінь вигину бічних гілочок	слабкий	3	
17	Волоть: кількість подушечок	мала	3	
18	Волоть: гілочки першого порядку за довжиною	довгі	7	
19	Колосок: форма	широкоеліптична	2	
20	Колосок: інтенсивність жовтого забарвлення	помірна	5	
21	Колоскова луска: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Приймочка маточки: забарвлення	світло-рожеве	1	
23	Зернівка: розмір	середній	5	
24	Зернівка: форма	округла	3	
25	Зернівка: забарвлення	темно-жовте	5	
26	Зернівка: плямистість	наявна	9	
27	Зернівка: розмір плям	середній	5	
28	Маса 1000 зерен	велика	7	
29	Ядро (не шліфоване): забарвлення	світло-жовте	2	
30	Ядро: інтенсивність коричневого забарвлення насіннєвого рубчика	помірна	2	
31	Ядро: тип ендосперму	восковий	1	
32	Стійкість проти ураження расами сажки (<i>Sporisorium destruens</i> Yank)	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,90	3,29	2,63
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,54	4,21	3,14
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	0,92	0,51
+, - до усередненої урожайності, %	22,1	28,0	19,4
Довірчий інтервал, т/га	0,46	0,24	0,27
Тривалість періоду вегетації, діб	89	104	94
Висота рослини, см	112,7	127	134,1
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	8,3	7,4	7,9
Вимолочуваність, бал	9	8,3	7,6
Вміст білка, %	13,8	12,1	10,8
Плівковість, %	17,9	18	18,5
Вихід крупи, %	78	77,8	77,2
Стійкість до вилягання, бал	6	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	6
Стійкість до посухи, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу плямистого, бал	9	7	8
Стійкість проти сажки, бал	9	9	8
Стійкість проти просяного комарика, бал	9	7	7
Напрямок використання	х	х	х

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОЛІЙНІ ТА ПРЯДИВНІ

Гірчиця біла

Льон звичайний (озимий)

Льон низький (олійний, кудряш)

Ріпак (озимий)

Соняшник однорічний – батьківський компонент



Вид: Гірчиця біла *Sinapis alba* L.

Заявка № 23380001 Назва сорту: КОЗАЧКА **Заявник (код):** 3223 3224 3225

Власник сорту (код): 3223 3224 3225

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230578**

Дата пріоритету: 01.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230761

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядоля: за довжиною	від середньої до довгої	6	
4	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
5	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
6	Листок: кількість часток (за повного розвитку листка)	велика	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка й черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
11	Час цвітіння	середній	5	
12	Рослина: за висотою під час цвітіння	середня	5	
13	Квітка: жовте забарвлення пелюсток	помірне	5	
14	Квітка: пелюстки за довжиною	від середніх до довгих	6	
15	Квітка: пелюстки за шириною	від середніх до широких	6	
16	Рослина: за загальною довжиною	середня	5	
17	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою і носиком)	середній	5	
18	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
19	Стручок: за шириною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Стручок: кількість насінин	середня	5	
22	Насіння: маса 1000 шт.	середня	5	
23	Розвиток генеративних органів у рік сівби для пізньолітнього обстеження	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин, см – 117. Тривалість періоду вегетації, діб – 95. Урожайність насіння (за стандартної вологості 10%), т/га – 2,6. Маса 1000 насінин, г – 5,2. Вміст в насінні, %: олії – 33; білка – 29. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): філостиктоз (*Phyllosticta sinapis* V. Bond.-Mont.) – 8; борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *brassicae* Hammarl.) – 7; біла гниль (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7; кила (*Plasmodiophora brassicae* Wor.) – 8; септоріоз (*Septoria sinapis* Rodigin.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): гірчичний клоп (*Eurydema ornata* L.) – 8; гірчичний листоїд (*Colaphellus sophiae* Schall.) – 7; хрестоцвіті блішки (*Phyllotreta*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Льон звичайний (озимий) *Linum usitatissimum* L.

Заявка № 21249001 Назва сорту: ЛСЛ 1133 **Заявник (код):** 2804 **Власник сорту (код):** 2804

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент №** 230604

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 12.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230824

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	фіолетове	4	
2	Час початку цвітіння	ранній	3	
3	Віночок: розташування пелюсток	доторкуються	2	до перекриваються
4	Віночок: забарвлення	фіолетове	5	
5	Квітка: розмір віночка	середній	5	
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	від округлої до п'ятикутної	2	
7	Пелюстка: за довжиною	коротка	3	до середньої
8	Пелюстка: за шириною	середня	5	
9	Пелюстка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	біле	1	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	біле	1	
12	Піляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	жовте	3	
14	Рослина: за висотою	низька	3	
15	Коробочка: розмір	середній	5	
16	Коробочка: віхатість несправжніх перетинок	відсутня	1	
17	Коробочка: за довжиною	середня	5	
18	Коробочка: за шириною	середня	5	до широкої
19	Коробочка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	дуже коротке	1	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	дуже коротке	1	
22	Насіння: маса 1000 шт	мала	3	
23	Насінина: забарвлення	коричневе	3	
24	Насінина: за довжиною	коротка	2	
25	Насінина: за шириною	середня	3	
26	Насінина: відношення довжина/ширина	дуже велике	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 8–12%), т/га – 2,5. Маса 1000 насінин, г – 6,1. Вміст олії в насінні, % – 44, білка, % – 23. Вміст в олії, %: ліноленової кислоти – 57, лінолевої кислоти – 14, олеїнової кислоти – 14. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 7, іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 8, пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 8; антракноз (*Colletotrichum lini* Manns et Bolley) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова блішка (*Aphtona euphorbiae* Schrnk.) – 8, льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 7, льонова плодожерка (*Cochylis epilina* Duponchel) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Льон низький (олійний, кудряш) *Linum humile* Mill.

Заявка № 21035001 Назва сорту: Ланселот **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 25.10.2023 **Патент № 230605**

Дата пріоритету: 11.02.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230859

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Пелюстка: забарвлення у фазі пуп'янка	блакитно-фіолетове	3	
2	Час початку цвітіння	середній	5	
3	Віночок: розташування пелюсток	доторкуються	2	
4	Віночок: забарвлення	помірно блакитне	7	
5	Квітка: розмір віночка	малий	3	до середнього
6	За винятком сортів з білим віночком. Квітка: форма серединки віночка	округла	1	
7	Пелюстка: за довжиною	середня	5	
8	Пелюстка: за шириною	середня	5	
9	Пелюстка: відношення довжина / ширина	дуже велике	9	
10	Тичинка: забарвлення дистальної частини нитки	біле	1	
11	Тичинка: забарвлення базальної частини нитки	біле	1	
12	Пиляк: забарвлення	блакитнувате	4	
13	Маточка: забарвлення	біле	1	
14	Рослина: за висотою	низька	3	до середньої
15	Коробочка: розмір	середній	5	до великого
16	Коробочка: війчастість несправжніх перетинок	наявна	9	
17	Коробочка: за довжиною	середня	5	до довгої
18	Коробочка: за шириною	середня	5	
19	Коробочка: відношення довжина / ширина	середнє	5	до великого
20	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до першої гілочки	коротке	3	
21	Стебло: за довжиною від підсім'ядольного коліна до верхівкової коробочки	коротке	3	
22	Насіння: маса 1000 шт	мала	3	до середньої
23	Насінина: забарвлення	коричнєве	3	
24	Насінина: за довжиною	довга	4	
25	Насінина: за шириною	дуже вузька	1	до вузької
26	Насінина: відношення довжина/ширина	дуже велике	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 8–12%), т/га – 2,9. Маса 1000 насінин, г – 7. Вміст олії в насінні, % – 45. Вміст в олії: ліноленової кислоти, % – 59, лінолевої кислоти, % – 16, олеїнової кислоти, % – 16. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 9. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): вертицильозне в'янення (вілт) (*Verticillium dahliae* Kleb.) – 6, фузаріозне в'янення (*Fusarium lini* Bolley.) – 7, іржа (*Melampsora lini* (Ehrenb.) Lev.) – 7, пасмо (*Phlyctaena linicola* Speg.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): льонова блішка (*Aphthona euphorbiae* Schrnk.) – 8, льоновий трипс (*Thrips lini* Ladurean.) – 8, льонова плодожерка (*Cochylis epilina* Duponchel) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 20040039 Назва сорту: Алекс Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 Патент № 230521

Дата пріоритету: 08.05.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230794

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	с	л	п
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,04	3,21	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,36	3,21	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,32	0	0,93
+, - до усередненої урожайності, %	15,7	0	37,5
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,14	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	294	313	308
Висота рослини, см	140,5	135,6	137,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	5	5,3
Вміст білка, %	18,9	18,1	16,9
Вміст олії, %	46,3	47,6	49,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0,2
Вміст глюкозинолатів, %	1,4	1,4	1,3
Стійкість до вилягання, бал	6	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	6	8
Стійкість до посухи, бал	6	5	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	3
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	8
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040053 Назва сорту: Коріда **Заявник (код):** 2076 **Власник сорту (код):** 880

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230549**

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230449

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040054 Назва сорту: Кросбі Заявник (код): 2076 Власник сорту (код): 880

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230550

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230450

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	до середнього
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040016 Назва сорту: Мессі **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230569**

Дата пріоритету: 05.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230444

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040022 Назва сорту: Резорт Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230573

Дата пріоритету: 15.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідectво про державну реєстрацію № 230447

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	слабка	3	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040019 Назва сорту: Тринідад **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230571**

Дата пріоритету: 05.04.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230446

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	до середнього
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	вузький	3	до середнього
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	до середнього
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera***Заявка № 21040017 Назва сорту:** Тріатлон **Заявник (код):** 912 **Власник сорту (код):** 912**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230570**Дата пріоритету:** 05.04.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 16.08.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230445**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	широкий	7	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довга	7	
11	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 20040040 Назва сорту: Юстас Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 Патент № 230522

Дата пріоритету: 08.05.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230795

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	довгий	7	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	помірна	5	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,04	3,21	2,48
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	2,09	3,10	2,67
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,05	-0,11	0,19
+, - до усередненої урожайності, %	2,5	-3,4	7,7
Довірчий інтервал, т/га	0,17	0,14	0,14
Тривалість періоду вегетації, діб	294	313	309
Висота рослини, см	143,3	131,7	144,3
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,5	4,6	5,1
Вміст білка, %	20,4	18	18,9
Вміст олії, %	45,9	48,1	47,7
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	1,3	1,3	1,4
Стійкість до вилягання, бал	7	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	5	6	7
Стійкість до посухи, бал	6	5	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	7	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	6	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	7	8
Блок	4	4	4
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 19939087 Назва сорту: 7ПВДХ67А **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230805

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	до помірного
14	Час цвітіння	середній	5	до пізнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошністої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939035 Назва сорту: 7ПВДХ67Б Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230551

Дата пріоритету: 03.02.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	дрібні	3	до помірних
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	слабке	3	до помірного
14	Час цвітіння	середній	5	до пізнього
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюяцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	хвилясте	3	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	оранжево-жовте	4	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	нечітко видовжені, нечітко округлі	2	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	до високої
29	Рослина: галушення (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галушення (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з зігнутим стеблом	5	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкоюяцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	сильно виражені	3	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 21939036 Назва сорту:** 7ПВЛХ62Р **Заявник (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230554**Дата пріоритету:** 10.11.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	до помірної
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабко виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	до вищого
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	малий	3	до середнього
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабко виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабко виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939047 Назва сорту: 7ПВЛХ62Р Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230808

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	до помірної
3	Листок: розмір	середній	5	до великого
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	до вищого
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	пізній	7	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	наявне	9	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	слабка	3	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	на рівні	2	
32	Кошик: положення	вертикальне	3	
33	Кошик: розмір	малий	3	до середнього
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	помірно коричневе	5	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка №** 21939035 **Назва сорту:** 7ПУГК32Р **Заявник (код):** 1688**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230553**Дата пріоритету:** 10.11.2021**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	до сильної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біля верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	до великого
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumanana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939046 Назва сорту: 7ПУГК32Р Заявник (код): 2715 Власник сорту (код): 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230807

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	дрібні	3	
7	Листок: форма поперечного перерізу	сильно увігнута	1	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до округлої	7	
9	Листок: вушка	великі	7	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	до сильної
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	наявне	9	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	переважно біла верхівки	4	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	вище	3	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	до великого
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	відсутні або дуже слабо виражені	1	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	ознака не визначається	0	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стойкість проти вовчка (<i>Orobanchе cumana</i>)	наявна	9	
44	Стойкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>halianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939056 Назва сорту: 7ПУКЦ97А **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230809

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабко виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькояйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькояйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939044 Назва сорту: 7ПУКЦ97Б Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230556

Дата пріоритету: 10.11.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	від широкотрикутної до загостреної	6	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	слабо виражені	2	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	дуже сильне	9	
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	щільно	7	
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	злегка випуклий	4	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 21939055 Назва сорту:** 7ПУХД10А **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідчення про державну реєстрацію № 230804****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	до вищого
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 21939043 Назва сорту: 7ПУХД10Б Заявник (код): 1688

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230555

Дата пріоритету: 10.11.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: пухирчастість	слабка	3	до помірної
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	слабко увігнута	2	
8	Листок: форма верхівки	широкотрикутна	5	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	гострий	1	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	на рівні	5	до вищого
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	сильне	7	
14	Час цвітіння	ранній	3	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	широкояйцеподібні	3	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескате	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко видовжені	1	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	середня	5	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	напівобернене донизу з прямим стеблом	4	
33	Кошик: розмір	середній	5	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	широкояйцеподібна	3	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	до товстої
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobanche cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.**Заявка № 20939146 Назва сорту:** ПХ1032А **Заявник (код):** 2715 **Власник сорту (код):** 2715**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідectvo про державну реєстрацію № 230806****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	до помірної
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	відсутнє	1	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабко виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	відсутня	1	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

Вид: Соняшник однорічний – батьківський компонент *Helianthus annuus* L.

Заявка № 20939177 Назва сорту: ПХ1032Б **Заявник (код):** 1688 1690

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230552**

Дата пріоритету: 28.12.2020

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	до помірної
3	Листок: розмір	середній	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Листок: пухирчастість	помірна	5	
6	Листок: зубці	помірні	5	
7	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	3	
8	Листок: форма верхівки	загострена	8	
9	Листок: вушка	помірні	5	
10	Листок: крила	відсутні або дуже слабо виражені	1	
11	Листок: кут між найнижчими бічними жилками	прямий або близький до прямого	2	
12	Листок: положення верхівки листка відносно місця прикріплення пластинки (на 2/3 висоти рослини)	вище	7	
13	Стебло: опушення верхівки (останні 5 см)	помірне	5	до сильного
14	Час цвітіння	середній	5	
15	Язичкові квітки: щільність розміщення	помірно щільно	5	до щільної
16	Язичкові квітки: за формою	вузькоюйцеподібні	2	
17	Язичкові квітки: положення відносно кошика	плескاته	1	
18	Язичкові квітки: за довжиною	середні	5	до довгих
19	Язичкові квітки: забарвлення	помірно жовте	3	
20	Трубчасті квітки: забарвлення	оранжеве	2	
21	Трубчасті квітки: антоціанове забарвлення приймочки	відсутнє	1	
22	Трубчасті квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення приймочки	ознака не визначається	0	
23	Трубчасті квітки: продукування пилку	наявне	9	
24	Листки обгортки: за формою	чітко округлі	3	
25	Листки обгортки: верхівка за довжиною	довга	7	
26	Листки обгортки: інтенсивність зеленого забарвлення зовнішнього боку	помірна	5	
27	Листки обгортки: положення відносно кошика	злегка охоплює	2	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: галуження (за винятком гілкування, викликаного умовами зовнішнього середовища)	відсутнє	1	
30	Рослина: тип галуження (як для 29)	ознака не визначається	0	
31	Рослина: природне положення найвищого бічного кошика відносно центрального кошика	ознака не визначається	0	
32	Кошик: положення	обернене донизу з прямим стеблом	6	
33	Кошик: розмір	великий	7	
34	Кошик: за формою з боку сім'янок	сильно випуклий	5	
35	Сім'янка: розмір	середній	5	
36	Сім'янка: форма	вузькоюйцеподібна	2	
37	Сім'янка: за товщиною відносно ширини	середня	5	
38	Сім'янка: основне забарвлення	чорне	7	
39	Сім'янка: смужки на краях	слабо виражені	2	
40	Сім'янка: смужки між краями	відсутні або дуже слабо виражені	1	
41	Сім'янка: забарвлення смужок	сіре	2	
42	Сім'янка: плямистість перикарпію	відсутня	1	
43	Стійкість проти вовчка (<i>Orobancha cumana</i>)	наявна	9	
44	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Plasmopara helianthi</i> Novot. F. <i>Helianthi</i> Novot.)	наявна	9	

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КАРТОПЛЯ

Картопля



Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088001 Назва сорту: АЛВЕРСТОН РАССЕТ Заявник (код): 2660 Власник сорту (код): 2660

Дата пріоритету: 02.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230896

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	до пізнього
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	мількі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	відсутнє або дуже слабке	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		25,09	19,88
Урожайність, т/га		22,06	21,69
+, - до усередненої урожайності, т/га		-3,03	1,81
+, - до усередненої урожайності, %		-12,1	9,1
Довірчий інтервал, т/га		9,32	10,51
Тривалість періоду вегетації, діб		130	126
Середня маса товарної бульби, г		90,9	95,6
Вміст крохмалю, %		15,3	16,5
Збір крохмалю, т/га		33,75	35,79
Вміст сухої речовини, %		23,8	24,6
Дегустаційна оцінка, бал		4	5
Придатність до механізованого збирання, бал		9	8
Лежкість, бал		7	7
Товарність бульб, %		81,1	78,1
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	2
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		9	9
Напрямок використання		унів	унів
Якість		ск	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 20088026 **Назва сорту:** Камелія **Заявник (код):** 2660 **Власник сорту (код):** 2660**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.02.2023 **Патент №** 230138**Дата пріоритету:** 30.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230901**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1	
23	Листочок: хвилястість краю	сильна	7	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянсуватий	7	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	ознака не визначається	0	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	ознака не визначається	0	
32	Віночок квітки: розмір	ознака не визначається	0	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	сильне	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		29,30	27,65
+, - до усередненої урожайності, т/га		5,65	7,76
+, - до усередненої урожайності, %		23,9	39,0
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, діб		103	91
Середня маса товарної бульби, г		95,8	107,9
Вміст крохмалю, %		12,4	14
Збір крохмалю, т/га		36,33	38,71
Вміст сухої речовини, %		20,4	21,7
Дегустаційна оцінка, бал		6	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Лежкість, бал		7	7
Товарність бульб, %		81,5	85,3
Стійкість проти макроспороозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		стл	стл
Якість		нк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088027 Назва сорту: Кардіма Заявник (код): 2660 2765 Власник сорту (код): 2660 2765

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 Патент № 230139

Дата пріоритету: 30.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230900

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	глибоке	7	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	мilkі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		23,67	21,30
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,02	1,41
+, - до усередненої урожайності, %		0,1	7,1
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, діб		102	94
Середня маса товарної бульби, г		99,4	90,6
Вміст крохмалю, %		15,9	17,1
Збір крохмалю, т/га		37,64	36,42
Вміст сухої речовини, %		24,2	25,7
Дегустаційна оцінка, бал		6	4
Придатність до механізованого збирання, бал		7	8
Лежкість, бал		6	7
Товарність бульб, %		79,8	80
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	4
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		8	8
Напрямок використання		унів	унів
Якість		ск	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 20088024 **Назва сорту:** Коразон **Заявник (код):** 1652 **Власник сорту (код):** 1652**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230883**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	широкоциліндрична	4	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	велике	3	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3	
25	Листочок: гляссуватість верхнього боку	помірно гляссуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	відсутнє	1	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: ясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	ознака не визначається	0	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	ознака не визначається	0	
32	Віночок квітки: розмір	ознака не визначається	0	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,27	19,42
Урожайність, т/га		19,64	22,71
+, - до усередненої урожайності, т/га		-4,63	3,29
+, - до усередненої урожайності, %		-19,1	16,9
Довірчий інтервал, т/га		1,73	1,53
Тривалість періоду вегетації, діб		84	81
Середня маса товарної бульби, г		93,1	88,6
Вміст крохмалю, %		10,1	12,9
Збір крохмалю, т/га		19,84	29,3
Вміст сухої речовини, %		17,7	20,9
Дегустаційна оцінка, бал		5	3
Придатність до механізованого збирання, бал		9	7
Лежкість, бал		5	9
Товарність бульб, %		78,5	87
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		8	8
Блок (група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		днк	нк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 21088004 Назва сорту: Роксоланівська Заявник (код): 2828 Власник сорту (код): 2828

Дата пріоритету: 26.10.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230885

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	дуже сильна	9	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	світле	3	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	сильна	7	
24	Листочок: заглиблення жилок	глибоке	7	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	не глянуватий	3	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	відсутнє	1	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	ознака не визначається	0	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	ознака не визначається	0	
32	Віночок квітки: розмір	ознака не визначається	0	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	біле	1	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,27	19,42
Урожайність, т/га		22,42	20,27
+, - до усередненої урожайності, т/га		-1,85	0,85
+, - до усередненої урожайності, %		-7,6	4,4
Довірчий інтервал, т/га		1,73	1,53
Тривалість періоду вегетації, діб		84	78
Середня маса товарної бульби, г		113,1	111,9
Вміст крохмалю, %		12,1	14,8
Збір крохмалю, т/га		27,13	30
Вміст сухої речовини, %		19,5	22,4
Дегустаційна оцінка, бал		3	5
Придатність до механізованого збирання, бал		9	7
Лежкість, бал		5	9
Товарність бульб, %		82,9	88,3
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	2
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		нк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 20088002 **Назва сорту:** Санред **Заявник (код):** 2660 **Власник сорту (код):** 2660**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.02.2023 **Патент №** 230135**Дата пріоритету:** 02.01.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230897**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	закритий	1	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	обрідне	3	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітоніжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	велике	7	
36	Рослина: час досягання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,27	19,42
Урожайність, т/га		26,09	25,07
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,82	5,65
+, - до усередненої урожайності, %		7,5	29,1
Довірчий інтервал, т/га		1,73	1,53
Тривалість періоду вегетації, діб		83	80
Середня маса товарної бульби, г		127,7	105,7
Вміст крохмалю, %		10,7	11,6
Збір крохмалю, т/га		27,92	29,08
Вміст сухої речовини, %		18,3	19,1
Дегустаційна оцінка, бал		6	3
Придатність до механізованого збирання, бал		9	8
Лежкість, бал		8	7
Товарність бульб, %		87,2	88
Стійкість проти макроспоріозу, бал		7	7
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	2
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		нк	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088025 Назва сорту: СПЕКТРА Заявник (код): 1652 Власник сорту (код): 1652

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230884

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	малий	3	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	помірне	5	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	милке	3	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: яскравість цвітіння	обридне	3	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	милкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		24,27	19,42
Урожайність, т/га		28,41	29,27
+, - до усередненої урожайності, т/га		4,14	9,85
+, - до усередненої урожайності, %		17,1	50,7
Довірчий інтервал, т/га		1,73	1,53
Тривалість періоду вегетації, діб		85	84
Середня маса товарної бульби, г		125,2	119,7
Вміст крохмалю, %		10,8	12,9
Збір крохмалю, т/га		30,68	37,76
Вміст сухої речовини, %		17,9	20,5
Дегустаційна оцінка, бал		6	4
Придатність до механізованого збирання, бал		9	7
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		84,4	90,5
Стійкість проти макроспоріозу, бал		6	7
Стійкість проти фітофторозу, бал		7	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		7	7
Напрямок використання		стл	стл
Якість		днк	нк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка №** 20088009 **Назва сорту:** Тайгер **Заявник (код):** 2660 **Власник сорту (код):** 2660**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.02.2023 **Патент №** 230137**Дата пріоритету:** 02.01.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230899**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	багато	7	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	листяний	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	світле	3	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	часто	7	
23	Листочок: хвилястість краю	помірна	5	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	видовженооувальна	4	
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		22,38	21,70
+, - до усередненої урожайності, т/га		-1,27	1,81
+, - до усередненої урожайності, %		-5,4	9,1
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, діб		103	89
Середня маса товарної бульби, г		115,9	94,3
Вміст крохмалю, %		15,6	17,1
Збір крохмалю, т/га		34,91	37,11
Вміст сухої речовини, %		23,9	25,4
Дегустаційна оцінка, бал		4	6
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Лежкість, бал		6	7
Товарність бульб, %		84,3	81,8
Стійкість проти макроспороїзу, бал		7	8
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		8	8
Напрямок використання		унів	унів
Якість		ск	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088007 Назва сорту: ТРАЙПЛ7 Заявник (код): 2660 Власник сорту (код): 2660

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 Патент № 230136

Дата пріоритету: 02.01.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230898

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	середньо	5	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	малий	3	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	глибокі	7	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		23,65	19,89
Урожайність, т/га		25,94	22,74
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,29	2,85
+, - до усередненої урожайності, %		9,7	14,3
Довірчий інтервал, т/га		0,99	0,87
Тривалість періоду вегетації, діб		104	92
Середня маса товарної бульби, г		98,2	97,4
Вміст крохмалю, %		17,8	17,4
Збір крохмалю, т/га		46,17	39,57
Вміст сухої речовини, %		25,8	25,8
Дегустаційна оцінка, бал		6	5
Придатність до механізованого збирання, бал		8	8
Лежкість, бал		6	7
Товарність бульб, %		80,5	85,6
Стійкість проти макроспоріозу, бал		6	7
Стійкість проти фітофторозу, бал		6	3
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал		9	9
Блок (Група стиглості)		8	8
Напрямок використання		унів	унів
Якість		пк	пк

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: КОРМОВІ

*Горошок посівний (вика) (яр
Еспарцет виколистий
Конюшина лучна (червона)
Люпин вузьколистий
Люцерна посівна
Тритикале (дворучка)*



Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 20177004 Назва сорту: Ворскла **Заявник (код):** 1943 **Власник сорту (код):** 1943

Дата пріоритету: 11.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230772

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка	дуже велике	9	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	помірна	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки	коричневе	4	
20	Насінина: коричнева орнаментация	відсутня	1	
21	Насінина: виявлення коричневої орнаментации	ознака не визначається	0	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,54	6,48
Урожайність сухої речовини, т/га		5,65	5,86
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		0,11	-0,62
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		2,0	-9,6
Довірчий інтервал, т/га		0,68	0,86
Тривалість періоду вегетації, діб		60	63
Вміст білка, %		22,2	22,7
Стійкість до вилягання, бал		3	4
Стійкість до посухи, бал		7	5
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Залистяність, %		60,7	56,1
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,66	1,72

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 21177003 Назва сорту: Нітро **Заявник (код):** 2805 2806 **Власник сорту (код):** 2805 2806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 02.10.2023 **Патент №** 230510

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230722

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка	дуже велике	9	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	помірна	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	помірне	5	
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	дуже велика	9	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки	сіро-коричнєве	3	
20	Насінина: коричнева орнаментация	цятками і плямами	4	
21	Насінина: виявлення коричневої орнаментации	дуже сильне	9	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	крапками і плямами	4	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	сильне	7	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричнєве	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,54	6,48
Урожайність сухої речовини, т/га		4,59	5,80
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,95	-0,68
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-17,1	-10,5
Довірчий інтервал, т/га		0,68	0,86
Тривалість періоду вегетації, діб		55	60
Вміст білка, %		22,4	22,2
Стійкість до вилягання, бал		3	4
Стійкість до посухи, бал		6	6
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти бурої іржі, бал		7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		7	9
Залистяність, %		58	53,4
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,06	1,72

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 20177001 Назва сорту: Оазис **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 13.12.2022 **Патент №** 220782

Дата пріоритету: 12.08.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 02.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230721

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	помірна	5	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	відсутнє	1	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	темно-фіолетове	5	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки	коричнєве	4	
20	Насінина: коричнева орнаментация	відсутня	1	
21	Насінина: виявлення коричневої орнаментации	дуже слабке	1	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	дуже слабке	1	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,54	6,48
Урожайність сухої речовини, т/га		5,69	5,94
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		0,15	-0,54
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		2,7	-8,3
Довірчий інтервал, т/га		0,68	0,86
Тривалість періоду вегетації, діб		60	65
Вміст білка, %		22	22,8
Стійкість до вилягання, бал		3	4
Стійкість до посухи, бал		7	5
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	7
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Залистяність, %		60,7	57
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,48	1,83

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.**Заявка № 21177002 Назва сорту:** Пірит **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.10.2023 **Патент №** 230620**Дата пріоритету:** 02.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230773**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка	велике	7	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	сильна	7	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	світло-фіолетове	3	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	короткий	3	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5	
17	Насіння: маса	дуже велика	9	
18	Насінина: форма	куляста	1	
19	Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки	коричнєве	4	
20	Насінина: коричнева орнаментация	цятками і плямами	4	
21	Насінина: виявлення коричневої орнаментации	сильне	7	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	сірувато-коричнєве	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,54	6,48
Урожайність сухої речовини, т/га		4,72	6,35
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,82	-0,13
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-14,8	-2,0
Довірчий інтервал, т/га		0,68	0,86
Тривалість періоду вегетації, діб		56	62
Вміст білка, %		21,6	23,9
Стійкість до вилягання, бал		3	4
Стійкість до посухи, бал		6	6
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	9
Стійкість проти бурі іржі, бал		8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	9
Залистяність, %		58,5	53,5
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,29	2,02

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.

Вид: Еспарцет виколистий *Onobrychis viciifolia* Scop.

Заявка № 23234001 Назва сорту: ВАЛЛОР **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент №** 230527

Дата пріоритету: 06.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230743

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тип розвитку	озимий	1	
2	Рослина 1-го року життя: габітус (на початку бутонізації)	прямий	1	
3	Рослина 2-го року життя: габітус (на початку бутонізації)	прямий	1	
4	Рослина: за висотою травостою	висока	7	
5	Рослина: галузнення	слабке	3	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
7	Стебло: опушення в середній частині	відсутнє	1	
8	Стебло: за довжиною	середнє	5	
9	Стебло: за товщиною	середнє	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
11	Листок: сіро-зелене забарвлення	відсутнє	1	
12	Листок: за довжиною	середній	5	
13	Листок: за шириною	середній	5	
14	Листочок: за формою	ланцетний	2	
15	Рослина 1-го року життя: схильність до цвітіння	середня	5	
16	Рослина 2-го року життя: схильність до цвітіння	висока	7	
17	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
18	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
19	Суцвіття: форма	циліндрична	2	
20	Квітка: забарвлення	рожеве	2	
21	Квітка: рівномірність забарвлення	нерівномірне	1	
22	Біб: розмір	великий	7	
23	Біб: зубчики	наявні	9	
24	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: розміщення зубчиків	суцільне	2	
25	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: зубчики за довжиною	середні	5	
26	Для сортів з наявними зубчиками. Біб: форма зубчиків	округла	3	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 1,3. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 4,9/0,9. Тривалість періоду від весняного відростання до укїсної стиглості, діб – 70. Вміст в зеленій масі (за стандартної вологості 80%) білка, % – 3,6; клітковини, % – 5,4. Поживність зеленої маси, к. од./кг – 0,25. Залистяність, % – 61. Число укосів, шт. – 2. Стійкість до осипання, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8, листовка іржа – 8, пероноспороз – 8, аскохїтоз – 8, фузаріозне в'янення – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.**Заявка №** 20155004 **Назва сорту:** Андріана **Заявник (код):** 1946 **Власник сорту (код):** 1946**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.10.2023 **Патент №** 230626**Дата пріоритету:** 15.10.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230888**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	висока	7	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	висока	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
12	Стебло: за довжиною	довге	7	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	велика	7	
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,46	5,08
Урожайність сухої речовини, т/га		8,19	7,23
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,73	2,15
+, - до усередненої урожайності, %		26,8	42,3
Довірчий інтервал, т/га		1,59	2,35
Тривалість періоду вегетації, діб		154	108
Залистяність, %		45,5	43,5
Вміст білка, %		19,5	17,3
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		6	5
Стійкість проти антракнозу, бал		8	9
Стійкість проти стеблової іржі, бал		7	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал		7	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	9
Стійкість проти аскохітозу, бал		7	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		8	9
Зимостійкість, бал		7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		1,7	1,6
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 20155005 Назва сорту: Атлант Носівський **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230627**

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230776

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	жовте	1	
2	Плодюність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
5	Рослина: за висотою у рік сівки	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівки	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівки	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівки	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	низька	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,46	5,08
Урожайність сухої речовини, т/га		8,89	6,06
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,43	0,98
+, - до усередненої урожайності, %		37,6	19,3
Довірчий інтервал, т/га		1,59	2,35
Тривалість періоду вегетації, діб		155	109
Залистяність, %		46,4	43,8
Вміст білка, %		19,8	15,8
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		6	5
Стійкість проти антракнозу, бал		8	9
Стійкість проти стеблової іржі, бал		7	9
Стійкість проти бурі плямистості, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	9
Стійкість проти аскохітозу, бал		7	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		8	9
Зимостійкість, бал		7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		2	1,6
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.**Заявка № 20155002 Назва сорту:** Любава **Заявник (код):** 1658 **Власник сорту (код):** 1658**Дата пріоритету:** 23.06.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230946**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	низька	3	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	мала	3	
15	Стебло: щільність опушення	помірна	5	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	низька	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,46	5,08
Урожайність сухої речовини, т/га		8,25	5,86
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,79	0,78
+, - до усередненої урожайності, %		27,7	15,4
Довірчий інтервал, т/га		1,59	2,35
Тривалість періоду вегетації, діб		154	108
Залистяність, %		46,5	43
Вміст білка, %		20,4	18
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		6	6
Стійкість проти антракнозу, бал		8	9
Стійкість проти стеблової іржі, бал		7	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал		7	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		7	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		8	9
Зимостійкість, бал		7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		1,9	1,5
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 23155001 Назва сорту: МЕЛІФОР **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230529**

Дата пріоритету: 06.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230744

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
4	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
5	Рослина: за висотою у рік сівки	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівки	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівки	напівпрямий	3	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівки	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	велика	7	
15	Стебло: щільність опушення	дуже нещільна	1	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	висока	7	
20	Рослина: за природною висотою другого укосу	низька	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 2,2. Збір сухої речовини, т/га – 7,8. Вміст у сухій речовині, %: білка – 22,2; клітковини – 19,8. Тривалість періоду від весняного відростання до укісної стиглості, діб – 100. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 163. Кількість укосів, шт. – 2. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 0,8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 8. Облистяність, % – 58,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *trifolii* Rbnh.) – 8, іржа (*Uromyces fallens* Kern.) – 8, антракноз (*Kabatiella caulivora* Kat.) – 8, аскохітоз (*Ascochyta trifolii* Bond. et Trus.) – 8, бура плямистість (*Pseudopeziza trifolii* (Biv.-Bern.) Fuck.) – 8, бактеріоз (*Phytophthora trifoliorum* (L. R. Jones) Burkh.; *Pseudomonas trifoliorum* Stapp) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* Schl.f. *trifolii* Railllo) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.**Заявка №** 20155003 **Назва сорту:** Оплески **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 25.10.2023 **Патент №** 230603**Дата пріоритету:** 29.09.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230856**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	жовте	1	
2	Плоїдність	тетраплоїд	4	
3	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5	
4	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	сильна	7	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	сильна	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	довге	7	
13	Стебло: за товщиною	товсте	7	
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
15	Стебло: щільність опушення	щільна	7	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	довгий	7	
18	Листок: центральний листочок за шириною	широкий	7	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,46	5,08
Урожайність сухої речовини, т/га		8,82	6,99
+, - до усередненої урожайності, т/га		2,36	1,91
+, - до усередненої урожайності, %		36,5	37,6
Довірчий інтервал, т/га		1,59	2,35
Тривалість періоду вегетації, діб		155	108
Залистяність, %		45,5	44,7
Вміст білка, %		20,5	15,9
Стійкість до вилягання, бал		8	9
Стійкість до посухи, бал		6	7
Стійкість проти антракнозу, бал		8	9
Стійкість проти стеблової іржі, бал		7	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал		7	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		7	9
Стійкість проти аскохітозу, бал		7	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		8	9
Зимостійкість, бал		7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		1,9	1,6
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Люпин вузьколистий *Lupinus angustifolius* L.

Заявка № 21403001 Назва сорту: Ілдіго **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230530**

Дата пріоритету: 22.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230546

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: гірка речовина	наявна	9	
2	Рослина: за висотою у вегетативній стадії	низька	3	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення до фази бутонізації	помірна	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення до фази бутонізації	помірне	5	
5	Час цвітіння	середній	5	
6	Рослина: за висотою у фазі початку цвітіння	низька	3	
7	Центральний листок: за довжиною	середній	5	
8	Центральний листок: за шириною	середній	5	
9	Квітка: забарвлення крил	синювато-біле	2	
10	Квітка: забарвлення кінчика човника	жовте	1	
11	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
12	Біб: час настання зеленої стиглості	середній	5	
13	Рослина: за висотою прикріплення першого суцвіття, за зеленої стиглості (від поверхні ґрунту до першого суцвіття)	середня	5	
14	Рослина: за висотою у зеленій стиглості	середня	5	
15	Біб: за довжиною	середній	5	
16	Час досягання	пізній	7	
17	Насінина: орнаментация	наявна	9	
18	Насінина: забарвлення орнаментации	багатоколірне	5	
19	Насінина: розподіл орнаментации	суцільна	1	
20	За винятком сортів з бровою. Насінина: щільність орнаментации	щільна	7	
21	Насінина: маса 100 шт.	середня	5	

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 23196001 Назва сорту: МЕДІСАН **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент №** 230531

Дата пріоритету: 06.09.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230745

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	висока	7	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	довга	7	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 1	1	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrtosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Therioaphis maculata</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожай насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 2,2. Урожайність зеленої маси / збір сухої речовини, т/га – 12,73. Вміст білка, % – 25,0; клітковини, % – 22,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev f. *medicaginis* Dietr.) – 8, пероноспороз (*Peronospora aestivalis* Sydow.) – 8, іржа (*Uromyces striatus* Schroter (II і III)) – 8, чорна плямистість стебел (*Napiciadium medicaginis* Lobik.) – 8, аскохітоз (*Ascochyta imperfecta* Peck.) – 8, бура плямистість (*Pseudopeziza medicaginis* Sacc.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Тритикале (дворучка) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 21622001 Назва сорту: Єгор **Заявник (код):** 2610 **Власник сорту (код):** 2610

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230557**

Дата пріоритету: 16.01.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230866

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	сильна	7	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Пиляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3	
13	Стебло: опушення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	довга	7	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колоса	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса й верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	нещільний	3	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	довгий	7	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	широкий	7	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначалась	0	
26	Тип розвитку	дворучка (альтернативний)	2	
27	Колос: за формою	напівбулавоподібний	3	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колоса: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	світло-коричневе	3	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшквата	5	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	
37	Прапорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	ознака не визначалась	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Ярий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		4,75	4,27
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		4,18	3,43
+, - до усередненої урожайності, т/га		-0,57	-0,84
+, - до усередненої урожайності, %		-12,0	-19,7
Довірчий інтервал, т/га		1,15	0,81
Тривалість періоду вегетації, діб		95	100
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		43,1	37,9
Висота рослини, см		83,6	82,5
Череззерниця, %		6,1	8,7
Вміст білка, %		13,9	14,9
Стійкість до вилягання, бал		7	9
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		7	3
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	7
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	6
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		зерн	зерн
Озимий тип розвитку			
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		6,31	5,40
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,78	6,39
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,47	0,99
+, - до усередненої урожайності, %		23,3	18,3
Довірчий інтервал, т/га		1,19	0,63
Тривалість періоду вегетації, діб		277	271
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		51,1	45,2
Висота рослини, см		92,5	103,2
Череззерниця, %		3,8	5,8
Вміст білка, %		11,1	10,7
Стійкість до вилягання, бал		8	7
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		9	7
Стійкість проти борошнистої роси, бал		9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	8
Стійкість проти корневих гнилей, бал		8	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ: ОВОЧЕВІ

Вігна промениста (квасоля золотиста, маш)

Гарбуз мускатний

Диня звичайна

Кабачок

Кавун звичайний

Капуста білоголова

Капуста цвітна

Касоля звичайна (овочева)

Кукурудза цукрова

Морква

Огірок посівний

Помідор їстівний

Редька посівна (редиска)

Салат посівний головчастий

Цибуля городня



Вид: Вігна промениста (квасоля золотиста, маш) *Vigna radiata* (L.) R. Wilczek (*Phaseolus aureus* Roxb.)

Заявка № 20024001 Назва сорту: Бераш **Заявник (код):** 2718 **Власник сорту (код):** 2718

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент №** 230574

Дата пріоритету: 12.10.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230771

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1	
2	Рослина: тип росту	кущовий	1	
3	Рослина: характер росту	детермінантний	9	
4	Лише кущові сорти. Рослина: габітус	напівпрямий	3	
5	Тільки кущові сорти. Рослина: за висотою	середня	5	
6	Лише виткі сорти. Стебло: за довжиною	ознака не визначалась	0	
7	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначалась	0	
8	Рослина: ступінь опушення стебла	слабкий	3	
9	Первинні листки: за шириною	вузькі	3	
10	Первинні листки: опушення	відсутнє	1	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
12	Суцвіття: кількість квіток у китиці	велика	7	
13	Квітка: забарвлення віночка	біле	3	
14	Біб: забарвлення	буре	1	
15	Біб: форма	вигнута	2	
16	Біб: за довжиною	середній	5	
17	Біб: за шириною	середній	5	
18	Біб: кількість насінин	середня	5	
19	Насінина: форма поперечного перерізу	округло-циліндрична	2	
20	Насінина: форма	еліптична	1	
21	Насінина: за довжиною	коротка	3	
22	Насінина: забарвлення	зелене	1	
23	Насіння: маса	середня	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14%), т/га – 1,5. Тривалість періоду вегетації, діб – 87. Висота рослин, см – 60. Вміст сирого протеїну, % – 24. Маса 1000 зерен, г – 40. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta blight* Sacc.; *Ascochyta pisi* Lib.) – 5, антракноз (*Colletotrichum lindemuthianum* (Sacc. et Magn.) Br. et Cav.; *Colletotrichum truncatum* (Schweinitz) Andrus et Moore) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus*) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Гарбуз мускатний *Cucurbita moschata* Duch.

Заявка № 22228002 Назва сорту: Баттернат де Люкс **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163

Дата пріоритету: 22.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230877

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядоля: відношення ширина / довжина	середнє	5	
2	Рослина: головне стебло за довжиною	середнє	5	
3	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
4	Листкова пластинка: розсіченість краю	відсутня або дуже слабка	1	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
6	Листкова пластинка: сріблясті плями	відсутні	1	
7	Черешок: за довжиною	середній	5	
8	Черешок: діаметр	середній	5	
9	Жіноча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
10	Чоловіча квітка: чашолисток за довжиною	середній	5	
11	Плодоніжка: за довжиною	середня	5	
12	Плодоніжка: діаметр	середній	5	
13	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
14	Плід: за довжиною	середній	5	
15	Плід: діаметр	середній	5	
16	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5	
17	Плід: положення найширшої частини	ближче до верхівки	3	
18	Плід: форма поздовжнього розрізу	грушоподібна	7	
19	Плід: шийка	помірна або добре виражена	3	
20	Плід: шийка за довжиною	середня	5	
21	Плід: вигин (за поздовжньою віссю)	відсутній або дуже слабкий	1	
22	Плід: профіль базального кінця	слабко заглиблений	3	
23	Плід: профіль апікального кінця	заглиблений	1	
24	Плід: борізки	відсутні	1	
25	Плід: відстань між борізками	ознака не визначається	0	
26	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
27	Плід: мармуровість	відсутня або дуже слабка	1	
28	Плід: основне забарвлення шкірки	кремове	2	
29	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки	помірна	5	
30	Плід: восковий наліт шкірки	відсутній	1	
31	Плід: бородавки	відсутні	1	
32	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовтувато-оранжеве	2	
33	Плід: м'якоть за товщиною (на рівні насінної камери)	середня	5	
34	Плід: діаметр квіткового рубця	середній	5	
35	Насінина: за довжиною	середня	5	
36	Насінина: відношення ширина/довжина	середнє	5	
37	Насінина: забарвлення оболонки	кремове	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 30. Середня маса плоду, кг – 5. Тривалість періоду до досягання, діб – 95. Довжина головного стебла, см – 3. Тип стебла: 2 – індетермінантний. Вміст сухої речовини, % – 6,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7, антракноз (*Colletotrichum lagenarium* E. et H.) – 8, плямистість бактеріальна (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 9, фузаріоз (*Fusarium nivae* E. Sm.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Диня звичайна *Cucumis melo* L.**Заявка № 22147001 Назва сорту:** Мегарин **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841**Дата пріоритету:** 07.02.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230852**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: гіпокотиль за довжиною (фаза першого справжнього листка)	середній	5	
2	Паросток: розмір сім'ядоль (як для 1)	середній	5	
3	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей (як для 1)	помірна	5	
4	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
5	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листкова пластинка: вираженість лопатей	слабка	3	
7	Листкова пластинка: верхівкова лопать за довжиною	коротка	3	
8	Листкова пластинка: зубчастість країв	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
10	Черешок: положення (у фазі 3-х листків)	горизонтальне	7	
11	Черешок: за довжиною	короткий	3	
12	Квітка: стать (за повного цвітіння)	андромонеційні	2	
13	Молодий плід: відтінок зеленого забарвлення шкірки	зелений	3	
14	Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	сильна	7	
15	Молодий плід: щільність крапок	дуже щільна	9	
16	Молодий плід: розмір крапок	малий	3	
17	Молодий плід: контрастність крапок і основного забарвлення	слабка	3	
18	Молодий плід: вираженість забарвлення боріздок	відсутня або дуже слабка	1	
19	Молодий плід: інтенсивність забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
20	Молодий плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Плід: плодоніжка за товщиною (на відстані 1 см від плоду)	середня	5	
22	Молодий плід: поширення темнішої площі навколо плодоніжки	мале	3	
23	Плід: зміна забарвлення шкірки від молодого плоду до стиглого	на пізніх стадіях розвитку плоду	2	
24	Плід: за довжиною	середній	5	
25	Плід: діаметр	середній	5	
26	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
27	Плід: місце найбільшого діаметра	у центрі	2	
28	Плід: форма позовжнього розрізу	широкоеліптична	3	
29	Плід: основне забарвлення шкірки (за досягання)	жовте	2	
30	Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (за досягання)	помірна	5	
31	Плід: відтінок основного забарвлення шкірки (за досягання)	оранжевий	4	
32	Плід: щільність крапок	помірної щільності	5	
33	Плід: розмір крапок	середній	5	
34	Плід: забарвлення крапок	зелене	3	
35	Плід: інтенсивність забарвлення крапок	помірна	5	
36	Плід: щільність плям	середньої щільності	5	
37	Плід: розмір плям	середній	5	
38	Плід: бородавки	відсутні	1	
39	Плід: міцність прикріплення плодоніжки до стиглого плоду	помірна	5	
40	Плід: форма основи	заокруглена	2	
41	Плід: форма верхівки	заокруглена	2	
42	Плід: розмір маточкового рубця	малий	3	
43	Плід: борізки	відсутні або дуже слабо виражені	1	
44	Плід: борізки за шириною	ознака не визначається	0	
45	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
46	Плід: забарвлення боріздок	ознака не визначається	0	
47	Плід: зморшкуватість поверхні	помірна	5	
48	Плід: коркове утворення	наявне	9	
49	Плід: корковий шар за товщиною	тонкий	3	
50	Плід: візерунок коркового утворення	крапками і лініями	2	
51	Плід: щільність візерунку коркового утворення	нещільна	3	
52	Плід: швидкість зміни забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості	середня	5	
53	Плід: м'якоть в позовжньому розрізі за товщиною (в місці максимального діаметра плоду)	середня	5	
54	Плід: основне забарвлення м'якоті	зеленувато-біле	2	
55	Лише для сортів з оранжевим забарвленням м'якоті. Плід: інтенсивність оранжевого забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	
56	Лише для сортів із білим, зеленувато-білим, зеленим, жовтувато-білим забарвленням м'якоті. Плід: вторинне оранжево-рожеве забарвлення м'якоті	слабке	3	
57	Плід: консистенція м'якоті	середня	5	
58	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості. Плід: відтінок забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	жовтий	1	
59	Лише для сортів, що змінюють забарвлення шкірки плоду від технічної до біологічної стиглості з жовтим або оранжево-жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (за біологічної стиглості)	помірна	5	
60	Насінина: за довжиною	середня	5	
61	Насінина: за шириною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Насінина: форма	не подібна до форми кедрового горішка	1	
63	Насінина: забарвлення	кремово-жовте	2	
64	Лише для сортів з кремово-жовтим забарвленням насіння. Насінина: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
65	Час цвітіння чоловічих квіток	середній	5	
66	Час цвітіння жіночих квіток	середній	5	
67	Час достигання	середній	5	
68	Термін зберігання плоду	середній	5	
69	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	ознака не визначалась	0	
70	Стійкість до <i>Sphaerotheca fuliginea</i> (<i>Podosphaera xanthii</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
71	Стійкість до <i>Erysiphe cichoracearum</i> (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>) (борошнистої роси)	ознака не визначалась	0	
72	Стійкість до колоній (<i>Aphis gossypii</i>)	ознака не визначалась	0	
73	Стійкість до вірусу жовтої мозаїки цукіні (ZYMV)	ознака не визначалась	0	
74	Стійкість до кільчастого вірусу папайї (PRSV)	ознака не визначалась	0	
75	Стійкість до вірусу некротичної плямистості дині (MNSV)	ознака не визначалась	0	
76	Стійкість до вірусу мозаїки огірка (CMV)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 55. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання плодів, днів – 65. Період від повних сходів до першого збирання, днів – 80. Вміст сухої речовини в плодах, % – 10, загального цукру, % – 20.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ, ЗГр.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка № 21148002 Назва сорту:** Еклер **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819**Дата пріоритету:** 09.09.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230908**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірна	5	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	дуже слабкий	1	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	великий	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість	дуже глибока	9	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: кількість шипів	мала	3	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	велике	7	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	циліндрична	5	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	жовте	3	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	помірна	5	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважаюча форма	циліндрична	9	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	довгий	7	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	велике	7	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мініатюрний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок і смуг)	жовте	3	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	сильна	7	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на боріздках	наявні	9	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	жовті	2	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	однакове	1	
57	Плід: плямистість	відсутня	1	
58	Плід: розмір основних плям	ознака не визначається	0	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	помірна	5	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	жовте	4	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	помірна	5	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	жовте	3	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	ознака не визначається	0	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	ознака не визначається	0	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	відсутнє	1	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	білувате	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 25. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 20. Товарність, % – 95. Вміст сухої речовини, % – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 6, бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 8, вірусні хвороби – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.

Вид: Кабачок *Cucurbita pepo* var. *giraumontia* Filov**Заявка № 22148001 Назва сорту:** Контакт **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841**Дата пріоритету:** 18.01.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230873****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: форма сім'ядолей	вузькоеліптична	1	
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	слабка	3	
3	Паросток: форма поперечного перерізу сім'ядолі	пряма	2	
4	Рослина: габітус	кущовий	1	
5	Рослина: галузнення	наявне	9	
6	Рослина: ступінь галузнення	дуже слабкий	1	
7	Лише кущові сорти. Рослина: положення черешка (за виключенням нижніх зовнішніх листків)	напівпряме	3	
8	Стебло: забарвлення	цілком зелене	1	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Стебло: крапчастість	відсутня	1	
11	Стебло: вусики	відсутні або рудиментарні	1	
12	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість	помірна	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
15	Листкова пластинка: срібляста плямистість	відсутня	1	
16	Листкова пластинка: поверхня, охоплена сріблястою плямистістю	ознака не визначається	0	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: кількість шипів	середня	5	
19	Жіноча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
20	Жіноча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
21	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Жіноча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Чоловіча квітка: кільце всередині віночка	наявне	9	
23	Чоловіча квітка: забарвлення кільця всередині віночка	жовте	1	
24	Лише сорти з зеленим забарвленням кільця всередині віночка. Чоловіча квітка: інтенсивність забарвлення	ознака не визначається	0	
25	Лише сорти типу цукіні. Молодий плід: відношення довжини до максимального діаметра	велике	7	
26	Лише сорти типу цукіні та цукіні кулястого. Молодий плід: переважаюча форма	еліптична	4	
27	Молодий плід: основне забарвлення шкірки (за винятком забарвлення ребер або боріздок)	частково біле і частково зелене	6	
28	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
29	Лише сорти із зеленим забарвленням шкірки. Молодий плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 27)	ознака не визначається	0	
30	Плід: переважаюча форма	еліптична	8	
31,1	Лише сорти типу патисон. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,3	Лише сорти типу з шийкою. Плід: за довжиною	ознака не визначається	0	
31,4	Лише сорти типу цукіні. Плід: за довжиною	середній	5	
32,1	Лише сорти типу патисон. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: максимальний діаметр	ознака не визначається	0	
32,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: максимальний діаметр	середній	5	
33,1	Лише сорти типу патисон. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,2	Лише сорти типу жолудь. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти типу цукіні. Плід: відношення довжини до найбільшого діаметра	велике	7	
34,1	Лише сорти типу гарбуз. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
34,2	Лише сорти типу Rondini. Плід: розмір	ознака не визначається	0	
35	Лише сорти типу мінтаторний гарбуз. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
36	Лише сорти типу патисон. Плід: вираження екваторіального краю	ознака не визначається	0	
37	Лише сорти типу патисон. Плід: позиція (положення) екваторіального краю	ознака не визначається	0	
38	Лише сорти типу патисон. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
39	Лише сорти типу патисон. Плід: форма верхівки	ознака не визначається	0	
40	Лише сорти типу жолудь. Плід: положення найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти типу жолудь. Плід: форма плодоніжки	ознака не визначається	0	
42	Лише сорти типу з шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
43	Лише сорти типу з шийкою. Плід: відношення діаметра шийки до найбільшого діаметра	ознака не визначається	0	
44	Лише сорти типу з шийкою. Плід: викривлення шийки	ознака не визначається	0	
45	Лише сорти типу з шийкою і цукіні. Плід: апікальний кінець	округлий	1	
46	Плід: борізки	відсутні	1	
47	Плід: борізки за глибиною	ознака не визначається	0	
48	Плід: ребра	наявні	9	
49	Плід: ступінь виявлення ребер	слабкий	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення плям, крапок, смужок і смуг)	біле	1	
51	Лише сорти з жовтим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність жовтого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
52	Лише сорти з зеленим забарвленням шкірки. Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки (як для 50)	ознака не визначається	0	
53	Лише сорти з двома основними забарвленнями шкірки. Плід: поширення зеленого забарвлення	ознака не визначається	0	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
54	Плід: смужки на боріздках	наявні	9	
55	Плід: забарвлення смужок на боріздках	темно-зелені	1	
56	Плід: забарвлення ребер у порівнянні з основним забарвленням шкірки (як для 50)	темніше	2	
57	Плід: плямистість	наявна	9	
58	Плід: розмір основних плям	дуже малий	1	
59	Плід: вторинне зелене забарвлення між ребрами (за виключенням плям)	відсутнє	1	
60	Плід: інтенсивність вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
61	Плід: поширення вторинного зеленого забарвлення між ребрами	ознака не визначається	0	
62	Плід: бородавки на шкірці	відсутні	1	
63	Плід: кількість бородавок на шкірці	ознака не визначається	0	
64	Плід: розмір квіткового рубця	малий	3	
65	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
66	Плід: забарвлення плодоніжки	зелене	2	
67	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плодоніжки	слабка	3	
68	Плід: крапчастість плодоніжки	наявна	9	
69	Стиглий плід: основне забарвлення шкірки (за виключенням забарвлення крапок, плям, смуг і смужечок)	біле	1	
70	Стиглий плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (лише жовтого чи оранжевого)	ознака не визначається	0	
71	Стиглий плід: вторинне забарвлення шкірки (як для 69)	білувате	1	
72	Стиглий плід: зелений відтінок (лише білого і кремового)	наявний	9	
73	Стиглий плід: переважаючий зелений відтінок (як для 72)	слабкий	3	
74	Стиглий плід: забарвлення м'якоті	кремове	1	
75	Стиглий плід: здерев'яніння шкірки	наявне	9	
76	Стиглий плід: структура м'якоті	волокниста	2	
77	Насінина: розмір	середній	5	
78	Насінина: форма	еліптична	5	
79	Насінина: лушпиння	наявне	9	
80	Насінина: наявне лушпиння	повністю розвинене	2	
81	Насінина: забарвлення	білувате	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 45. Період від масових сходів до настання технічної стиглості, діб – 25. Товарність, % – 85. Вміст сухої речовини, % – 4,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* Fr.) – 7, бактеріальна плямистість (*Xanthomonas cucurbitae* (Bryan) Dowson) – 7, фузаріозне в'янення (*Fusarium nivae* E.Sm.) – 7, вірусні хвороби – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка № 22146006 Назва сорту:** АМІНА **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230940**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	коротка	3	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квіткі)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квіткі)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	короткий	3	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	середня	5	
20	Плід: форма позовжнього розрізу	вузькоеліптична	4	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	від заокругленої до гострої	4	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	відсутнє або дуже слабке	1	
31	Плід: характер смуг	ознака не визначається	0	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	ознака не визначається	0	
33	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	велика	3	
40	Насінина: розмір	великий	7	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричнєве	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	лише з прожилками	6	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	довга	7	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	велике	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 95. Вміст сухої речовини в плоді, % – 11,3; загального цукру, % – 11. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 85. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 63.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 22146004 Назва сорту: Грей Белле **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230622**

Дата пріоритету: 22.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230882

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	вузькоеліптична	1	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	сильна	7	
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	малий	3	
18	Зав'язь: опушення	слабке	3	
19	Плід: маса	від середньої до великої	6	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від слабкої до помірної	4	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	середнє	5	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	середнє	5	
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	слабке	3	
31	Плід: характер смуг	розсіяний	1	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	дуже слабка	1	
33	Плід: смуги за шириною	дуже вузькі	1	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожево-червоне	5	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якість за твердістю	м'яка	3	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	середнє	5	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	дуже сильне	9	
53	Плід: смуги за характером	лише з прожилками	6	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	середнє	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 40. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10, загального цукру, % – 9. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 60. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 76.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка №** 20146012 **Назва сорту:** ГРІН ДЖАР **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852**Дата пріоритету:** 10.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230880**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	коротка	3	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	слабкий	3	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	мілка	3	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	велика	7	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	середнє	5	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	помірне	5	
31	Плід: характер смуг	розсіяний	1	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	помірна	5	
33	Плід: смуги за шириною	середні	5	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7	
38	Плід: м'якість за твердістю	м'яка	3	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	дуже велике	9	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	середнє	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 80. Вміст сухої речовини в плоді, % – 11, загального цукру, % – 9. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 72. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 102.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 22146005 Назва сорту: ЄЛОВ ЛАВ **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230939

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	слабке	3	
19	Плід: маса	від малої до середньої	4	
20	Плід: форма позовжнього розрізу	помірноеліптична	3	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від слабкої до помірної	4	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: заглиблення біля основи	відсутнє або дуже мілке	1	
25	Плід: форма апікальної частини	від заокругленої до гострої	4	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	помірне	5	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	тонкий	3	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	2	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якість за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричнєве	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	середнє	5	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові з прожилками	2	
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5	
55	Плід: восковий наліт	слабкий	3	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннєва оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	середнє	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 75. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10,4; загального цукру, % – 10,2. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 70. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 55.

Географічні та зони рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка № 21146006 Назва сорту:** Жако **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819**Дата пріоритету:** 09.09.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230903****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	вузькоеліптична	1	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	глибока	7	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	сильна	7	
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3	
16	Черешок: за довжиною	короткий	3	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	малий	3	
18	Зав'язь: опушення	сильне	7	
19	Плід: маса	від малої до середньої	4	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	4	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	жовте	1	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	ознака не визначається	0	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	гостра	5	
26	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або дуже мілке	1	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	помірне	5	
31	Плід: характер смуг	розсіяний	1	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	помірна	5	
33	Плід: смуги за шириною	вузькі	3	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	жовте	2	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7	
38	Плід: м'якість за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	жовте	1	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	середнє	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 80. Вміст сухої речовини в плоді, % – 9,5; загального цукру, % – 12. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 80. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 95.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка №** 22146002 **Назва сорту:** Медун **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841**Дата пріоритету:** 07.02.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230853**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	еліптична	2	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	сильний	7	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	короткий	3	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	малий	3	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	велика	7	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	широкоеліптична	2	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	помірна	5	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	великий	7	
24	Плід: заглиблення біля основи	середнє	5	
25	Плід: форма апікальної частини	заокруглена	3	
26	Плід: заглиблення верхівки	середнє	5	
27	Плід: розмір рубця маточки	середній	5	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	помірне	5	
31	Плід: характер смуг	помірно виражений	2	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	помірна	5	
33	Плід: смуги за шириною	середні	5	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	товстий	7	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожево-червоне	5	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якість за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	червоно-коричневе	5	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	середні	5	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	великий	5	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	слабке	3	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	середня	5	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	середнє	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 50. Вміст сухої речовини в плоді, % – 8, загального цукру, % – 25. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 95. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 65.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ, ЗГр.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai**Заявка №** 20146011 **Назва сорту:** СВ3807BT **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852**Дата пріоритету:** 10.11.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230879**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	сильна	7	
15	Листкова пластинка: мармуровість	сильна	3	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	середній	5	
18	Зав'язь: опушення	слабке	3	
19	Плід: маса	від середньої до великої	6	
20	Плід: форма позовжнього розрізу	округла	1	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	від помірної до сильної	6	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	середній	5	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	зрізана	1	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	помірне	5	
31	Плід: характер смуг	чітко виражений	3	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	сильна	7	
33	Плід: смуги за шириною	середні	5	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	помірна	5	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	червоне	6	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	сильна	7	
38	Плід: м'якість за твердістю	м'яка	3	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	середня	2	
40	Насінина: розмір	середній	5	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	тільки крапками	1	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	дуже велике	9	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	ранній	3	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	ранній	3	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	однокольорові	1	
54	Плід: основне забарвлення смуг	темно-зелене	5	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	коротка	3	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	середнє	5	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 85. Вміст сухої речовини в плоді, % – 11, загального цукру, % – 9. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 70. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 100.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кавун звичайний *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai

Заявка № 22146003 Назва сорту: Чарльстон Грей Делюкс **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230621**

Дата пріоритету: 22.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230881

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Сім'ядолі: форма	широкоеліптична	3	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Сім'ядолі: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
5	Сім'ядолі: плями	відсутні	1	
6	Рослина: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Листкова пластинка: за довжиною (на повністю розвиненому 3-му листку)	середня	5	
8	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
9	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Листкова пластинка: забарвлення	сіро-зелене	3	
11	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
12	Листок: ступінь розсіченості (вище першої квітки)	помірний	5	
13	Листкова пластинка: розсіченість краю листка за глибиною (листок з центральної третини рослини вище першої квітки)	середня	5	
14	Листкова пластинка: пухирчатість (на 10-15 листках)	помірна	5	
15	Листкова пластинка: мармуровість	помірна	2	
16	Черешок: за довжиною	середній	5	
17	Зав'язь: розмір (під час цвітіння)	малий	3	
18	Зав'язь: опушення	помірне	5	
19	Плід: маса	від великої до дуже великої	8	
20	Плід: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	4	
21	Плід: основне забарвлення шкірки	зелене	2	
22	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення шкірки	слабка	3	
23	Плід: розмір сліду прикріплення плодоніжки	малий	3	
24	Плід: заглиблення біля основи	мілке	3	
25	Плід: форма апікальної частини	від заокругленої до гострої	4	
26	Плід: заглиблення верхівки	мілке	3	
27	Плід: розмір рубця маточки	малий	3	
28	Плід: поширення борозенок	відсутні	1	
29	Плід: борозенки	ознака не визначається	0	
30	Плід: вираження смуг	відсутнє або дуже слабке	1	
31	Плід: характер смуг	ознака не визначається	0	
32	Плід: інтенсивність забарвлення смуг	ознака не визначається	0	
33	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
34	Плід: інтенсивність мармуровості	слабка	3	
35	Плід: зовнішній шар оплодня за товщиною	середній	5	
36	Плід: основне забарвлення м'якоті	рожеве	4	
37	Плід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	помірна	5	
38	Плід: м'якоть за твердістю	помірна	5	
39	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Плід: кількість насінин	велика	3	
40	Насінина: розмір	великий	7	
41	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: основне забарвлення оболонки	коричневе	6	
42	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: вторинне забарвлення оболонки	наявне	9	
43	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: характер розміщення вторинного забарвлення оболонки	крапками і плямами	2	
44	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення зони вторинного забарвлення до основного забарвлення	велике	7	
45	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: плями біля рубця	відсутні або дуже малі	1	
46	Час початку цвітіння жіночих квіток	середній	5	
47	Початок достигання (у 50% рослин не менше одного стиглого плоду)	середній	5	
48	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>niveum</i> (E.F. Smith) Snyder et Hansen	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість до <i>Colletotrichum lagenarium</i> (passerini) Ellis et Halsted	ознака не визначалась	0	
50	Листкова пластинка: розмір	середній	3	
51	Листкова пластинка: забарвлення жилок	зелене	1	
52	Плід: вираження прожилок	помірне	5	
53	Плід: смуги за характером	лише з прожилками	6	
54	Плід: основне забарвлення смуг	помірно-зелене	4	
55	Плід: восковий наліт	помірний	5	
56	Лише триплоїдні сорти. Насіннева оболонка: за розміром	ознака не визначається	0	
57	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: за довжиною	довга	7	
58	Лише диплоїдні і тетраплоїдні сорти. Насінина: відношення довжина / ширина	велике	7	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 60. Вміст сухої речовини в плоді, % – 7,5; загального цукру, % – 9. Період від садіння 30-денної розсади до останнього збирання, діб – 105. Період від повних сходів до першого збирання, діб – 80.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.**Заявка № 21096007 Назва сорту:** Ельза **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819**Дата пріоритету:** 09.09.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідectво про державну реєстрацію № 230909****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	сильна	7	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	непокритий	1	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	дуже ранній	1	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 65. Період від сівби до початку досягання, діб – 88. Лежкість, балів (1–9) – 6. Вміст вітаміну С, мг % – 35; загального цукру, % – 5,2; сухої речовини, % – 8,8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 22096004 Назва сорту: Кабінет **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата пріоритету: 08.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230941

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	висока	7	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	довге	7	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	великий	7	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	сіро-зелене	3	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1	
25	Головка: забарвлення покривного листка	сіро-зелене	3	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 85. Період від сівби до початку достигання, діб – 130. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 35, загального цукру, % – 5, сухої речовини, % – 5,5. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 22096002 Назва сорту: Кората **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841

Дата пріоритету: 18.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230874

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	плаский	2	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	зелене	2	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	непокритий	1	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	зелене	2	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	слабка	3	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	середня	5	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	середній	5	
35	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 90. Період від сівби до початку досягання, діб – 95. Лежкість, балів (1–9) – 8. Вміст вітаміну С, мг % – 35; загального цукру, % – 4,1; сухої речовини, % – 7,2. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 21096006 Назва сорту: Сплеш болл **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230623**

Дата пріоритету: 03.08.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230854

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	низька	3	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	до середнього
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	малий	3	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	жовто-зелене	1	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	малий	3	до середнього
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	жовто-зелене	1	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	слабка	3	до помірної
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	нещільна	3	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	коротка	3	до середньої
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	до раннього
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиральної стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	ранній	3	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 65. Період від сівби до початку досягання, діб – 95. Лежкість, балів (1–9) – 3. Вміст вітаміну С, мг % – 35; загального цукру, % – 5,5; сухої речовини, % – 8,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 21096011 Назва сорту: Тайсон **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент №** 230624

Дата пріоритету: 23.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідство про державну реєстрацію № 230855

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	середня	5	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	великий	7	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2.1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	середнє	5	
4	Рослина: положення зовнішніх листків	напівпряме	3	до розлогого
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	середній	5	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	помірний	2	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	блакитно-зелене	4	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	сильний	7	
15	Зовнішній листок: ступінь хвилястості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	наявний	9	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно-еліптична	2	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	середній	5	
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	покритий	3	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	відсутній	1	
25	Головка: забарвлення покривного листка	синьо-зелене	4	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	помірна	5	
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
28	Головка: внутрішнє забарвлення	білувате	1	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	щільна	7	
31	Головка: внутрішня структура	тонка	3	до середньої
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	середня	5	
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збирання стиглості	пізній	7	
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збирання стиглості	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягання	пізній	7	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150. Період від сівби до початку достигання, діб – 100. Лежкість, балів (1–9) – 7. Вміст вітаміну С, мг % – 38; загального цукру, % – 3,2; сухої речовини, % – 2,8. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, 3Гр.

Вид: Капуста цвітня *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 21101005 Назва сорту: ДЕПУРПЛ **Заявник (код):** 2643 **Власник сорту (код):** 1219

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230944

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	широкий	7	
7	Листок: відношення ширина/довжина	велике	7	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	помірна	5	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	помірна	5	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	фіолетове	5	
22	Головка: горбкуватість	сильна	7	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	наявне	9	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150. Товарна врожайність, т/га – 50. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 105. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 60, загального цукру, % – 5, сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 21101002 Назва сорту: ЕЛЕКТРА **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230942

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	середня	5	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	середнє	5	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	середній	5	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	помірне	5	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма позовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	білувате	1	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	біле	1	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	пізня	7	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 149. Товарна врожайність, т/га – 51. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 70. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2,1; вітаміну С, мг % – 61; загального цукру, % – 4,9; сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Капуста цвітня *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 21101004 Назва сорту: КЛЕМЕНТИН **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230943

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: за висотою (за збирання)	висока	7	
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	довге	7	
4	Листок: положення	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною	довгий	7	
6	Листок: за шириною	широкий	7	
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5	
8	Листок: часточковість	відсутня	1	
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	сіро-зелене	2	
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5	
11	Листок: закручування верхівки	слабке	3	
12	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
13	Листок: пухирчатість	слабка	3	
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3	
15	Листок: хвилястість краю	помірна	5	
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1	
17	Головка: за висотою	середня	5	
18	Головка: діаметр	середній	5	
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно широко-еліптична	2	
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	помірне	5	
21	Головка: забарвлення	оранжеве	3	
22	Головка: горбкуватість	помірна	5	
23	Головка: текстура	помірна	5	
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1	
25	Квітка: забарвлення	жовте	2	
26	Скоростиглість: за весняного садіння	середня	5	
27	Скоростиглість: за літнього садіння	середній осінній тип	5	
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 150. Товарна врожайність, т/га – 49. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 60, загального цукру, % – 5, сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 20127009 Назва сорту: ЕСКАДРОН **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959

Дата пріоритету: 17.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідectво про державну реєстрацію № 230945

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилі	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшкуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	великий	7	
12	Верхівковий листочок: форма	ромбічна	5	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1	
15	Квітка: розмір приквітків	малий	3	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	вузький	3	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	сильний	7	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	сильний	7	
35	Біб: текстура поверхні	помірно шерехата	5	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	сильне	3	
37	Насіння: маса	мала	3	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	сплющена	1	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насінина: за довжиною	коротка	3	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	пізній	7	
49	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 19. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 19. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 55. Тривалість плодоношення, діб – 67. Кількість бобів на рослині, шт. – 32. Вміст білка у бобах, % – 25, сухої речовини, % – 14, загального цукру, % – 5, вітаміну С, мг/100 г – 19. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 22127001 Назва сорту: Контада **Заявник (код):** 1960 **Власник сорту (код):** 1960

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230886

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотилі	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотилі	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	ромбічна	5	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	середня	2	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	переважно в листках	1	
15	Квітка: розмір приквітков	середній	5	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	мале	3	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	сильний	7	
31	Біб: форма вигину	опукла	3	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	дуже сильний	9	
35	Біб: текстура поверхні	помірно шерехата	5	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	сильне	3	
37	Насіння: маса	мала	3	
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насіння: форма поперечного перерізу	еліптична	3	
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насіння: за довжиною	коротка	3	
43	Насіння: кількість кольорів	один	1	
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насіння: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насіння: вираження орнаменту	слабке	3	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	пізній	7	
49	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMNV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 17. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 18,7. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 65. Тривалість плодоношення, діб – 75. Кількість бобів на рослині, шт. – 8. Вміст білка у бобах, % – 1,6; сухої речовини, % – 15; загального цукру, % – 3,2; вітаміну С, мг/100 г – 21. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Квасоля звичайна (овочева) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 22127002 Назва сорту: Крома **Заявник (код):** 1960 **Власник сорту (код):** 1960

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230887

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	кущовий	1	
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектоніка	ознака не визначається	0	
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	сланкий	2	
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3	
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80% рослин)	ознака не визначається	0	
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0	
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
10	Листок: зморшуватість	помірна	5	
11	Верхівковий листочок: розмір	середній	5	
12	Верхівковий листочок: форма	від трикутної до округлої	2	
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3	
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2	
15	Квітка: розмір приквіток	великий	7	
16	Квітка: забарвлення паруса	біле	1	
17	Квітка: забарвлення крил	біле	1	
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5	
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0	
20	Біб: за шириною	середній	5	
21	Біб: за товщиною	тонкий	3	
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	округла	4	
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5	
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2	
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	помірна	5	
26	Біб: вторинне забарвлення	відсутнє	1	
27	Біб: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1	
30	Біб: ступінь вигину	сильний	7	
31	Біб: форма вигину	увігнута	1	
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	загострена	1	
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
34	Біб: вигин дзьобика	сильний	7	
35	Біб: текстура поверхні	гладенька або слабо шерехата	3	
36	Біб: звуження (у сухому стані)	сильне	3	
37	Насіння: маса	середня	5	
38	Насінина: форма поздовжнього розрізу	ниркоподібна	4	
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насінина: ступінь вигину	слабкий	3	
40	Насінина: форма поперечного перерізу	вузькоеліптична	2	
41	Насінина: за шириною в поперечному перерізі	середня	5	
42	Насінина: за довжиною	коротка	3	
43	Насінина: кількість кольорів	один	1	
44	Насінина: основне забарвлення (найбільша зона)	біле	1	
45	Насінина: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0	
46	Насінина: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
47	Насінина: вираження орнаменту	помірне	5	
48	Час цвітіння (50% рослин мають щонайменше одну квітку)	середній	5	
49	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (BCMV)	наявна з симптомами	2	
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність зелених бобів у фазу «лопатки», т/га – 20. Урожайність ранньої продукції (протягом 10 діб), т/га – 19,5. Тривалість періоду від повних сходів до початку технічної (споживчої) стиглості, діб – 66. Тривалість плодоношення, діб – 77. Кількість бобів на рослині, шт. – 7. Вміст білка у бобах, % – 2, сухої речовини, % – 14, загального цукру, % – 3,2, вітаміну С, мг/100 г – 22. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (*Ascochyta phaseolorum* Sacc., *Ascochyta pisi* Lib.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): квасолева зернівка (*Acanthoscelides obtectus* Say.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 22103003 Назва сорту: Макарон **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230630**

Дата пріоритету: 05.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230918

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	великий	7	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	до похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	великий	7	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	до дуже довгої
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	до широкої
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 25,85. Група стиглості: пізня. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 61,4. Вміст загального цукру, % – 7,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 5, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 6, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 21103010 Назва сорту: Мегаза **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841

Дата пріоритету: 14.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230889

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	сильно похиле	7	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	слабке	3	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	слабке	3	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	від раннього до середнього	4	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	помірне	5	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	коротка	3	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	короткий	3	
29	Качан: діаметр (посередині)	великий	7	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	мала	3	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	коротка	3	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	вузька	3	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовтувато-біле	2	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 12,1. Група стиглості: середня – 2. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 70. Вміст загального цукру, % – 28. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 7, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 6, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 22103004 Назва сорту: МУСС **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230631**

Дата пріоритету: 05.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230919

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	до сильної
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	до великого
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	до похилого
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабе	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабе	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабе	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	пряме	1	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабе	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабе	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабе	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабе	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	до великої
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	два	2	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	до широкої
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	до помірної
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	біле	1	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабе	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 25,85. Група стиглості: середня – 2. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 61,4. Вміст загального цукру, % – 7,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zea* Burr.) – 5, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 5, сажка пухирчаста (*Ustilago zea* Beckm.) – 6, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 21103005 Назва сорту: НІКОЛЬ **Заявник (код):** 2087 **Власник сорту (код):** 2662

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230947

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	від дуже раннього до раннього	2	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	до середньої кількості
15	Качан: час появи шовку	від дуже раннього до раннього	2	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	слабке	3	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення півхи	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	довга	7	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	два	2	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	широка	7	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	помірна	3	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	біле	1	до жовтого
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 15,9. Група стиглості: рання – 1. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 55. Вміст загального цукру, % – 20,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 7, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 7, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 7, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 22103002 Назва сорту: Фрагман **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент № 230629**

Дата пріоритету: 05.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230917

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волоть: час цвітіння	ранній	3	
9	Волоть: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Волоть: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волоть: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє або дуже слабке	1	
12	Волоть: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	
13	Волоть: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волоть: кількість первинних бічних гілочок	мала	3	
15	Качан: час появи шовку	ранній	3	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Волоть: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волоть: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	
22	Волоть: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волоть: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	дуже мале	1	до малого
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	до широкої
27	Качан: ніжка за довжиною	середня	5	
28	Качан: за довжиною	середній	5	
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	помірна	5	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовте	3	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність качанів, т/га – 25,9. Група стиглості: пізня – 3. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 76,4. Вміст загального цукру, % – 6,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 6, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 5, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 6, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Кукурудза цукрова *Zea mays* L. ssp. *saccharata* Sturt.

Заявка № 22103001 Назва сорту: Шербет **Заявник (код):** 273 **Власник сорту (код):** 273

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент №** 230628

Дата пріоритету: 05.01.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230916

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Перший листок: антоціанове забарвлення піхви	слабке	3	
2	Перший листок: форма верхівки	від загостреної до округлої	2	
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	3	
4	Листок: хвилястість краю пластинки	помірна	2	
5	Листок: кут між листовою пластинкою і стеблом	середній	5	
6	Листок: положення пластинки у просторі	помірно похиле	5	
7	Стебло: зигзагоподібність	слабка	2	
8	Волость: час цвітіння	середній	5	
9	Волость: антоціанове забарвлення основи колоскової луски	помірне	5	
10	Волость: антоціанове забарвлення колоскових лусок за винятком основи	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Волость: антоціанове забарвлення пиляків	слабке	3	
12	Волость: кут між головною віссю та бічними гілочками	середній	5	до великого
13	Волость: положення бічних гілочок у просторі	ледь похиле	3	
14	Волость: кількість первинних бічних гілочок	середня кількість	5	
15	Качан: час появи шовку	середній	5	
16	Качан: антоціанове забарвлення шовку	відсутнє або дуже слабке	1	
17	Стебло: антоціанове забарвлення повітряних коренів	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
18	Волость: розташування колосків за щільністю	щільне	7	
19	Листок: антоціанове забарвлення піхви	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Стебло: антоціанове забарвлення міжвузлів	відсутнє або дуже слабке	1	
21	Волость: головна вісь за довжиною (від нижньої бічної гілочки до верхівки)	середня	5	до довгої
22	Волость: головна вісь за довжиною (від верхньої бічної гілочки до верхівки)	коротка	3	
23	Волость: бічна гілочка за довжиною	середня	5	
24,1	Лише для інбредних ліній та сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	дуже довга	9	
24,2	Лише для гібридів і сортів, які вільно запилюються, за винятком сортів з цукровим або розлусним типом зернівки. Рослина: за довжиною	ознака не визначається	0	
25	Рослина: співвідношення висоти прикріплення верхнього качана до висоти рослини	мале	3	до середнього
26	Листок: пластинка за шириною	середня	5	
27	Качан: ніжка за довжиною	коротка	3	до середньої
28	Качан: за довжиною	середній	5	до довгого
29	Качан: діаметр (посередині)	дуже великий	9	
30	Качан: форма	конусно-циліндрична	2	
31	Качан: кількість зернових рядів	середня	5	
32	Лише для сортів з цукровим або восковим типом зернівки. Качан: кількість забарвлень зерен	одне	1	
33	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: інтенсивність жовтого кольору	слабка	3	
34	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за довжиною	середня	5	
35	Лише для сортів з цукровим типом зернівки. Зернівка: за шириною	середня	5	
36	Качан: тип зернівки	цукровий	6	
37	Тільки сорти з цукровим типом зернівки. Качан: зморшкуватість верхівок зернівок	слабка	1	
38	Качан: забарвлення верхівки зернівки	жовтувато-біле	2	
39	За винятком сортів з цукровим типом зернівки. Качан: забарвлення низу зернівки	ознака не визначається	0	
40	Лише для сортів з розлусним типом зернівки. Зернівка: тип розлуснення	ознака не визначається	0	
41	Качан: антоціанове забарвлення лусок стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність качанів, т/га – 25,48. Група стиглості: середня – 2. Висота прикріплення першого нижнього качана, см – 91,3. Вміст загального цукру, % – 4,6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз (*Bacillus zeae* Burr.) – 5, сажка летюча (*Sorosporium reilianum* Mc. Alp.) – 5, сажка пухирчаста (*Ustilago zeae* Beckm.) – 6, фузаріоз (*Fusarium moniliforme* Sheldon.) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 21109006 Назва сорту: Карлав **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841

Дата пріоритету: 30.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230875

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	вузька	3	
2	Листок: положення	горизонтальне	5	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина / ширина	велике	7	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	слабка	3	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	середня	5	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	середня	5	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	великий	7	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	пізній	7	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 75. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, діб – 65. Вміст каротину, мг% – 27, загального цукру, % – 7,5, сухої речовини, % – 11,5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 6, гниль біла – 6, гниль суха – 6, гниль мокра бактеріальна – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Морква *Daucus carota* L.**Заявка № 21109002 Назва сорту:** Нью Курода АС **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819**Дата пріоритету:** 09.09.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230912****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до кінчної форми	слабка	3	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борошенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	пізній	7	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 55. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, днів – 80. Вміст каротину, мг% – 16,5; загального цукру, % – 8; сухої речовини, % – 12. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 9, гниль біла – 9, гниль суха – 9, гниль мокра бактеріальна – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 20110012 Назва сорту: БРАНДІНО **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата пріоритету: 10.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230891

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	наявна	9	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	тупа	3	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноєційність	2	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	чорне	2	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	великий	7	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	дуже мале	1	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	помірний	5	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	дуже нещільна	1	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	коричнєве	5	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти буроті плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 70. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 37. Тривалість періоду плодоношення, діб – 40.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.**Заявка № 21110009 Назва сорту:** Дієз **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата пріоритету:** 22.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230910**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
10	Листок: хвилястість краю	помірна	2	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	ранній	3	
13	Рослина: виявлення статі	субгіномоноєційність	2	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	чорне	2	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	помірний	5	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	лише смугами	1	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1	
40	Плід: щільність плям	дуже нещільна	1	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	ознака не визначалась	0	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти бурі плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 127,9. Вміст сухої речовини в плоді, % – 3,0. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 43. Тривалість періоду плодоношення, діб – 72.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 23110010 Назва сорту: Маркетморе 70 **Заявник (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 05.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230767

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	моноеційність	1	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	відсутня	1	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	слабка	3	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	дуже малий	1	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1	
40	Плід: щільність плям	дуже нещільна	1	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	відсутня	1	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	відсутня	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 100. Вміст сухої речовини в плоді, % – 4,5. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 55. Тривалість періоду плодоношення, діб – 90.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 22110011 Назва сорту: Проскор **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.09.2023 **Патент №** 230380

Дата пріоритету: 29.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230779

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	помірне	5	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	дуже слабка	1	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноєційність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 2 або 3	4	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	короткий	3	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	дуже мале	1	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	тупа	2	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	помірна	5	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	ознака не визначається	0	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	ознака не визначається	0	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	малий	3	
36	Плід: смужки за довжиною	короткі	3	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/2 довжини	2	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	слабкий	3	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	високо стійкий	3	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурі плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i> (CGMMV))	наявна	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 52. Вміст сухої речовини в плоді, % – 2,3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 48. Тривалість періоду плодоношення, діб – 135.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus* L.

Заявка № 23110009 Назва сорту: Фенікс де Люкс **Заявник (код):** 1163 **Власник сорту (код):** 1163

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230579**

Дата пріоритету: 11.08.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230780

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індетермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжвузлів	середня	5	
4	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластинка: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластинки	мале	3	
7	Листкова пластинка: форма апікальної лопаті	прямокутна	2	
8	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	темна	7	
9	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3	
10	Листок: хвилястість краю	відсутня або слабка	1	
11	Листкова пластинка: зубчастість краю	слабка	3	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	пізній	7	
13	Рослина: виявлення статі	моноєційність	1	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	переважно 1 або 2	2	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
16	Партенокарпія	відсутня	1	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	великий	7	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	середнє	5	
21	Плід: форма поперечного перерізу	від округлої до кутастої	2	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лише для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	гостра	1	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стиглості	зелене	3	
26	За винятком білоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	слабка	3	
27	Плід: ребристість	помірна	2	
28	Плід: борозенки	відсутні	1	
29	Плід: зморшкуватість	відсутня	1	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	волоски і шипики	2	
32	Плід: покрив за щільністю	щільний	7	
33	Лише сорти з білою зав'яззю (ozn. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	біле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	переважно смугами	2	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	1/3 довжини	1	
40	Плід: щільність плям	нещільна	3	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стиглості	зелене	3	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu)	відсутня	1	
45	Стійкість проти звичайної мозаїки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus</i> (CMV))	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	помірно стійкий	2	
48	Стійкість проти бурі плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожелтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 45. Вміст сухої речовини в плоді, % – 5,1. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стиглості, діб – 55. Тривалість періоду плодоношення, діб – 30.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 23115014 Назва сорту:** Хібачі **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата пріоритету:** 07.06.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230727****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилія	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індетермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	середнє	5	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругласта	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	милке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насінневих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед достиганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за достигання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	твердий	7	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час достигання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достигання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	сприятливий	9	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	відсутня	1	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	відсутня	1	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	відсутня	1	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед достиганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	сильна	3	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 450. Вміст каротину, мг% – 6,8; сухої речовини в плоді, % – 6,5; вітаміну С, мг% – 7; загального цукру, % – 5,5. Загальна кислотність, % – 0,5. Маса товарного плоду, г – 100. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 113. Тривалість періоду плодоношення, діб – 150.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 21115017 Назва сорту: ХМ 5900 **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230949

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	еліптична	6	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	милке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	середній	5	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 110. Вміст каротину, мг% – 2,6; сухої речовини в плоді, % – 6; вітаміну С, мг% – 22; загального цукру, % – 16. Загальна кислотність, % – 0,8. Маса товарного плоду, г – 75. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 117. Тривалість періоду плодоношення, діб – 60.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 21115016 Назва сорту:** ХМ 9903 **Заявник (код):** 2662 **Власник сорту (код):** 2662**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 31.10.2023**Свідчення про державну реєстрацію № 230948****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	детермінантний	1	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	середня	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям	ознака не визначається	0	
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	горизонтальне	5	
7	Листок: за довжиною	середній	5	
8	Листок: за шириною	середній	5	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
12	Листок: глянуватість (як для б)	слабка	3	
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	малий	3	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	піднесене	3	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушення прийомочки маточки	відсутнє або дуже слабке	1	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	відсутній	1	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки)	ознака не визначається	0	
22	Плід: розмір	середній	5	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	велике	7	
24	Плід: форма повздовжнього розрізу	еліптична	6	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: заглиблення біля плодоніжки	мілке	3	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	середній	5	
29	Плід: розмір квіткового рубця	дуже малий	1	
30	Плід: форма кінця плоду	від плескатої до гострої	4	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	середній	5	
32	Плід: перикарпій за товщиною	середній	5	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	дві-три	2	
34	Плід: зелене плече (перед досяганням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед досяганням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед досяганням)	слабка	3	
38	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	5	
39	Плід: забарвлення м'якоті (за досягання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	тривалий	7	
42	Час цвітіння	ранній	3	
43	Час досягання	ранній	3	
44	Плід: вміст сухої речовини (за досягання)	низький	3	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	ознака не визначалась	0	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	ознака не визначалась	0	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	ознака не визначалась	0	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	ознака не визначалась	0	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	ознака не визначалась	0	
62	Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
63	Плід: зелені смуги (перед досяганням)	відсутні	1	
64	Плід: глянуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	жовтий	2	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 105. Вміст каротину, мг% – 2,8; сухої речовини в плоді, % – 5,8; вітаміну С, мг% – 21; загального цукру, % – 16. Загальна кислотність, % – 0,7. Маса товарного плоду, г – 70. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 120. Тривалість періоду плодоношення, діб – 60.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 22118001 Назва сорту: Експо **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230793

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	ознака не визначалась	0	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилі	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	пряме	1	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	3	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мала	3	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	великий	7	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	вузькопрямокутна	7	
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2	
21	Коренеплід: форма основи	плеската	5	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	двокольорове	2	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	яскраво-червоне (забарвлення кіноварі)	1	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	малий	3	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	середній	5	
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	слабка	3	
30	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
31	Коренеплід: форма плеча	тупа	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до досягання, діб – 30. Середня маса плоду, г – 50. Вміст сухої речовини, % – 5,3; вітаміну С, мг/% – 20. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 9, гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 9, чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 21118008 Назва сорту: Марвіс **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841

Дата пріоритету: 30.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230865

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	широкооберненоюцеподібна	5	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	жовтуватий	2	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
17	Коренеплід: діаметр	середній	5	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	середній	5	
19	Коренеплід: форма	округла	2	
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3	
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	середня	5	
30	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
31	Коренеплід: форма плеча	тупа	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 42. Тривалість періоду до досягання, діб – 25. Середня маса плоду, г – 23. Вміст сухої речовини, % – 4,1; вітаміну С, мг/100 г – 24. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7, гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 7, чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 21118007 Назва сорту: Радіс **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841

Дата пріоритету: 22.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230864

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5	
6	Листок: за довжиною	довгий	7	
7	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	3	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	помірні	5	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
17	Коренеплід: діаметр	середній	5	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	середній	5	
19	Коренеплід: форма	округла	2	
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3	
21	Коренеплід: форма основи	округла	4	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двоколових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	середня	5	
30	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
31	Коренеплід: форма плеча	округла	2	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 41. Тривалість періоду до досягання, діб – 25. Середня маса плоду, г – 22. Вміст сухої речовини, % – 4,1; вітаміну С, мг/100 г – 23. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 7, гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 7, чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa* L. var. *capitata***Заявка № 23421001 Назва сорту:** Скайфос **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230740**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	середній	2	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	помірна	5	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	середній	5	
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	округла	3	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	округла	4	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	ознака не визначалась	0	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	локальне	1	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузний і плямами	3	
24	Листок: глясуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирців	середній	5	
27	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявні	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	помірна	5	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	слабке	3	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку стрілкування	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV). Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць <i>Nasonovia ribis nigris</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	відсутня	1	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	коричнуватий	3	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	велика	7	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 22,7. Середня маса головки, г – 387. Щільність головки, бал (1–9) – 6. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стиглості, діб – 58. Група стиглості: середня – 5. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5; цукрів, % – 1,9; вітаміну С, мг% – 2,9. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhnuz) – 8, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 8, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 7, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3гр.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 20106006 **Назва сорту:** АЛМАНЗОРО **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852

Дата пріоритету: 10.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230892

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	помірний	5	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	довгий	7	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина / цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина / цибулинка: шийка за шириною	вузька	3	
18	Цибулина / цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина / цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина / цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина / цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина / цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина / цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина / цибулинка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина / цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина / цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	середній	5	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	середній	5	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 97. Товарна врожайність, т/га – 95. Тривалість вегетації рослин, діб – 115. Маса цибулини, г – 180. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8, сухої речовини, % – 13, загального цукру % – 9. Лежкість, діб – 240. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 9, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.**Заявка №** 21106005 **Назва сорту:** Болбул **Заявник (код):** 2841 **Власник сорту (код):** 2841**Дата пріоритету:** 14.12.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230876**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	велика	7	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
5	Листки: зігнутість	помірна	2	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	довгий	7	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулини (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулини (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	великий	7	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	висока	7	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	великий	7	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина / цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина / цибулинка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина / цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина / цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина / цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	помірна	5	
22	Цибулина / цибулинка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина / цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина / цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина / цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1	
27	Цибулина / цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина / цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалась	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначалась	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ознака не визначається	0	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	ознака не визначалась	0	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 90. Товарна врожайність, т/га – 85. Тривалість вегетації рослин, діб – 130. Маса цибулини, г – 180. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 12,0; сухої речовини, % – 9,5; загального цукру % – 5,0. Лежкість, діб – 160. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 6, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 22106002 Назва сорту: Редровер **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230914

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	сильний	7	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	сильна	3	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	довгий	7	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина / цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина / цибулінка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина / цибулінка: форма (поздовжнього розрізу)	поперечноеліптична	8	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	слабо опукла	3	
20	Цибулина / цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина / цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина / цибулінка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина / цибулінка: основне забарвлення сухої шкірки	червоне	7	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина / цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	відсутній	1	
26	Цибулина / цибулінка: забарвлення соковитих лусок	червонувате	3	
27	Цибулина / цибулінка: кількість точок зростання на кг	дуже мала	1	до малої
28	Цибулина / цибулінка: вміст сухої речовини	середній	5	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалась	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначалась	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулини	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	висока	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 60. Товарна врожайність, т/га – 57. Тривалість вегетації рослин, діб – 160. Маса цибулини, г – 200. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 34, сухої речовини, % – 10, загального цукру % – 16. Лежкість, діб – 240. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.**Заявка № 21106001 Назва сорту:** Саратога **Заявник (код):** 2529 **Власник сорту (код):** 1418**Дата пріоритету:** 04.02.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідцтво про державну реєстрацію №** 230913**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	мала	3	
2	Листки: положення	від прямого до напівпрямого	2	
3	Листки: восковий наліт	помірний	5	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	короткий	3	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	малий	3	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	коротке	3	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	малий	3	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинка (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутній або дуже слабкий	1	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	малий	3	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	низька	3	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	малий	3	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина / цибулинка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина / цибулинка: шийка за шириною	дуже вузька	1	
18	Цибулина / цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина / цибулинка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина / цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	слабка	3	
22	Цибулина / цибулинка: суха шкірка за товщиною	тонка	3	
23	Цибулина / цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки	коричневе	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	слабка	3	
25	Цибулина / цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина / цибулинка: забарвлення соковитих лусок	відсутнє	1	
27	Цибулина / цибулинка: кількість точок зростання на кг	мала	3	
28	Цибулина / цибулинка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	помірна	5	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	середній	5	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ранній	3	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	ранній	3	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	ранній	3	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 102. Товарна врожайність, т/га – 97. Тривалість вегетації рослин, діб – 130. Маса цибулини, г – 170. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8, сухої речовини, % – 6, загального цукру % – 4. Лежкість, діб – 60. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 7, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 7. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 22106006 Назва сорту: Фасто **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230915

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: кількість листків на псевдостеблі	середня	5	
2	Листки: положення	напівпряме	3	
3	Листки: восковий наліт	помірний	5	
4	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листки: зігнутість	відсутня або слабка	1	
6,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною	середній	5	
6,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною	ознака не визначається	0	
7,1	Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр	середній	5	
7,2	Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр	ознака не визначається	0	
8	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)	середнє	5	
9	Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)	середній	5	
10	Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	відсутня або дуже слабка	1	
11	Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)	ознака не визначалась	0	
12,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір	середній	5	
12,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: розмір	ознака не визначається	0	
13,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою	середня	5	
13,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: за висотою	ознака не визначається	0	
14,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр	середній	5	
14,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: діаметр	ознака не визначається	0	
15,1	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр	середнє	5	
15,2	Тільки сорти цибулі шалот. Цибулина: відношення висота / діаметр	ознака не визначається	0	
16	Цибулина / цибулінка: позиція максимального діаметра	посередині	2	
17	Цибулина / цибулінка: шийка за шириною	середня	5	
18	Цибулина / цибулінка: форма (поздовжнього розрізу)	округла	4	
19	Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)	округла	4	
20	Цибулина / цибулінка: форма основи (як для 18)	округла	3	
21	Цибулина / цибулінка: міцність тримання сухої шкірки після збирання	сильна	7	
22	Цибулина / цибулінка: суха шкірка за товщиною	середня	5	
23	Цибулина / цибулінка: основне забарвлення сухої шкірки	коричнєве	5	
24	За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулінка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки	помірна	5	
25	Цибулина / цибулінка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)	коричнюватий	5	
26	Цибулина / цибулінка: забарвлення соковитих лусок	зеленувате	2	
27	Цибулина / цибулінка: кількість точок зростання на кг	дуже мала	1	до малої
28	Цибулина / цибулінка: вміст сухої речовини	низький	3	
29	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
30	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби	ознака не визначається	0	
31	Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени	ознака не визначалась	0	
32	Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени	ознака не визначається	0	
33	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)	ознака не визначалась	0	
34,1	Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)	середній	5	
34,2	Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)	ознака не визначається	0	
35	Час проростання за зберігання цибулин	пізній	7	
36	Чоловіча стерильність	відсутня або дуже низька	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 75. Тривалість вегетації рослин, діб – 100. Маса цибулини, г – 130. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 27, сухої речовини, % – 13, загального цукру % – 15. Лежкість, діб – 210. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

ПЛОДОВІ ТА ЯГІДНІ

Аґрус звичайний

Актинідія пурпурова х актинідія гостра

Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщепана)

Вишня степова х вишня ланезіана (підщепана)

Груша звичайна

Слива домашня

Яблуня домашня



Вид: Агрбус звичайний *Ribes uva-crispa* L.

Заявка № 23295001 Назва сорту: Кам'яноград **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230523**

Дата пріоритету: 01.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230768

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	
2	Рослина: за висотою	дуже низька	1	до низької
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Пагін: шипи	наявні	9	
5	Пагін: кількість поодиноких шипів	середня	5	
6	Пагін: кількість подвійних шипів	мала	3	
7	Пагін: кількість потрійних шипів	відсутні або дуже мала	1	
8	Пагін: кількість колючок у верхній третині	мала	3	
9	Брунька: положення відносно пагона	відхилене	2	
10	Брунька: розмір	великий	3	
11	Брунька: форма верхівки	вузько-загострена	1	
12	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Молодий листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	3	
14	Молодий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	2	
15	Листок: за довжиною	довгий	7	
16	Листок: за шириною	широкий	7	
17	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
18	Листок: кут основи пластинки відносно черешка	прямий	3	
19	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	3	
20	Суцвіття: кількість квіток	дві	2	
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	слабке	2	
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	слабке	2	
23	Квітка: опушення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	великий	7	
25	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
26	Плід: форма	оберненояцеподібна	3	
27	Плід: забарвлення	червоне	5	
28	Плід: восковий наліт	сильний	4	
29	Плід: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
30	Плід: жилкування	сильне	5	
31	Плід: міцність шкірки	помірна	3	
32	Плід: видовження основи	коротке	1	
33	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	3	
34	Час розпускання бруньок	середній	5	
35	Час початку цвітіння	середній	5	
36	Час початку достигання плодів	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 16,3. Продуктивність куща, кг – 4,9. Група стиглості: пізня – 7. Середня маса плоду, г – 6,2. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,1. Вміст сухих розчинних речовин у плодах, % – 12,62; загального цукру, % – 9,55. Загальна кислотність, % – 2,07. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 17,13; пектинових речовин, % – 0,45. Морозостійкість, бал (1–9) – 8,0. Посухостійкість, бал (1–9) – 8,0. Стійкість до термічного опіку ягід, бал (1–9) – 7,5. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): американська борошниста роса (сферотека) (*Sphaerotheca mors uvae* Berk. et Curt.) – 8,5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сірий бруньковий довгоносик (*Sciaphobus squalidus* Gyll.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Агрбус звичайний *Ribes uva-crispa* L.

Заявка № 23295002 Назва сорту: Петрівка **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент №** 230524

Дата пріоритету: 01.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230769

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	сильна	7	
2	Рослина: за висотою	висока	7	
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Пагін: шипи	наявні	9	
5	Пагін: кількість поодиноких шипів	середня	5	
6	Пагін: кількість подвійних шипів	мала	3	
7	Пагін: кількість потрійних шипів	відсутні або дуже мала	1	
8	Пагін: кількість колючок у верхній третині	мала	3	
9	Брунька: положення відносно пагона	притиснуте або злегка відхилене	1	
10	Брунька: розмір	великий	3	
11	Брунька: форма верхівки	широко-загострена	2	
12	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Молодий листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	3	
14	Молодий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: за довжиною	довгий	7	
16	Листок: за шириною	широкий	7	
17	Листок: відношення довжина / ширина	мале	3	
18	Листок: кут основи пластинки відносно черешка	прямий	3	
19	Листок: глянуватість верхнього боку	сильна	5	
20	Суцвіття: кількість квіток	дві	2	
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	відсутнє або дуже слабке	1	
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Квітка: опушення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	великий	7	
25	Плід: відношення довжина / ширина	мале	3	
26	Плід: форма	еліптична	2	
27	Плід: забарвлення	червоне	5	
28	Плід: восковий наліт	сильний	4	
29	Плід: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
30	Плід: жилкування	помірне	3	
31	Плід: міцність шкірки	помірна	3	
32	Плід: видовження основи	середнє	3	
33	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	3	
34	Час розпускання бруньок	середній	5	
35	Час початку цвітіння	середній	5	
36	Час початку достигання плодів	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 15,7. Продуктивність куща, кг – 5,0. Група стиглості: пізня – 7. Середня маса плоду, г – 4,6. Де-густаційна оцінка, бал (1–9) – 8,7. Вміст сухих розчинних речовин у плодах, % – 13,64; загального цукру, % – 10,61. Загальна кислотність, % – 3,15. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 18,72; пектинових речовин, % – 0,63. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до термічного опіку ягід, бал (1–9) – 9. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): американська борошниста роса (сферотека) (*Sphaerotheca mors uvae* Berk. et Curt.) – 8,5. Стійкість проти шкідників, бал (1 – 9): вогнівка агрусова (*Zophodaa convolutella* Hb.) – 8, сірий бруньковий довгоносик (*Sciaphobus squalidus* Gyll.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Агрис звичайний *Ribes uva-crispa* L.

Заявка № 23295003 Назва сорту: Холодний яр **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230525**

Дата пріоритету: 01.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 10.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230770

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	
2	Рослина: за висотою	середня	5	
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Пагін: шипи	наявні	9	
5	Пагін: кількість поодиноких шипів	середня	5	
6	Пагін: кількість подвійних шипів	відсутні або дуже мала	1	
7	Пагін: кількість потрійних шипів	відсутні або дуже мала	1	
8	Пагін: кількість колючок у верхній третині	мала	3	
9	Брунька: положення відносно пагона	сильно відхилене	3	
10	Брунька: розмір	середній	2	
11	Брунька: форма верхівки	вузько-загострена	1	
12	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Молодий листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	3	
14	Молодий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
15	Листок: за довжиною	середній	5	
16	Листок: за шириною	середній	5	
17	Листок: відношення довжина / ширина	середнє	5	
18	Листок: кут основи пластинки відносно черешка	тупий	4	
19	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	3	
20	Сувцвіття: кількість квіток	одна	1	
21	Квітка: антоціанове забарвлення чашолистків	помірне	3	
22	Квітка: антоціанове забарвлення зав'язі	помірне	3	
23	Квітка: опушення зав'язі	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	середній	5	
25	Плід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
26	Плід: форма	еліптична	2	
27	Плід: забарвлення	білувато-зелене	1	
28	Плід: восковий наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
29	Плід: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
30	Плід: жилкування	сильне	5	
31	Плід: міцність шкірки	помірна	3	
32	Плід: видовження основи	коротке	1	
33	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	3	
34	Час розпускання бруньок	середній	5	
35	Час початку цвітіння	середній	5	
36	Час початку достигання плодів	дуже ранній	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 14,4. Продуктивність куща, кг – 4,3. Група стиглості: рання – 3. Середня маса плоду, г – 4,9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8,7. Вміст сухих розчинних речовин у плодах, % – 14,44; загального цукру, % – 11,46. Загальна кислотність, % – 2,03. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 18,86; пектинових речовин, % – 0,88. Морозостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8,7. Стійкість до термічного опіку ягід, бал (1–9) – 9. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): американська борошниста роса (сферотека) (*Sphaerotheca mors uvae* Berk. et Curt.) – 8,5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сірий бруньковий довгоносик (*Sciaphobus squalidus* Gyll.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП, ЗГр.

Вид: Актинідія пурпурова х актинідія гостра *Actinidia purpurea* Rehd. x *Actinidia arguta* Planch.

Заявка № 23368003 Назва сорту: Галаретка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230577

Дата пріоритету: 12.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230837

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: самоплідність	відсутня	1	
3	Рослина: за силою росту	сильна	7	
4	Молодий пагін: щільність ворсинок	дуже нещільні	1	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Стебло: за товщиною	середнє	2	
7	Стебло: забарвлення пагона з-під сонячного боку	сіро-коричневе	2	
8	Стебло: текстура кори	гладенька	1	
9	Стебло: ворсинки за щільністю	відсутні або нещільні	1	
10	Стебло: розмір сочевичок	середній	3	
11	Стебло: кількість сочевичок	велика	7	
12	Стебло: випуклість брунькового виступу	середня	3	
13	Стебло: покриття бруньки	наявне	9	
14	Стебло: розмір отвору в покритті бруньки	малий	1	
15	Стебло: листовий рубець	плаский	1	
16	Стебло: серцевина	шарувата	2	
17	Листкова пластинка: форма	ланцетна	1	
18	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
19	Листкова пластинка: форма верхівки	гострокінцева	2	
20	Листкова пластинка: базальні часточки	торкаються	4	
21	Листкова пластинка: кількість війчастих зубців	мала	3	
22	Листкова пластинка: волоски на верхньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
23	Листкова пластинка: волоски на нижньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
24	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
25	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку	помірно зелене	3	
26	Листкова пластинка: строкате забарвлення	відсутнє	1	
27	Листкова пластинка: колір строкатого забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Листок: відношення довжини черешка до довжини пластинки	середнє	5	
29	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	слабке	3	
30	Суцвіття: тип	дихазій	2	
31	Суцвіття: кількість квіток	середня	3	
32	Генеративна брунька: положення першої луски	середнє	2	
33	Квітка: кількість чашолистків	середня	2	
34	Квітка: основне забарвлення чашолистків	біле	1	
35	Квітка: волосинки на чашолистках за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
36	Квітка: діаметр	середній	5	
37	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
38	Квітка: вигляд з боку	випукла	3	
39	Квітка: кількість маточок	мала	1	
40	Квітка: положення маточок	пряме	1	
41	Пелюстка: забарвлення адаксового боку	зеленувато-біле	2	
42	Пелюстка: розподіл забарвлення	однорідний	2	
43	Пелюстка: вторинне забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
44	Пелюстка: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Піляк: забарвлення	сіре	3	
46	Плід: маса	середня	5	
47	Плід: за довжиною	короткий	3	
48	Плід: за шириною	середній	5	
49	Плід: відношення довжина / ширина	мале	3	
50	Плід: форма	яйцеподібна	1	
51	Плід: форма поперечного перерізу (посередині)	сплюснута	2	
52	Плід: маточковий кінець	округлий	4	
53	Плід: ступінь загостреності	слабкий	1	
54	Плід: кільце чашечки	помірно виражене	2	
55	Плід: форма плеча базальної частини	зрізана	1	
56	Плід: плодоніжка за довжиною	довга	7	
57	Плід: довжина плодоніжки відносно довжини плоду	довга	7	
58	Плід: прояв сочевичок на шкірці	слабкий	1	
59	Плід: ворсистість шкірки	відсутня	1	
60	Плід: ворсинки за щільністю	ознака не визначається	0	
61	Плід: забарвлення ворсинок	ознака не визначається	0	
62	Плід: з'єднання ворсинок із шкіркою	ознака не визначається	0	
63	Плід: забарвлення шкірки	пурпурово-червоне	10	
64	Плід: з'єднання шкірки із м'якоттю	помірне	2	
65	Плід: забарвлення зовнішнього оплодня	зеленувато-жовте	4	
66	Плід: забарвлення камер	червоно-пурпурове	8	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
67	Плід: поширення червонуватого забарвлення вздовж камер	дуже сильне	5	
68	Плід: інтенсивність червонуватого забарвлення на камерах	сильна	7	
69	Плід: відношення ширина серцевини / діаметр плоду	від середнього до великого	6	
70	Плід: основна форма серцевини в поперечному перерізі	сплюснута	2	
71	Плід: забарвлення серцевини	червоно-пурпурове	4	
72	Плід: цукристість	середня	5	
73	Плід: кислотність	низька	3	
74	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
75	Час початку цвітіння	середній	5	
76	Час збиральної стиглості	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Група стиглості: середня – 5. Самоплідність: відсутня – 9. Час збиральної стиглості: середній – 5. Урожайність, т/га – 16,5. Середня маса плоду, г – 9,5. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 54,1; каротину, мг/100 г – 0,47. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плямистість листків (*Septoria piricola* Desm) – 9, сіра плодова гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Актинідія пурпурова х актинідія гостра *Actinidia purpurea* Rehd. x *Actinidia arguta* Planch.

Заявка № 23368002 Назва сорту: Фортуна Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230576

Дата пріоритету: 12.04.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230836

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: самоплідність	відсутня	1	
3	Рослина: за силою росту	сильна	7	
4	Молодий пагін: щільність ворсинок	дуже нещільні	1	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Стебло: за товщиною	середнє	2	
7	Стебло: забарвлення пагона з-під сонячного боку	зелено-біле	1	
8	Стебло: текстура кори	гладенька	1	
9	Стебло: ворсинки за щільністю	відсутні або нещільні	1	
10	Стебло: розмір сочевичок	середній	3	
11	Стебло: кількість сочевичок	велика	7	
12	Стебло: випуклість брунькового виступу	середня	3	
13	Стебло: покриття бруньки	наявне	9	
14	Стебло: розмір отвору в покритті бруньки	малий	1	
15	Стебло: листковий рубець	плаский	1	
16	Стебло: серцевина	шарувата	2	
17	Листкова пластинка: форма	ланцетна	1	
18	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
19	Листкова пластинка: форма верхівки	хвостата	1	
20	Листкова пластинка: базальні часточки	торкаються	4	
21	Листкова пластинка: кількість війчастих зубців	велика	7	
22	Листкова пластинка: волоски на верхньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
23	Листкова пластинка: волоски на нижньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
24	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
25	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку	помірно зелене	3	
26	Листкова пластинка: строкате забарвлення	відсутнє	1	
27	Листкова пластинка: колір строкатого забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Листок: відношення довжини черешка до довжини пластинки	середнє	5	
29	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	слабке	3	
30	Суцвіття: тип	дихазій	2	
31	Суцвіття: кількість квіток	середня	3	
32	Генеративна брунька: положення першої луски	середнє	2	
33	Квітка: кількість чашолистків	середня	2	
34	Квітка: основне забарвлення чашолистків	біле	1	
35	Квітка: волосинки на чашолистках за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
36	Квітка: діаметр	середній	5	
37	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
38	Квітка: вигляд з боку	випукла	3	
39	Квітка: кількість маточок	мала	1	
40	Квітка: положення маточок	пряме	1	
41	Пелюстка: забарвлення адаксового боку	зеленувато-біле	2	
42	Пелюстка: розподіл забарвлення	однорідний	2	
43	Пелюстка: вторинне забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
44	Пелюстка: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Піляк: забарвлення	сіре	3	
46	Плід: маса	середня	5	
47	Плід: за довжиною	середній	5	
48	Плід: за шириною	середній	5	
49	Плід: відношення довжина / ширина	мале	3	
50	Плід: форма	видовжена	2	
51	Плід: форма поперечного перерізу (посередині)	поперечноеліптична	3	
52	Плід: маточковий кінець	тупий (сильно виступає)	6	
53	Плід: ступінь загостреності	сильний	3	
54	Плід: кільце чашечки	помірно виражене	2	
55	Плід: форма плеча базальної частини	зрізана	1	
56	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
57	Плід: довжина плодоніжки відносно довжини плоду	середня	5	
58	Плід: прояв сочевичок на шкірці	слабкий	1	
59	Плід: ворсистість шкірки	відсутня	1	
60	Плід: ворсинки за щільністю	ознака не визначається	0	
61	Плід: забарвлення ворсинок	ознака не визначається	0	
62	Плід: з'єднання ворсинок із шкіркою	ознака не визначається	0	
63	Плід: забарвлення шкірки	зелене	2	
64	Плід: з'єднання шкірки із м'якоттю	помірне	2	
65	Плід: забарвлення зовнішнього оплодня	світло-зелене	1	
66	Плід: забарвлення камер	зеленувато-жовте	4	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
67	Плід: поширення червонуватого забарвлення вздовж камер	дуже слабке	1	
68	Плід: інтенсивність червонуватого забарвлення на камерах	слабка	3	
69	Плід: відношення ширина серцевини / діаметр плоду	середнє	5	
70	Плід: основна форма серцевини в поперечному перерізі	поперечноеліптична	3	
71	Плід: забарвлення серцевини	зеленувато-біле	2	
72	Плід: цукристість	середня	5	
73	Плід: кислотність	низька	3	
74	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
75	Час початку цвітіння	середній	5	
76	Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Група стиглості: дуже рання – 1. Самоплідність: відсутня – 9. Час збиральної стиглості: ранній – 1. Урожайність, т/га – 16,5. Середня маса плоду, г – 9,8. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 41,3; каротину, мг/100 г – 0,36. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плямистість листків (*Septoria piricola* Desm) – 9, сіра плодова гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.

Вид: Алича (слива розлога, вишнеслива) (підщепа) *Prunus cerasifera* Ehrh.

Заявка № 23681001 Назва сорту: Міробалан 29С **Заявник (код):** 3208

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідцтво про державну реєстрацію № 230902

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за силою росту	помірна	5	
2	Рослина: габітус	розлогий	3	
3	Рослина: галузнення	сильне	7	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (середня третина пагона)	середнє	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	відсутнє	1	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	притиснута	1	
10	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
11	Однорічний пагін: форма верхівки вегетативної бруньки	тупа	2	
12	Однорічний пагін: розмір брунькового виступу	малий	3	
13	Однорічний пагін: гілкування (наприкінці літа)	сильне	7	
14	Молодий пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення молодих листків (впродовж інтенсивного росту)	слабка	3	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
17	Листкова пластинка: відношення довжини до ширини	середнє	5	
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за винятком кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	короткий	3	
21	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	світло-зелене	1	
23	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
24	Листкова пластинка: опушення нижнього боку до верхівки	відсутнє	3	
25	Листкова пластинка: форма краю	городчаста і пилчаста	2	
26	Листкова пластинка: розсіченість краю за глибиною	мілка	3	
27	Черешок: за довжиною	короткий	3	
28	Черешок: опушення верхнього боку	відсутнє	1	
29	Черешок: інтенсивність опушення верхнього боку	ознака не визначається	0	
30	Черешок: жолобок за глибиною	мілкий	3	
31	Листок: відношення довжини листової пластинки до довжини черешка	середнє	5	
32	Листок: наявність прилистків	наявні	9	
33	Прилисток: за довжиною	середній	5	
34	Листок: нектарники	наявні	9	
35	Лише для сортів з наявними нектарниками. Листок: переважаюча кількість нектарників	один	1	
36	Листок: положення нектарників	переважно на основі пластинки	1	
37	Нектарник: забарвлення	зелене	1	
38	Нектарник: форма	округла	1	
39	Рослина: квітки	наявні	9	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Тип росту: звичайний – 3. Габітус: розлогий – 3. Ступінь укорінення здерев'янілих живців, бал (1–9) – 6, напівздерев'янілих живців – 7, зелених живців – 8. Розмноження *in vitro*, бал (1–9) – 8. Ступінь сумісності, бал (1–9): слива – 9, абрикос – 8, персик – 6. Якірність: сильна – 7. Строк вступу щеплених дерев у товарне плодоношення, рік – 4. Морозостійкість кореневої системи, бал (1–9) – 6. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): моніліальний опік – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плоджерка сливова – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Вишня степова х вишня ланезіана (підщепи) *Prunus fruticosa* (Pall.) Woron. х *Prunus lannesiana*

Заявка № 23352001 Назва сорту: ВСЛ 2.1 **Заявник (код):** 3218 **Власник сорту (код):** 3218

Дата пріоритету: 21.07.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230895

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: сила росту	середня	5	
2	Рослина: кількість гілок	велика	7	
3	Рослина: габітус	розлогий	2	
4	Однорічний пагін: характер росту	прямий	1	
5	Однорічний пагін: опушення верхньої частини пагона	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Однорічний пагін: глянуватість кори	дуже сильна	9	
7	Однорічний пагін діаметр (середньої третини)	середній	5	
8	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною (у середній частині)	середні	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	7	
10	Однорічний пагін: розмір сочевичок	середній	5	
11	Однорічний пагін: форма сочевичок	широкоеліптична	2	
12	Однорічний пагін: переважаюче забарвлення з-під сонячного боку	пурпуровокоричнє	5	
13	Однорічний пагін: розмір брунькового виступу	середній	5	
14	Однорічний пагін: форма верхівки бруньки	гостра	1	
15	Однорічний пагін: положення бруньок відносно пагона	слабко відхилене	2	
16	Однорічний пагін: забарвлення верхівки	зеленувате	2	
17	Листок: антоціанове забарвлення пластинки	відсутнє	1	
18	Листок: відтінок антоціанового забарвлення пластинки	ознака не визначається	0	
19	Листкова пластинка: положення відносно пагона	напівпряме	3	
20	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
23	Листкова пластинка: форма у поперечному перерізі	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	довгий	7	
25	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	2	
26	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення жилок	помірне	5	
28	Черешок листка: за довжиною	довгий	7	
29	Прилисток: розмір	середній	5	
30	Час початку розпускання бруньок	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Сила росту: середня – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): коренева гниль – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): личинка хруща – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Груша звичайна *Pyrus communis* L.**Заявка №** 22258002 **Назва сорту:** Вежа мускатна **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601**Дата пріоритету:** 20.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230878**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	сильне	7	
2	Дерево: галузнення	сильне	7	
3	Дерево: габітус (форма крони)	прямий	2	
4	Однорічний пагін: за формою	хвилястий	2	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	довгі	7	
6	Однорічний пагін: домінуюче забарвлення з-під сонячного боку	сіро-коричнєве	2	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: форма верхівок вегетативних бруньок	гостра	1	
9	Однорічний пагін: розташування вегетативних бруньок відносно пагона	помітно відхилені	3	
10	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	середній	5	
11	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (у період інтенсивного росту)	помірне	5	
12	Молодий пагін: інтенсивність опушення (верхня третина)	помірна	5	
13	Листкова пластинка: положення відносно пагона	горизонтальне	2	
14	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
15	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
16	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
17	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
18	Листкова пластинка: форма верхівки (не враховуючи кінчика)	гостра	1	
19	Листкова пластинка: кінчик за довжиною	довгий	7	
20	Листкова пластинка: форма краю (верхньої половини)	гострозазублена	4	
21	Листкова пластинка: надрізи країв за глибиною	мілкі	3	
22	Листкова пластинка: вигин центральної жилки	помірний	5	
23	Черешок: за довжиною	середній	5	
24	Черешок: прилистки	наявні	9	
25	Прилистки: відстань від основи черешка	коротка	3	
26	Пагін: розташування квіткової бруньки	головним чином на довгих пагонах	2	
27	Квіткова брунька: за довжиною	середня	5	
28	Чашолисток: за довжиною	середній	5	
29	Чашолисток: положення відносно віночка	притиснуте	1	
30	Квітка: положення країв пелюсток	перекриваються	3	
31	Приймочка: розташування відносно пелюстків	на рівні	2	
32	Квітка: розмір пелюстки	середній	5	
33	Квітка: форма пелюстки (нігтик до уваги не беруть)	округла	1	
34	Квітка: форма основи пелюстки (як для 33)	усічена	3	
35	Квітка: нігтик за довжиною	середній	5	
36	Нестиглий плід: забарвлення чашолистків	зелено-коричнєве	2	
37	Плід: за довжиною	довгий	7	
38	Плід: максимальний діаметр	середній	5	
39	Плід: відношення довжина / діаметр	велике	7	
40	Плід: місце максимального діаметра	посередині	1	
41	Плід: за розміром	середній	5	
42	Плід: симетричність (у поздовжньому розрізі)	симетричний	1	
43	Плід: профіль боків	увігнутий	1	
44	Плід: основне забарвлення шкірки	жовто-зелене	3	
45	Плід: відносне поширення основного забарвлення	велике	7	
46	Плід: відтінок основного забарвлення	оранжевий	1	
47	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола чашолистків	середнє	5	
48	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення на щічках	середнє	5	
49	Плід: відносне поширення червоно-коричневого забарвлення довкола плодоніжки	відсутнє або дуже мале	1	
50	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
51	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
52	Плід: викривлення плодоніжки	помірне	5	
53	Плід: положення плодоніжки відносно верхівки плоду	під нахилом	2	
54	Плід: заглиблення лійки плодоніжки	відсутнє або дуже мілке	1	
55	Плід: положення чашолистків (за досягання)	прямі	2	
56	Плід: блюдце (як для 55)	наявне	9	
57	Плід: заглиблення блюдця (як для 55)	середнє	5	
58	Плід: блюдце за шириною (як для 55)	середнє	5	
59	Плід: форма зони навколо блюдця	злегка ребриста	2	
60	Плід: структура м'якоті	середньозерниста	5	
61	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
62	Плід: соковитість м'якоті	соковита	7	
63	Насінина: форма	еліптична	3	
64	Час початку цвітіння	середній	5	
65	Час збиральної стиглості	пізній	7	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30–35. Середній урожай з дерева, кг – 35,4. Маса плоду (середня), г – 200. Маса плоду (максимальна), г – 220. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 2,67; загального цукру, % – 10,06; сухих розчинних речовин у плодах, % – 11,95. Загальна кислотність, % – 0,11. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 9, парша – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): плодожерка – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості – осін. Напрямок використання – свж. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 5 x 3. Дегустаційна оцінка бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Слива домашня *Prunus domestica* L.**Заявка №** 23261001 **Назва сорту:** Октобер Сан 2 **Заявник (код):** 3208 **Власник сорту (код):** 3208**Дата пріоритету:** 23.05.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 24.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230894**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	до дуже сильної
2	Дерево: щільність крони	помірна	5	
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	5	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	великий	7	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	тупа	2	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	помітно відхилене	3	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	великий	7	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	відсутня	1	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	середнє	5	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
16	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
17	Листкова пластинка: відношення довжина /ширина	велике	7	
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	гострий	1	
20	Листкова пластинка: форма основи	гостра	1	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	пилчаста	2	
25	Черешок: за довжиною	середній	5	
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	велике	7	
28	Листок: нектарники	наявні	9	
29	Листок: розміщення нектарників	переважно на основі пластинки	1	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	велика	7	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	середній	5	
32	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
33	Квітконіжка: опушення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	не торкаються ні пелюсток, ні квітколожа	2	
35	Чашолисток: форма	еліптична	2	
36	Квітка: розташування пелюсток	дотичне	2	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: форма	округла	3	
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	великий	7	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	симетричний	1	
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	мілкий	3	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опушення верхівки	відсутнє	1	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	глибоке	7	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	жовте	4	
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: соковитість	висока	7	
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрошені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з червеного боку	еліптична	2	
57	Кісточка: розвиток кіля	середній	5	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	зерниста	1	
59	Кісточка: основа за шириною	вузька	3	
60	Кісточка: форма верхівки	тупа	2	
61	Час початку цвітіння	середній	5	
62	Час початку достигання плодів	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Сила росту: дуже сильна – 9. Група стиглості: пізня – 7. Урожайність, т/га – 11,0. Середній урожай з дерева, кг – 65,0. Середня маса плоду, г – 80,0. Середня маса кісточки, г – 0,3. Відокремлення кісточки від м'якоті: відокремлюється – 5. Вміст в плодах загального цукру, % – 14,0; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 7,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bonord.) – 7, червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmia rubra* Sacc.) – 7, іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плодожерка (*Laspeyresia (Grapholifha) fune-brana* Tr.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуна домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 23263001 Назва сорту: Градіска Заявник (код): 3205 Власник сорту (код): 3205

Дата пріоритету: 15.02.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідство про державну реєстрацію № 230953

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	помірна	5	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	розлогий	2	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричневе	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	сильне	7	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 1	3	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	помірне	2	
17	Черешок: за довжиною	середній	5	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	велика	7	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	світло-рожеве	3	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	середній	5	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	велике	7	
28	Плід: основна форма	циліндрична	4	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	дуже велика	9	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	пурпурово-червоний	4	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	тільки суцільний рум'янець	1	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	середній	5	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	глибока	7	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	глибоке	7	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	пізній	7	
57	Час споживчої стиглості	від пізнього до дуже пізнього	8	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 60,0. Середній урожай з дерева, кг – 30,0. Маса плоду (середня), г – 180,0. Маса плоду (максимальна), г – 280,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 8,0; загального цукру, % – 17,0; пектинових речовин, % – 1,5; сухих розчинних речовин, % – 16,0. Загальна кислотність, % – 0,4. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 7, парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 7, моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7, яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 3. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Група стиглості: осінній – 5. Напрямок використання: у свіжому вигляді – 1. Тривалість періоду зберігання, днів – 270. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 3 x 2. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 19263003 Назва сорту: Дебют **Заявник (код):** 2314

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.10.2023 **Патент № 230591**

Дата пріоритету: 22.10.2019

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: тип	колоноподібний	1	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	ознака не визначається	0	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	помірно-коричнєве	4	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	помірне	5	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване догори	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	пилчастий тип 2	4	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	середня	5	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	на одному рівні	2	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	середній	5	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	конічна	2	
29	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутня або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	відсутня або дуже мала	1	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	слабка	3	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем і крапчастий	6	
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	велика	7	
45	Плід: розмір сочевичок	великий	7	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5	
52	Плід: твердість м'якоті	середня	5	
53	Плід: забарвлення м'якоті	кремове	2	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	середній	5	
57	Час споживчої стиглості	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 34,3. Середній урожай з дерева, кг – 8,4. Маса плоду (середня), г – 155,0. Маса плоду (максимальна), г – 165,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 2,38; загального цукру, % – 6,36; пектинових речовин, % – 0,82; сухих розчинних речовин, % – 14,11. Загальна кислотність, % – 0,63. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 9, парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 9, моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 8, яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Група стиглості: ранньозимовий – 7. Напрямок використання: універсальний – 3. Тривалість періоду зберігання, днів – 120–150. Транспортувальність, бал (1–9) – 7. Схема садіння, м – 3,5 x 0,7. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8,5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.

ДЕКОРАТИВНІ ТА ЛІКАРСЬКІ

*Первоцвіт
Хризантема шовковицелиста
Чорнушка дамаська*



Вид: Первоцвіт *Primula L.*

Заявка № 23680003 Назва сорту: Веснянка Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230582

Дата пріоритету: 12.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230840

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (включаючи суцвіття)	низька	3	
2	Рослина: опушення	відсутнє, або дуже слабке	1	
3	Рослина: борошнистий наліт	відсутній	1	
4	Кореневище: щільність за наростанням	середнє	5	
5	Листок: наявність черешка	наявний	9	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Черешок: крилатість	наявна	9	
8	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: форма	оберненойцеподібна	6	
12	Листкова пластинка: форма основи	витагнута	5	
13	Листкова пластинка: за глибиною виїмки	цілокрая	1	
14	Листкова пластинка: форма краю	зубчаста	2	
15	Листкова пластинка: форма краю за глибиною	мілька	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
17	Листкова пластинка: закручування краю	наявне	9	
18	Листкова пластинка: ступінь зморшкуватості	помірна	5	
19	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
20	Листкова пластинка: глянуватість	відсутня	1	
21	Суцвіття: тип	поодинокі квітки	1	
22	Суцвіття (поодинокі квітки): положення відносно листків	виступає над листками	2	
23	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за діаметром	ознака не визначається	0	
25	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість квіток	ознака не визначається	0	
26	Поодинокі квітки: кількість на рослину	дуже велика	9	
27	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість на рослину	ознака не визначається	0	
28	Квітконос: положення	розлоге	5	
29	Квітконос: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	1	
30	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітка: наявність квітконіжки	ознака не визначається	0	
31	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітконіжка: за довжиною	ознака не визначається	0	
32	Квітка: діаметр віночка	великий	7	
33	Квітка: за типом	проста	1	
34	Чашечка: за формою	трубчаста	2	
35	Чашечка: за ступенем розсіченості	лопатева	3	
36	Чашечка: забарвлення	зелене	1	
37	Чашечка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
38	Чашолистик: за формою	ланцетний	1	
39	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: кількість пелюсток	мала	3	
40	Лише для сортів, що мають махровий тип квітки. Віночок: за щільністю пелюсток	ознака не визначається	0	
41	Віночок: форма відгину	блюцеподібна	1	
42	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: положення пластинки пелюстки одна відносно одної	перекриваються	3	
43	Віночок: форма пластинки пелюстки	округла	2	
44	Віночок: хвилястість пластинки пелюстки	наявна	9	
45	Віночок: форма краю пластинки пелюстки	з середньою виїмкою	3	
46	Віночок: хвилястість краю пластинки пелюстки	відсутній	1	
47	Віночок: основне забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	біле	1	
48	Віночок: основне забарвлення зовнішнього боку пластинки пелюстки (тільки для сортів в яких чітко відрізняється забарвлення зовнішнього і внутрішнього боку пластинки пелюстки)	ознака не визначається	0	
49	Віночок: бархатистість поверхні внутрішнього боку пластинки пелюстки	наявна	9	
50	Віночок: наявність вічка	наявне	9	
51	Віночок: вічко за розміром	мале	3	
52	Віночок: форма вічка	еліптична	3	
53	Віночок: забарвлення вічка	жовте	11	
54	Віночок: мазок у центрі вічка	відсутній	1	
55	Віночок: наявність ореолу	відсутній	1	
56	Віночок: розмір ореолу	ознака не визначається	0	
57	Віночок: форма краю ореолу	ознака не визначається	0	
58	Віночок: забарвлення ореолу	ознака не визначається	0	
59	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
60	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: вторинне забарвлення пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
61	Віночок: фестон	відсутній	1	
62	Віночок: забарвлення фестона	ознака не визначається	0	
63	Віночок: цятка	відсутня	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
64	Віночок: забарвлення цятки (цяток)	ознака не визначається	0	
65	Віночок: наявність облямівки	відсутня	1	
66	Віночок: забарвлення облямівки	ознака не визначається	0	
67	Рослина: за феноритмотипом	літньо-зимовозелена	2	
68	Рослина: час початку цвітіння	дуже ранній	1	
69	Рослина: наявність повторного цвітіння	відсутнє	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 94. Висота рослини, см – 14,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 360. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 8. Тривалість періоду цвітіння, діб – 32. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: відсутнє – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 5. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Первоцвіт *Primula L.*

Заявка № 23680002 Назва сорту: Лісова пісня Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230581

Дата пріоритету: 15.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230839

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (включаючи суцвіття)	низька	3	
2	Рослина: опушення	відсутнє, або дуже слабке	1	
3	Рослина: борошнистий наліт	відсутній	1	
4	Кореневище: щільність за наростанням	середнє	5	
5	Листок: наявність черешка	наявний	9	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Черешок: крилатість	наявна	9	
8	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
9	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: форма	оберненойцеподібна	6	
12	Листкова пластинка: форма основи	витагнута	5	
13	Листкова пластинка: за глибиною виїмки	цілокрая	1	
14	Листкова пластинка: форма краю	зубчаста	2	
15	Листкова пластинка: форма краю за глибиною	мілька	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
17	Листкова пластинка: закручування краю	відсутнє	1	
18	Листкова пластинка: ступінь зморшкуватості	слабка	3	
19	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
20	Листкова пластинка: глянуватість	відсутня	1	
21	Суцвіття: тип	поодинокі квітки	1	
22	Суцвіття (поодинокі квітки): положення відносно листків	виступає над листками	2	
23	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за діаметром	ознака не визначається	0	
25	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість квіток	ознака не визначається	0	
26	Поодинокі квітки: кількість на рослину	дуже велика	9	
27	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість на рослину	ознака не визначається	0	
28	Квітконос: положення	розлоге	5	
29	Квітконос: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабке	1	
30	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітка: наявність квітконіжки	ознака не визначається	0	
31	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітконіжка: за довжиною	ознака не визначається	0	
32	Квітка: діаметр віночка	великий	7	
33	Квітка: за типом	проста	1	
34	Чашечка: за формою	дзвоникоподібна	3	
35	Чашечка: за ступенем розсіченості	лопатева	3	
36	Чашечка: забарвлення	зелене	1	
37	Чашечка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
38	Чашолистик: за формою	ланцетний	1	
39	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: кількість пелюсток	мала	3	
40	Лише для сортів, що мають махровий тип квітки. Віночок: за щільністю пелюсток	ознака не визначається	0	
41	Віночок: форма відгину	блюдоподібна	1	
42	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: положення пластинки пелюстки одна відносно одної	сильно перекриваються	4	
43	Віночок: форма пластинки пелюстки	широкоокругла	3	
44	Віночок: хвилястість пластинки пелюстки	наявна	9	
45	Віночок: форма краю пластинки пелюстки	з середньою виїмкою	3	
46	Віночок: хвилястість краю пластинки пелюстки	відсутній	1	
47	Віночок: основне забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	фіолетове	28	
48	Віночок: основне забарвлення зовнішнього боку пластинки пелюстки (тільки для сортів в яких чітко відрізняється забарвлення зовнішнього і внутрішнього боку пластинки пелюстки)	ознака не визначається	0	
49	Віночок: бархатистість поверхні внутрішнього боку пластинки пелюстки	наявна	9	
50	Віночок: наявність вічка	наявне	9	
51	Віночок: вічко за розміром	мале	3	
52	Віночок: форма вічка	кутаста	4	
53	Віночок: забарвлення вічка	жовто-оранжеве	13	
54	Віночок: мазок у центрі вічка	наявний	9	
55	Віночок: наявність ореолу	наявний	9	
56	Віночок: розмір ореолу	малий	3	
57	Віночок: форма краю ореолу	чітка	1	
58	Віночок: забарвлення ореолу	світло-синьо-фіолетове	30	
59	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
60	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: вторинне забарвлення пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
61	Віночок: фестон	відсутній	1	
62	Віночок: забарвлення фестона	ознака не визначається	0	
63	Віночок: цятка	наявна одна	2	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
64	Віночок: забарвлення цятки (цятки)	світло-синьо-фіолетове	30	
65	Віночок: наявність облямівки	відсутня	1	
66	Віночок: забарвлення облямівки	ознака не визначається	0	
67	Рослина: за феноритмотипом	літньо-зимовозелена	2	
68	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
69	Рослина: наявність повторного цвітіння	відсутнє	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 96. Висота рослини, см – 14,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 360. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 21. Тривалість періоду цвітіння, діб – 34. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: відсутнє – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 6. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Первоцвіт *Primula L.*

Заявка № 23680001 Назва сорту: Чумацький Шлях Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 Патент № 230580

Дата пріоритету: 12.05.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230838

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою (включаючи суцвіття)	середня	5	
2	Рослина: опушення	відсутнє, або дуже слабке	1	
3	Рослина: борошнистий наліт	відсутній	1	
4	Кореневище: щільність за наростанням	середнє	5	
5	Листок: наявність черешка	наявний	9	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Черешок: крилатість	наявна	9	
8	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня, або дуже слабка	1	
9	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
10	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
11	Листкова пластинка: форма	яйцеподібна	5	
12	Листкова пластинка: форма основи	витягнута	5	
13	Листкова пластинка: за глибиною виїмки	цілокрая	1	
14	Листкова пластинка: форма краю	зубчаста	2	
15	Листкова пластинка: форма краю за глибиною	мілька	3	
16	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
17	Листкова пластинка: закручування краю	наявне	9	
18	Листкова пластинка: ступінь зморшкуватості	слабка	3	
19	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
20	Листкова пластинка: глянуватість	відсутня	1	
21	Суцвіття: тип	однобічний зонтик	5	
22	Суцвіття (поодинокі квітки): положення відносно листків	високо підняте над листками	3	
23	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
24	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: за діаметром	середнє	5	
25	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість квіток	мала	3	
26	Поодинокі квітки: кількість на рослину	ознака не визначається	0	
27	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Суцвіття: кількість на рослину	дуже велика	9	
28	Квітконос: положення	розлоге	5	
29	Квітконос: інтенсивність антоціанового забарвлення слабке	відсутнє або дуже слабке	1	
30	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітка: наявність квітконіжки	наявна	9	
31	Тільки для сортів, що мають суцвіття. Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
32	Квітка: діаметр віночка	середній	5	
33	Квітка: за типом	проста	1	
34	Чашечка: за формою	трубчаста	2	
35	Чашечка: за ступенем розсіченості	зубчаста	2	
36	Чашечка: забарвлення	зелене	1	
37	Чашечка: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
38	Чашолистик: за формою	ланцетний	1	
39	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: кількість пелюсток	мала	3	
40	Лише для сортів, що мають махровий тип квітки. Віночок: за щільністю пелюсток	ознака не визначається	0	
41	Віночок: форма відгину	блюдоподібна	1	
42	Лише для сортів, що мають простий тип квітки. Віночок: положення пластинки пелюстки одна відносно одної	дотичне	2	
43	Віночок: форма пластинки пелюстки	оберненояйцеподібна	5	
44	Віночок: хвилястість пластинки пелюстки	відсутня	1	
45	Віночок: форма краю пластинки пелюстки	з середньою виїмкою	3	
46	Віночок: хвилястість краю пластинки пелюстки	відсутній	1	
47	Віночок: основне забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	жовто-зелене	5	
48	Віночок: основне забарвлення зовнішнього боку пластинки пелюстки (тільки для сортів в яких чітко відрізняється забарвлення зовнішнього і внутрішнього боку пластинки пелюстки)	ознака не визначається	0	
49	Віночок: бархатистість поверхні внутрішнього боку пластинки пелюстки	відсутня	1	
50	Віночок: наявність вічка	наявне	9	
51	Віночок: вічко за розміром	дуже мале	1	
52	Віночок: форма вічка	кругла	5	
53	Віночок: забарвлення вічка	жовте	11	
54	Віночок: мазок у центрі вічка	відсутній	1	
55	Віночок: наявність ореолу	відсутній	1	
56	Віночок: розмір ореолу	ознака не визначається	0	
57	Віночок: форма краю ореолу	ознака не визначається	0	
58	Віночок: забарвлення ореолу	ознака не визначається	0	
59	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: поширення вторинного забарвлення внутрішнього боку пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
60	Лише для сортів з двома кольорами пластинки пелюстки. Віночок: вторинне забарвлення пластинки пелюстки	ознака не визначається	0	
61	Віночок: фестон	відсутній	1	
62	Віночок: забарвлення фестона	ознака не визначається	0	
63	Віночок: цятка	відсутня	1	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
64	Віночок: забарвлення цятки (цятки)	ознака не визначається	0	
65	Віночок: наявність облямівки	відсутня	1	
66	Віночок: забарвлення облямівки	ознака не визначається	0	
67	Рослина: за феноритмотипом	літньо-зимовозелена	2	
68	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
69	Рослина: наявність повторного цвітіння	відсутнє	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Декоративність, бал (11–99) – 94. Висота рослини, см – 18,0. Тривалість періоду вегетації, діб – 360. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 22. Тривалість періоду цвітіння, діб – 22. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації: відсутнє – 1. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

Вид: Хризантема шовковицелиста *Chrysanthemum x morifolium* Ramat

Заявка № 22438004 Назва сорту: Коралове намисто Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата пріоритету: 05.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230950

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напіввертикальна	2	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузнення	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	мале	3	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	розходяться	1	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	глибокі	7	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	середня	5	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	темно-пурпурово-червоне	24	
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	велика	7	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	велика	7	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	висхідне	3	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілків	два	2	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко увігнутий	5	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	на всій пелюстці	8	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	сплющений	3	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	пряма	2	
53	Язичкова квітка: поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка: поздовжня вісь: ступінь вигину	слабий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	загнута всередину	1	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	середня	5	
58	Язичкова квітка: за довжиною	довга	7	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	вузька	3	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	велике	7	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	виїмчаста	4	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	темно-пурпурово-червоне	24	
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів)	темно-пурпурово-червоне	24	
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	малий	3	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	малий	3	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	кулоподібний	5	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	жовта	5	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	відсутня	1	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	жовта	5	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31) Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вироснування за контрольованої тривалості дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 65,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 70. Діаметр суцвіття (кошика), см – 6,0. Тривалість цвітіння рослини, дів – 35. Декоративність, бал (11–99) – 90. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 12. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 9, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (*Aphididae*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Хризантема шовковицелиста *Chrysanthemum x morifolium* Ramat

Заявка № 22438005 Назва сорту: Прометей Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата пріоритету: 05.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230951

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	вертикальна	1	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузнення	нещільна	3	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	широкий	7	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	мале	3	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	коротка	3	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	мілке	3	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	середня	5	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	мала	3	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	червоне	21	
30	Кошик: тип	напівповний	3	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ромашкоподібний	1	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	середня	5	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	середня	5	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	ознака не визначається	0	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	язичковий	1	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	горизонтальне	5	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілків	два	2	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	довга	7	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко увігнутий	5	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко скручені доверху	3	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна половина	2	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	ознака не визначається	0	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	вигнута	3	
53	Язичкова квітка: поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка: поздовжня вісь: ступінь вигину	помірний	5	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	загнута всередину	1	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	середня	5	
58	Язичкова квітка: за довжиною	середня	5	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	округла	2	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	оранжево-коричнє	45	
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів)	оранжево-коричнє	45	
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	середній	5	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	середній	5	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	кулоподібний	5	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пиляків	жовта	5	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пиляків	відсутня	1	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пиляків	жовта	5	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31) Диск: забарвлення під час розкриття пиляків	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вироснування за контрольованою тривалістю дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 60,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 45. Діаметр суцвіття (кошика), см – 6,0. Тривалість цвітіння рослини, дів – 45. Декоративність, бал (11–99) – 90. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 12. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 9, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (*Aphididae*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Хризантема шовковицелиста *Chrysanthemum x morifolium* Ramat

Заявка № 22438006 Назва сорту: Рожева діадема Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата пріоритету: 05.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230952

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: тип	кущовий	2	
3	Лише для сортів кущового типу. Рослина: форма	напіввертикальна	2	
4	Лише для сортів кущового типу. Рослина: щільність галузнення	помірна	5	
5	Стебло: забарвлення	зелене з пурпуровим / коричневим відтінком	2	
6	Прилисток: розмір	малий	3	
7	Черешок: положення	напіввертикальне	3	
8	Черешок: довжина відносно довжини листка	середня	3	
9	Листок: за довжиною (разом з черешком)	середній	5	
10	Листок: за шириною	середній	5	
11	Листок: співвідношення довжина/ширина	мале	3	
12	Листок: довжина кінцевої частки відносно довжини листка	середня	5	
13	Листок: глибина найнижчого бічного заглиблення	середнє	5	
14	Листок: форма країв найнижчого бічного заглиблення	паралельні	2	
15	Листок: переважаюча форма основи	тупа	2	
16	Листок: глянуватість верхнього боку	відсутня або дуже слабка	1	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	помірна	5	
18	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: вираженість світлого краю (верхній бік)	ознака не визначається	0	
19	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: опушення нижнього боку	ознака не визначається	0	
20	За винятком сортів <i>Chrysanthemum x morifolium</i> . Листок: забарвлення нижнього боку	ознака не визначається	0	
21	Край листка: кількість надрізів	мала	3	
22	Край листка: надрізи за глибиною	мілкі	3	
23	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: форма	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття (кошик): ширина найширшого місця	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: кут між первинним бічним пагоном і стеблом	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Суцвіття: положення бічних кошиків	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів некущового типу (див. оз. 2). Кількість кошиків на стеблі	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів кущового типу (див. оз. 2). Загальна кількість кошиків на рослині	середня	5	
29	Пуп'янок: забарвлення зовнішнього боку напередодні розкриття	оранжево-рожеве	15	
30	Кошик: тип	повний	5	
31	За винятком повних і ромашкоподібних повних сортів. Диск: тип	ознака не визначається	0	
32	Кошик: діаметр (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
33	Кошик: діаметр (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
34	Кошик: за висотою (дрібноквіткові рослини)	середній	5	
35	Кошик: за висотою (великоквіткові рослини)	ознака не визначається	0	
36	Квітконіжка: за довжиною	середня	5	
37	Лише для напівповних і ромашкоподібних повних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість рядків язичкових квіток (пелюсток)	ознака не визначається	0	
38	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Кошик: кількість язичкових квіток (див. оз. 30)	ознака не визначається	0	
39	Лише для ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Кошик: щільність язичкових квіток	помірна	5	
40	Кошик: кількість типів язичкових квіток	один	1	
41	Кошик: переважаючий тип язичкових квіток	лопатоподібний	3	
42	Кошик: вторинний тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
43	Кошик: додатковий тип язичкових квіток	ознака не визначається	0	
44	Лише для простих і напівповних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: положення базальної частини	ознака не визначається	0	
45	Язичкова квітка: характер зовнішньої поверхні	ребриста	2	
46	Язичкова квітка: кількість кілів	більше двох	3	
47	Язичкова квітка: за довжиною трубки віночка	середня	5	
48	Язичкова квітка: профіль у поперечному перерізі в найширшому місці (не трубчасті квітки)	слабко вигнутий	7	
49	Язичкова квітка: загортання країв (не трубчасті квітки)	слабко закручені донизу	5	
50	Язичкова квітка: розміщення загорнутих країв (не трубчасті квітки)	базальна половина	2	
51	Язичкова квітка: профіль трубки (лійкоподібний, лопатоподібний, трубчастий типи квіток)	сплющений	3	
52	Язичкова квітка: характер поздовжньої осі	загнута всередину	1	
53	Язичкова квітка: поздовжня вісь: непряма частина	дистальна четвертина	3	
54	Язичкова квітка: поздовжня вісь: ступінь вигину	слабкий	3	
55	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняються від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
56	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	ознака не визначається	0	
57	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів. Язичкова квітка: поздовжня вісь внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка): непряма частина (непряма поздовжня вісь)	середня	5	
58	Язичкова квітка: за довжиною	коротка	3	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
59	Язичкова квітка: за шириною	середня	5	
60	Язичкова квітка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
61	Язичкова квітка: форма кінчика	сосочкоподібна	6	
62	Язичкова квітка: кількість кольорів забарвлення внутрішнього боку	один	1	
63	Язичкова квітка: основне забарвлення внутрішнього боку	світло-синьо-рожеве	18	
64	Язичкова квітка: вторинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
65	Язичкова квітка: розподіл вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
66	Язичкова квітка: рисунок вторинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
67	Язичкова квітка: третинне забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
68	Язичкова квітка: розподіл третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
69	Язичкова квітка: рисунок третинного забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
70	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку в порівнянні з внутрішнім	однакове	1	
71	Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку, якщо воно чітко відрізняється від внутрішнього	ознака не визначається	0	
72	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення внутрішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів) (якщо відрізняється від зовнішнього рядка)	ознака не визначається	0	
73	Лише для напівповних, ромашкоподібних повних і повних сортів (див. оз. 30). Язичкова квітка: забарвлення зовнішнього боку внутрішнього(их) рядка(ів)	світло-синьо-рожеве	18	
74	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
75	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30) анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: діаметр	ознака не визначається	0	
76	Лише для неповних і напівповних сортів (див. оз. 30). Диск: діаметр відносно діаметра кошика	ознака не визначається	0	
77	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: профіль поперечного перерізу	ознака не визначається	0	
78	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
79	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: темна пляма в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
80	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: розмір темної плями в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
81	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення темної плями в центрі до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
82	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: забарвлення до розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
83	Лише для сортів ромашкоподібного типу (див. оз. 31). Диск: група забарвлення під час розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
84	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31) Диск: забарвлення під час розкриття пелюсток	ознака не визначається	0	
85	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: тип	ознака не визначається	0	
86	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: за довжиною	ознака не визначається	0	
87	Лише для сортів анемоноподібного типу (див. оз. 31). Диск: квітка: забарвлення	ознака не визначається	0	
88	Група реакції (вищівування за контрольованою тривалістю дня)	ознака не визначається	0	
89	Лише для вирощування без контролю тривалості дня: природний час цвітіння	ранній	3	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Висота рослини, см – 50,0. Кількість суцвіть на рослині, шт. – 80. Діаметр суцвіття (кошика), см – 6,0. Тривалість цвітіння рослини, дб – 45. Декоративність, бал (11–99) – 90,0. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 15,0. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): справжня борошниста роса (*Oidium chrysanthemum* Rab.) – 9, іржа (*Puccinia chrysanthemi* Roze.) – 9, плямистість листків (*Septoria chrysanthemi* All.) – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): павутинний кліщик (*Tetranychus urticae* Koch.) – 8, попелиця (*Aphididae*) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Вид: Чорнушка дамаська *Nigella damascena* L.

Заявка № 22548001 Назва сорту: Різдва зірочка **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230585**

Дата пріоритету: 20.12.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230843

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сходи: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Сходи: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: за висотою	середня	5	
4	Рослина: загальна кількість квіток	велика	7	
5	Рослина: галуження	сильне	7	
6	Стебло: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Стебло: забарвлення	зелене	2	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листок покривала: за довжиною	середній	5	
10	Листок покривала: за шириною	середній	5	
11	Листок покривала: антоціанове забарвлення нижнього боку	наявне	9	
12	Квітка: за діаметром	середня	5	
13	Чашолистки: забарвлення	блакитне	2	
14	Чашолистки: кількість рядів	велика	7	
15	Чашолистки: за довжиною	середні	5	
16	Чашолистки: за щільністю розміщення (для однорядових сортів)	ознака не визначається	0	
17	Чашолистки: за цілісністю у верхнього ряду	роздільні	2	
18	Плід: діаметр	середній	5	
19	Плід: за довжиною	середній	5	
20	Плід: за формою	овальновидовжений	3	
21	Плід: основне забарвлення	білувате	1	
22	Плід: забарвлення ребер	фіолетове	2	
23	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
24	Час досягання насіння	середній	5	
25	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Висота рослин, см – 60,0. Тривалість періоду від сходів до цвітіння, діб – 35,0. Тривалість періоду цвітіння, діб – 60,0. Декоративність, бал (11–99) – 99. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до обсіпання, бал (1–9) – 5. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.

ЛІСОВІ

Тополя



Вид: Тополя *Populus L.*

Заявка № 22086001 Назва сорту: Макс-4 Заявник (код): 2888 Власник сорту (код): 2888

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230911

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: зовнішній вигляд (час: осінь 2-го року)	грубий	7	
2	Стовбур: форма	пряма	1	
3	Стовбур: поперечний переріз на 3/4 висоти (в центрі міжвузля)	округлий	1	
4	Стовбур: жолобки між кутами	ознака не визначається	0	
5	Стовбур: забарвлення з-під сонячного боку на 3/4 висоти	світло-зелене	2	
6	Стовбур: забарвлення з тіньового боку на 3/4 висоти	сіро-зелене	3	
7	Стовбур: поперечний переріз на 1/2 висоти	округлий	1	
8	Стовбур: забарвлення з-під сонячного боку на 1/2 висоти	сіро-зелене	3	
9	Стовбур: забарвлення з тіньового боку на 1/2 висоти	сіро-зелене	3	
10	Стовбур: волокнистість на 3/4 висоти	відсутня	1	
11	Стовбур: опушення на 3/4 висоти	слабке	3	
12	Сочевички: форма	еліптична	2	
13	Сочевички: поширення	рівномірне	1	
14	Гілочки: загальна кількість завдовжки понад 5 см (час: восени 1-го року)	відсутні або дуже мала	1	
15	Гілка: кут між першими 5 см гілки і стовбуром	гострий	2	
16	Гілка: положення	вигнута догори	1	
17	Веgetативна брунька: за довжиною	середня	5	
18	Веgetативна брунька: форма	вузькоюяцеподібна	1	
19	Веgetативна брунька: забарвлення	коричнєве	4	
20	Веgetативна брунька: форма верхівки	гостра	2	
21	Веgetативна брунька: положення відносно стебла	прилегле	1	
22	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку під час розпускання бруньок (від 4 до 5 стадії розпускання бруньок; час: навесні 2-го року)	зелене	4	
23	Листкова пластинка: інтенсивність забарвлення верхнього боку під час розпускання бруньок (час: як для 22)	сильна	7	
24	Листкова пластинка: положення відносно пагона	висхідне	1	
25	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
26	Листкова пластинка: максимальна ширина	середня	5	
27	Листкова пластинка: відношення довжини головної жилки до максимальної ширини листка	середнє	5	
28	Листкова пластинка: антоціанове забарвлення головної жилки (з верхнього боку)	відсутнє	1	
29	Листкова пластинка: поширення антоціанового забарвлення головної жилки (як для 28 ознаки)	ознака не визначається	0	
30	Листкова пластинка: інтенсивність антоціанового забарвлення головної жилки (як для 28 ознаки)	ознака не визначається	0	
31	Листкова пластинка: кут між головною жилкою і вторинною бічною жилкою	малий	3	
32	Листкова пластинка: опушення верхнього боку	тільки на жилках	2	
33	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	тільки на жилках	2	
34	Листкова пластинка: інтенсивність опушення нижнього боку	помірна	5	
35	Листкова пластинка: профіль поверхні	зігнутий до кінчика	2	
36	Листкова пластинка: здуття між жилками	слабке	3	
37	Листкова пластинка: загальна форма основи	клиноподібна опукла	1	
38	Листкова пластинка: форма місця прикріплення до черешка	ширококлиноподібна	3	
39	Листкова пластинка: форма верхівки	широкогостра	3	
40	Листкова пластинка: розсіченість на парні частки	відсутня	1	
41	Листкова пластинка: відмінність верхньої пари часток	ознака не визначається	0	
42	Листкова пластинка: відмінність середньої пари часток	ознака не визначається	0	
43	Листкова пластинка: відмінність нижньої пари часток	ознака не визначається	0	
44	Листкова пластинка: форма верхівок часток	ознака не визначається	0	
45	Листкова пластинка: хвилястість країв	відсутня	1	
46	Листкова пластинка: амплітуда хвилястості краю	ознака не визначається	0	
47	Листкова пластинка: хвиля країв за довжиною	ознака не визначається	0	
48	Листкова пластинка: залози на основі листка	відсутні	1	
49	Черешок: за довжиною	середній	5	
50	Черешок: відношення довжини до довжини головної жилки	середнє	5	
51	Черешок: форма поперечного перерізу (посередині)	еліптична	2	
52	Черешок: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
53	Черешок: поширення опушення	лише на основі	1	
54	Черешок: забарвлення з-під сонячного боку	світло-зелене	2	
55	Прилистки: час тримання на черешку	середній	5	
56	Прилистки: положення	притиснуте	1	
57	Верхівкова брунька: час появи зеленої верхівки (стадія 2 розпускання бруньок; час: як для 22 ознаки)	від дуже раннього до раннього	2	
58	Рослина: час припинення росту головного стовбура (час: як для 14 ознаки)	пізній	7	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність сировини, т/га – 20,0. Вихід сухої речовини, т/га – 10,0. Термін використання плантації, років – 20,0. Періодичність збирання сировини, разів – 6. Вихід енергії, ГДж/га – 180,0. Енергетичні витрати на виробництво за рік, ГДж/га – 20,0. Теплоємність пального, МДж/кг – 8,0. Зольність пального, % – 2,0.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.

Інші відомості

Other notifications

Інші відомості Міністерства аграрної політики та продовольства України

Other notifications of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1745 від 02.10.2023 «Про затвердження Методики визначення відповідності сортів сої культурної (*Glycine max* (L.) Merr.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів сої культурної (*Glycine max* (L.) Merr.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності (<https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/viznachennya-vidpovidnosti-sortiv-soi-kulturnoi-glycine-max-l-merr-kriteriyam-vidminnosti-odnoridnosti-ta-stabilnosti.pdf>).

У Методиці проведення експертизи сортів рослин групи олійних на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547 (із змінами):

у розділі «Зміст Методики проведення експертизи на ВОС (Олійні)» слова та цифри «12. Соя культурна 145» виключено;

розділ «Методика проведення експертизи сортів сої культурної (*Glycine max* (L.) Merrill) на відмінність, однорідність і стабільність» виключено.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1747 від 02.10.2023 «Про затвердження Методики визначення відповідності сортів конюшини лучної (червоної) (*Trifolium pratense* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів конюшини лучної (червоної) (*Trifolium pratense* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності (<https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/viznachennya-vidpovidnosti-sortiv-konyushini-luchnoi-chervonoj-trifolium-pratense-l-kriteriyam-vidminnosti-odnoridnosti-ta-stabilnosti.pdf>).

У Методиці проведення експертизи сортів рослин групи кормових та коренеплідних на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547 (із змінами):

у розділі «Зміст Методики проведення експертизи на ВОС» слова та цифри «31. Конюшина лучна (червона) 321» виключено;

розділ «Методика проведення експертизи сортів конюшини лучної (червоної) (*Trifolium pratense* L.) на відмінність, однорідність та стабільність» виключено.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1754 від 04.10.2023

«Про затвердження Методики визначення відповідності сортів калини звичайної (*Viburnum opulus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів калини звичайної (*Viburnum opulus* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності (<https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/viznachennya-vidpovidnosti-sortiv-kalini-zvichaynoi-viburnum-opulus-l-kriteriyam-vidminnosti-odnoridnosti-ta-stabilnosti.pdf>).

У Методиці проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних та винограду на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547 (із змінами):

у розділі «Зміст Методики проведення експертизи на ВОС» слова та цифри «24. Калина звичайна 552» виключено;

розділ «Методика проведення експертизи сортів калини звичайної (*Viburnum opulus* L.) на відмінність, однорідність і стабільність» виключено.

Визнано таким, що втратив чинність наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 вересня 2023 року № 1621 «Про внесення зміни до Методики проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, горіхоплідних та винограду на відмінність, однорідність і стабільність».

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 1772 від 06.10.2023 «Про затвердження Методики визначення відповідності сортів картоплі (*Solanum tuberosum* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності» затверджено Методику визначення відповідності сортів картоплі (*Solanum tuberosum* L.) критеріям відмінності, однорідності та стабільності (<https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/viznachennya-vidpovidnosti-sortiv-kartopli-solanum-tuberosum-l-kriteriyam-vidminnosti-odnoridnosti-ta-stabilnosti.pdf>).

У Методиці проведення експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на відмінність, однорідність і стабільність, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 грудня 2016 року № 547 (із змінами):

у назві Методики проведення експертизи сортів рослин групи овочевих, картоплі та грибів на відмінність, однорідність і стабільність знак та слово « картоплі» виключено;

розділ «Методика проведення експертизи сортів картоплі (*Solanum tuberosum* L.) на відмінність, однорідність та стабільність» виключено.

Інші відомості Українського інституту експертизи сортів рослин

Other notifications of the Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Робота Методичної комісії

Методична комісія Українського інституту експертизи сортів рослин провела засідання **27 жовтня 2023 року**, в якому взяли участь: Присяжнюк Л. М., к. с.-г. н., с. д.; Лікар С. П.; Костенко Н. П., к. с.-г. н.; Хоменко Т. М., доцент, к. с.-г. н.; Гринів С. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Михайлик С. М., к. с.-г. н.; Цизь О. М., доцент, к. с.-г. н.; Рубцова О. Л., д. б. н.; Захарчук О. В., д. е. н., професор.; Башкірова Н. В., доцент, к. б. н.; Бобось І. М., доцент, к. с.-г. н.; Григор'єв В. М., к. с.-г. н., с. н. с.; Король Л. В., к. с.-г. н.; Кондратенко Т. Є., д. с.-г. н.; Бугайов В. Д., к. с.-г. н.; Щербина О. З., к. с.-г. н.; Байдюк Т. О., к. с.-г. н.

за Порядком денним:

1. Розгляд та схвалення Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні для вишні звичайної (підщепи) (*Prunus cerasus* L.).

2. Розгляд та схвалення Показників для визначення придатності сорту для поширення в Україні для вишневого гібриду вишні звичайної × вишні сивуватої (підщепи) (Hybrids between *Prunus cerasus* × *Prunus canescens*).

Схвалено:

1) Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні для вишні звичайної (підщепи) (*Prunus cerasus* L.).

2) Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні для вишневого гібриду вишні звичайної × вишні сивуватої (підщепи) (Hybrids between *Prunus cerasus* × *Prunus canescens*).

Перелік заявників, підтримувачів сортів, власників майнового права на поширення сорту, володільців патенту

List of applicants, supporters of varieties, owners of the property right to spread the variety, patent holders

Код Code	Назва Name	Адреса Address
273	Мей Агро Тохумсулук Санаї ве Тісарет А.С. May Agro Tohumculuk Sanayi ve Ticaret A.S.	Саманлі Махалесі Ідітлер Кадесі № 28 Ілдірім 16280 Бурса, Туреччина Samanli Mahallesi Yigitler Caddesi No:28 Yildirim 16280 Bursa, Turkey
348	Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України Natsionalnyi botanichnyi sad im. M. M. Hryshka Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Тімірязєвська, 1, м. Київ, 01014 vul. Timiriazivska, 1, m. Kyiv, 01014
355	Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України Instytut fiziologii roslin i henetyky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy	вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022 vul. Vasytkivska, 31/17, m. Kyiv, 03022
753	Нунемс Б.В. Nunhems B.V.	P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands P.O. Box 4005,6080 AA Haelen, The Netherlands
793	ЛІМАГРЕЙН ЮРОП Limagrain Europe	rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire rue Henri Mondor Biopole Clermont-Limagne 63360 Saint-Beauzire
796	САС Флорімон Денпре Вев є Фіс SAS Florimond Desprez Veuve et Fils	Б.П. 41. Капель, Темплев, Франція, 59242 B.P. 41 Cappelle, Templeuve, France, 59242
807	Дойче Заатфедерелунг АГ Deutsche Saatveredelung AG	Вайсенбургер штр. 5, 59557 Ліпштадт, Німеччина Weissenburger Str.5, 59557 Lippstadt, Germany
884	Кутновська Годовла Бурака Цукрового Сп. з о.о. Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.	вул. Чопіна 25, 99-300 Кутно, Польща Ul. Chopina 25, 99-300 Kutno, Poland
912	Норддойче Пфланцензucht Ганс-Георг Лембке КГ Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	24363, Хохенліт, Хольцес, Німеччина 24363 Hohenlieth, Holtsee, Germany
971	Фельдзаатен Фройденбергер ГмбХ & Ко. КГ Feldsaaten Freudenberger GmbH & Co. KG	47800 Крефельд-Бокум, Магдебург штр., 2, Гевербегебіт Бокум-Норд, Німеччина 47800 Krefeld-Bockum, Magdeburger Str. 2, Gewerbegebiet Bockum-Nord, Germany
1050	Сингента Сідз Б. В. Syngenta Seeds B. V.	Вештайнде 62/Постбус 2, НЛ - 1600 АА Енкхаїзен, Голландія Westeinde 62/Postbus 2, NL - 1600 AA Enkhuizen, The Netherlands
1163	Товариство з обмеженою відповідальністю «Свитязь» Tovarystvo z обмеженою відповідальністю «Svytiyaz»	Вул. Городоцька 174, м. Львів, 79022 Vul. Horodotska 174, m. Lviv, 79022
1435	Солтіс Soltis	Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France Domaine de Sandreau, F-31700 Mondonville - France
1498	Пробстдорфер Заатцухт Гез.м.б.Х. енд Ко КГ Probstdorfer Saatucht Ges.m.b.H & Co KG	Parkring 12, 1010 Vienna, Austria Parkring 12, 1010 Vienna, Austria
1564	Заатцухт Донау Гес.м.б.Х. & КоКГ Saatucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG	Заатцухтштрассе 11, 2301 Пробстдорф Saatuchtstrasse 11, 2301 Probstdorf
1571	Уманський національний університет садівництва Umanskyi natsionalnyi universytet sadivnytstva	вул. Інститутська, 1, м. Умань, Черкаська обл., 20300 vul. Instytutska, 1, m. Uman, Cherkaska obl., 20300
1581	Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України Instytut roslinnytstva im. V.IA. IUr'ieva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	пр. Московський, 142, м. Харків, 61128 pr. Moskovskiy, 142, m. Kharkiv, 61128
1589	Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Myronivskiy instytut pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл, 08853 s. Tsentralne, Myronivskiy r-n, Kyivska obl, 08853
1591	Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннізнавства та сортовищення Selektsiino-henetychnyi instytut - Natsionalnyi tsentr nasinnieznavstva ta sortovyvchennia	Овідіопольська дорога, 3, м. Одеса, 65036 Ovidiopska doroha, 3, m. Odesa, 65036
1601	Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України Instytut sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	м. Київ, смт Новосілки, вул. Садова, 23, 03027 m. Kyiv, smt Novosilky, vul. Sadova, 23, 03027
1626	Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut zemlerobstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy»	вул. Машинобудівників 2-б, смт Чабани, Фастівський р-н, Київська обл., 08162 vul. Mashynobudivnykiv 2-b, smt Chabany, Fastivskiy r-n, Kyivska obl., 08162
1635	Білоцерківська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Bilotserkivska doslidno-selektsiina stantsiia Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovyykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Центральна, 1, с. Мала Вільшанка, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09176 vul. Tsentralna, 1, s. Mala Vilshanka, Bilotserkivskiy r-n, Kyivska obl., 09176
1652	Агріко Б.В. AGRICO B.V.	P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands P.O. Box 70 8300 Emmeloord, The Netherlands
1658	Інститут сільськогосподарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Instytut silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	с. Оброшине, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 s. Obroshyne, Pustomytivskiy r-n, Lvivska obl., 81115
1669	Інститут кормів та сільськогосподарства Поділля Національної академії аграрних наук України Instytut kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	21100, м. Вінниця, проспект Юності, 16 21100, m. Vinnytsia, prospekt IUnosti, 16

Код Code	Назва Name	Адреса Address
1688	Піонер Оверсіз Корпорейшн Pioneer Overseas Corporation	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1690	Піонер Хай-Бред Інтернешнл, Інк. Pioneer Hi-Bred International, Inc.	7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA 7100 NW 62nd Avenue, Johnston, Iowa, USA
1730	Рійк Цваан Заадтеелт ен Заадхандел Б.В. RIJK ZWAAN Zaadteelt en Zaadhandel B.V.	Бурхемеестер Крезеелаан 40, НЛ-2678 КХ, Де Лір, Нідерланди Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier, the Netherlands
1751	Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України Instytut bioenergetycznych kultur i tsukrovykh buriakiv Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25 03141, m. Kyiv, vul. Klinichna, 25
1781	Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України Instytut ovochivnytstva i bashtantnytsstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Інститутська, 1, селище Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл., 62478 vul. Instytutska, 1, selyshche Seleksiinne, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl., 62478
1783	РАЖТ 2н RAGT 2n	Рю Емил Сингла - Сіте де Бурран, БП 3336, 12033 Родез Седекс 9, Франція Rue Emile Singla - Site de Bourran, BP3336, 12033 Rodez Cedex 9, France
1797	Секобра речерчес С.А.С. Secobra recherches S.A.S.	Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France Centre De Bois Henry, 78580 Maule, France
1833	САКАТА ВЕДЖЕТЕБЛЗ ЄУРОП С.А.С. SAKATA VEGETABLES EUROPE S.A.S.	Домеїн де Саблас, вул. Мулін, Ф-30620, Франція Domaine de Sablas Rue du Moulin, 30620 Uchaud, France
1852	Монсанта Веджітбл ІП Менеджмент Б. В. Monsanto Vegetable IP Management B. V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
1900	Хюбро Заатцухт ГмбХ і Ко. КГ Hybro Saatucht GmbH & Co. KG	Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany Kleptow Nr. 53, 17291 Schenkenberg: Germany
1943	Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України Poltavska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia imeni M.I. Vavylova Instytutu svynarstva i ahropromysloвого vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Шведська, 86, м Полтава, 36014 vul. Shvedska, 86, m Poltava, 36014
1946	Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України Ternopil'ska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu kormiv ta silskoho hospodarstva Podillia Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль 46027 vul. Troleibusna, 12, m. Ternopil 46027
1948	К.І.В. Консорціо Італіано Віваісті Сос'єта консортіле а р.л. C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Societa consortile a r.l.	Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY Loc. Boattone- Stat. Romea Km. 116, 44020 S. Giuseppe di Comacchio (FE), ITALY
1960	ван Ваверен Заатен ГмбХ van Waveren Saaten GmbH	Rodeweg 20 37081 Gottingen Rodeweg 20 37081 Gottingen
1985	НУСІД ЄУРОП ЛТД. NUSEED EUROPE LTD.	5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way 5 TG, Manchester, United Kindom, 3000 Aviator Way
1990	Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України Nosivska selektsiino-doslidna stantsiia Myronivskoho instytutu pshenytsi imeni V.M. Remesla Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Миру, 1, с. Дослідне, Носівського району, Чернігівської області, 17131 vul. Myru, 1, s. Doslidne, Nosivskoho raionu, Chernihivskoi oblasti, 17131
1997	МОРАВОСІД ЦЗ а.с. MORAVOSEED CZ a.s.	Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic Muslov 1701/4, 692 01 Mikulov, Czech Republic
2011	ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен SAATBAU LINZ eGen	Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria Schirmerstrasse, 19, 4060 Leonding, Austria
2020	ХМ.КЛОЗ HM.CLAUSE	Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France Rue Louis Saillant ZI LA MOTTE - B.P. 83, 26800, PORTES-LES-VALENCE CEDEX, France
2070	ХАЗЕРА СІДЗ ЛТД HAZERA SEEDS LTD	79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim 79837, Israel, Berurim M.P. Shikmim
2075	Прилуцька дослідна станція Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Prylutska doslidna stantsiia Instytutu sadivnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Вавілова, 16, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17511 vul. Vavilova, 16, m. Pryluky, Chernihivska obl., 17511
2076	Селген, а.с. SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Czech Republic
2086	Хазера Сідз Б.В. Hazera Seeds B.V.	Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands Schanseind 27, 4921 PM Made, The Netherlands
2087	ХМ.КЛОЗ, ІНК HM.CLAUSE, INC	555 Codoni Avenue, Modesto, California 95357, USA 555 Codoni Avenue, Modesto, California 95357, USA
2088	ЕСАСЕМ СПА ESASEM SPA	Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY Via G. Marconi, 56, CASALEONE, ITALY
2258	П.Х. ПЕТЕРСЕН Заатцухт Лундсгаард ГмбХ P.H. PETERSEN Saatucht Lundsgaard GmbH	Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany Streichmuehler Str. 8a, D-24977, Grundhof, Germany

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2287	Товариство з обмеженою відповідальністю «Євросем» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «IEvrosem»	вул. Академіка Заболотного, буд. 154 Д, м. Київ, 03143 vul. Akademika Zabolotnoho, bud. 154 D, m. Kyiv, 03143
2289	Інститут луб'яних культур Національної академії аграрних наук України Instytut lub'ianykh kultur Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Терещенків, 45, м. Глухів, Сумська обл., 41400 vul. Tereshchenkiv, 45, m. Hlukhiv, Sumskya obl., 41400
2302	Заатцухт Штрєнг-Енгелєн ГмбХ & Ко. КГ Zaatzucht Streng-Engelen GmbH & Co. KG	Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany Aspachhof, D-97215 Uffenheim, Germany
2312	Товариство з обмеженою відповідальністю «Передові Агротехнології» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peredovi Ahrotekhnolohii»	вул. Академіка Павлова, буд. 88, м. Харків, 61038 vul. Akademika Pavlova, bud. 88, m. Kharkiv, 61038
2314	Дослідна станція помології ім. Л.П. Смиренка Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Doslidna stantsiia pomolohii im. L.P. Symyrenka Instytutu sadyvnytstva Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	с. Мліїв-1, Городищенський р-н., Черкаська обл., 19512 s. Mliiv-1, Horodyshchenskyi r-n., Cherkaska obl., 19512
2440	АПСОВСЕМЕНТИ С.П.А. APSOVSEMENTI S.P.A.	Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY Strada Torremenapace, 40 27058 Voghera (PV) - ITALY
2513	В. фон Боррис-Еккендорф ГмбХ & Ко. КГ W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG	Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany Hovedisser Str.92 D-33818 Leopoldshohe Germany
2522	Монсанто Холланд Б.В. Monsanto Holland B.V.	Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands Leeuwenhoekweg 52, 2661 CZ, Bergschenhoek, Netherlands
2529	ІСІ Сementі С.п.А. ISI Sementi S.p.A.	Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma) - ITALY Frazione Ponte Ghiara, 8/a, 43036, Fidenza (Parma) - ITALY
2545	Сейет Плантефоредлінг І/С Sejet Planteforaedling I/S	Noeremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark Noeremarksvej 67, 8700 Horsens, Denmark
2547	Клузер Брідінг Інтернешнл ГмбХ Cluser Breeding International GmbH	Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany Gammelby 6, 24966 Sorup, Germany
2557	Кен-Гро Дженетікс Інк. Can-Gro Genetics Inc.	P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada P.O. Box 1353, 75 Wellington st., Clinton, Ontario, ON NOM 1L0, Canada
2584	Жермікопа Брідінг САС Germicopa Breeding SAS	1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France 1 allée Loeiz Herrieu, 29334 Quimper SEDEX, France
2597	БАСФ СЕ BASF SE	Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany
2602	БАСФ Агрікалчерал Солюшнс Сід ЮС ЛЛС BASF Agricultural Solutions Seed US LLC	100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA 100 Park Avenue, Florham Park, New Jersey 07932, USA
2610	Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Перемога» (СТОВ «Перемога») Silskohospodarske tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Peremoha» (STOV «Peremoha»)	вул. Паркова, 8, с. Малополовецьке, Фастівський р-н, Київська обл., 08555 vul. Parkova, 8, s. Malopolovetske, Fastivskiy r-n, Kyivska obl., 08555
2616	Вузкумне центрум СЕЛТОН, с.р.о. Vyzkumne centrum SELTON, s.r.o.	Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic Stupice 24, 250 84 Sibrina, Czech Republic
2626	Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна Burdeniuk-Tarasevych Larysa Antonivna	вул. Голубина, 18, м. Біла Церква, Київська обл., 09117 vul. Holubyna, 18, m. Bila Tserkva, Kyivska obl., 09117
2643	Сингента Кроп Протекшн АГ Syngenta Crop Protection AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2644	Сингента Партісіпейшнз АГ Syngenta Participation AG	Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel Rosentalstrasse 67, P.O. Box-4002, Basel
2653	Коссад Семанс ЕС А Caussade Semences S A	Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France Impasse de la lere 82300 CAUSSADE France
2657	Нордзаат Заатцухт ГмбХ Nordsaat Saatucht GmbH	Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany Bohnshauser Strabe 1, 38895 Langenstein, Germany
2660	АйПіАр Б.В. IPR B.V.	P.O. Box 88, 8500 AB Joure, the Netherlands P.O. Box 88, 8500 AB Joure, the Netherlands
2662	ХМ.КЛОЗ, Інк. HM.CLAUSE, Inc.	260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618 260 Cousteau Place, Suite 210, Davis, California, USA 95618
2668	Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірасол-Сід-Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Mirasol-Sid-Ukraina»	вул. Валентинівська, буд. 22, м. Харків, Харківська обл., 61170 vul. Valentynivska, bud. 22, m. Kharkiv, Kharkivska obl., 61170
2692	Павловнія Професіональ С.Л. Paulownia Professional S.L.	Camino Estanca S/N apartato correos 50, Alcaniz 44600, Teruel, Espana Camino Estanca S/N apartato correos 50, Alcaniz 44600, Teruel, Espana
2706	Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України Donetska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Захисників України, буд. 1, м. Покровськ, Донецька область, 85307 vul. Zakhysnykiv Ukrainy, bud. 1, m. Pokrovsk, Donetska oblast, 85307
2715	Товариство з обмеженою відповідальністю «Кортева Агрісаєнс Україна» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Korteva Ahrisaiens Ukraina»	вул. Петра Сагайдачного, 1, м. Київ, Україна, 04070 vul. Petra Sahaidachnoho, 1, m. Kyiv, Ukraina, 04070
2718	Товариство з обмеженою відповідальністю «ВВІ-Агро» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «VVI-Agro»	вул. Приморська 56, с. Новофедорівка, Березанський район, Миколаївська область, 57437 vul. Prymorska 56, s. Novofedorivka, Berezanskyi raion, Mykolaivska oblast, 57437
2720	МАС СІДС MAS SEEDS	Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE Route de Saint Sever 40280 HAUT-MAUCO FRANCE
2723	Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України Bukovynska derzhavna silskohospodarska doslidna stantsiia Instytutu silskoho hospodarstva Karpatskoho rehionu Natsionalnoi akademii ahrarykh nauk Ukrainy	вул. Крижанівського Богдана, 21 а, м. Чернівці, 58025 vul. Kryzhanivskoho Bohdana, 21 a, m. Chernivtsi, 58025

Код Code	Назва Name	Адреса Address
2739	Серела Інк. Cerela Inc.	1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0
2753	Рожков Роман Вікторович Rozhkov Roman Viktorovich	1133, 4th Ran, St-Hugues, Quebec, Canada, J0H 1N0
2754	Попов Віталій Миколайович Popov Vitalii Mykolaiovych	вул. Перемоги 1/9, смт Есхар, Чугуївського р-ну, Харківської обл., 63524
2755	Турчинова Ніна Петрівна Turchynova Nina Petrivna	вул. Перемоги 1/9, смт Есхар, Чугуївського р-ну, Харківської обл., 63524
2756	Криворученко Роман Володимирович Kryvoruchenko Roman Volodymyrovych	пр. Тракторобудівників, б. 65, кв. 44, м. Харків, 61120
2757	Долгова Тетяна Анатоліївна Dolhova Tetiana Anatoliivna	пр. Тракторобудівників, б. 65, кв. 44, м. Харків, 61120
2765	Якоб Гусен Jakob Goosen	навч. Міст. ХНАУ, б. 32, кв. 9, с. Докучаєвське, Харківський р-н, Харківська обл.
2783	Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрокрай» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «Ahrokrai»	навч. Міст. ХНАУ, б. 32, кв. 9, с. Dokuchaievsk, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl.
2800	Кудрик Вадим Валерійович Kudryk Vadym Valeriiovych	навч. Міст. ХНАУ, б. 33, кв. 42, с. Докучаєвське, Харківський р-н, Харківська обл.
2803	СЗБ Полска сп. з о.о. сп.к. SZB Polska sp. z o.o. sp.k.	навч. Міст. ХНАУ, б. 33, кв. 42, с. Dokuchaievsk, Kharkivskiy r-n, Kharkivska obl.
2804	Алрес - Лабуле Семанс Alres - Laboulet Semences	вул. Ахсарова, б. 23, кв. 260, м. Харків, Україна, 61204
2805	Філатов Віктор Михайлович Filatov Viktor Mykhailovich	вул. Ахсарова, б. 23, кв. 260, м. Харків, Україна, 61204
2806	Д'яков Андрій Вікторович D'yakov Andrii Viktorovich	Nieuwediep 50 NL-9512 Sj Nieuwediep
2813	ВІЛМОРІН-МІКАДО VILMORIN-MIKADO	Nieuwediep 50 NL-9512 Sj Nieuwediep
2819	ЕЙША СІД КО. ЛТД. ASIA SEED CO. LTD.	вул. Зосяцька, 1, м. Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна, 31000
2828	Згірін Олексій Олександрович Zhirin Olexsii Oksandrovych	вул. Козацька, 1, м. Krasyliv, Krasylivskiy r-n, Khmelnytska obl., Ukraina, 31000
2835	Інститут Огородництва Instytut Ogrodnictwa	Київський майдан, 13/53, м. Луцьк, 43000
2841	Мінамі Поланд СП.З.О.О. Minami Poland SP.Z.O.O.	Kyivskiy maidan, 13/53, m. Lutsk, 43000
2851	Ай Ді ГРЕЙН САС ID GRAIN SAS	ул. Stanislaw Wyspianskiego 43 60-751 Poznan, Poland
2858	ІСТРОПОЛ СОЛАРІ а.с. ISTROPOL SOLARY a.s.	ул. Stanislaw Wyspianskiego 43 60-751 Poznan, Poland
2888	ТОВ «Закарпатська Тополя» TOV «Zakarpatska Topolia»	6 Avenue Du Capitaine N Tchorere, 80270 Airaines, France
2890	Лідеа Франсе САС Lidea France SAS	6 Avenue Du Capitaine N Tchorere, 80270 Airaines, France
3090	Матвієнко Микола Васильович Matviienko Mykola Vasylovych	вул. Лермонтовська, 38, квартира 20, місто Харків, 61024, Україна
3205	АБЦз Груп Б. В./С.Р.Л. ABCz Group B. V./S.R.L.	вул. Лермонтовська, 38, kvartira 20, misto Kharkiv, 61024, Ukraina
3208	Фермерське господарство «Відродження» Fermerske hospodarstvo «Vidrodzhennia»	вул. Чайковська, 33 Б, квартира 60, м. Харків, 61024
3211	Бондаренко Артем Миколайович Bondarenko Artem Mykolaiovych	вул. Чайковська, 33 B, kvartira 60, m. Kharkiv, 61024
3217	Інвеніо INVENIO	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France
3218	Ярмолюк Іван Савич Yarmoliuk Ivan Savych	Rue du Manoir, 49250 La Menitre, France
3220	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «БЛАГОДАТНЕ» Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu «AHROFIRMA «BLAHODATNE»	515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
		515, Tera Tower B, 167 Songpa-daero, Songpa-gu, 05855, Seoul, Republic of Korea
		кв. 99, корп. А, буд. 64, вул. Академіка Корольова, м. Одеса, 65104
		кв. 99, корп. А, буд. 64, вул. Akademika Korolova, m. Odesa, 65104
		ул. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland
		ул. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Poland
		ул. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska
		ул. Domaniewska nr. 37, lok. 2.43, kod 02-672, Warszawa, kraj Polska
		Rue du Bourrelie, 41, 31330 Merville, France
		Rue du Bourrelie, 41, 31330 Merville, France
		93013 Horne Myto, 267, Slovakia
		93013 Horne Myto, 267, Slovakia
		вул. Нова, буд. 17, село Холмець, Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 89444, Україна
		вул. Nova, bud. 17, selo Kholmets, Uzhhorodskiy r-n, Zakarpatska obl., 89444, Ukraina
		Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
		Avenue Gaston Phoebus - 64230 LESCAR - FRANCE RCS Pau 423 296 250 - VAT: FR 70 423 296 250
		вул. Богомольця, 18, с. Хотів, Київська обл. 08171
		вул. Bohomoltsia, 18, s. Khotiv, Kyivska obl. 08171
		Aldestraat 44, 3500 Hasselt, Belgium
		Aldestraat 44, 3500 Hasselt, Belgium
		вул. Нагорна, 23а, с. Хутірське, Петриківський р-н, Дніпропетровська обл., 51822
		вул. Nahorna, 23a, s. Khutirsk, Petrykivskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 51822
		вул. Лесі Українки, 11, с. Колодяжне, Ковельський р-н, Волинська обл., 45061
		вул. Lesi Ukrainky, 11, s. Kolodiazhne, Kovelskiy r-n, Volynska obl., 45061
		MIN DE BRIENNE, 110 QUAI DE LA PALUDATE, 33 800 BORDEAUX (France)
		MIN DE BRIENNE, 110 QUAI DE LA PALUDATE, 33 800 BORDEAUX (France)
		вул. Нагорна, 23 а, с. Хутірське, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл., 51822, Україна
		вул. Nahorna, 23 a, s. Khutirsk, Dniprovskiy r-n, Dnipropetrovska obl., 51822, Ukraina
		вул. Хрещатик, 251, м. Черкаси, 18002
		вул. Khreshchatyk, 251, m. Cherkasy, 18002

Код Code	Назва Name	Адреса Adress
3221	Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України Instytut klimatycznie oрієntovanoho silskoho gospodarstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk Ukrainy	вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 9, м. Київ, 01010 vul. Mykhaila Omelianovycha-Pavlenka, 9, m. Kyiv, 01010
3223	Коновалов Давид Віталійович Kononov Davyd Vitaliiiovych	вул. Вокзальна, 41, кв.85, смт. Глеваха, Фастівський р-н., Київська обл., 08631 vul. Vokzalna, 41, kv.85, smt. Hlevakha, Fastivskiy r-n., Kyivska obl., 08631
3224	Коновалова Світлана Анатоліївна Konovalova Svitlana Anatoliivna	вул. Вокзальна, 41, кв. 45, смт. Глеваха, Фастівський р-н., Київська обл., 08631 vul. Vokzalna, 41, kv. 45, smt. Hlevakha, Fastivskiy r-n., Kyivska obl., 08631
3225	Починок Віталій Михайлович Pochynok Vitalii Mykhailovych	вул. Металургів, 26, кв.4, с. Нове, Кіровоградська обл., 25491 vul. Metalurhiv, 26, kv.4, s. Nove, Kirovohradska obl., 25491
3227	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНАГРО УКРАЇНА» TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU «SANAGRO UKRAINA»	вул. Є. Коновальця, буд. 44-Б, 1 під'їзд, 3 поверх, м. Київ, 01133 vul. I.E. Konovaltsia, bud. 44-B, 1 pid'izd, 3 poverkh, m. Kyiv, 01133
3228	Приватне підприємство «Поділля-Агрохімсервіс» Pryvatne pidpriemstvo «Podillia-Ahrokhimservis»	вул. Незалежності, буд. 233, смт. Вапнярка, Тульчинський р-н., Вінницька обл., Україна, 24240 vul. Nezalezhnosti, bud. 233, smt. Vapniarka, Tulchynskiy r-n., Vinnytska obl., Ukraina, 24240

Загальновживані скорочення термінів

Common abbreviations

У перекладі з української на англійську мову скорочень термінів у бюлетені використано загальновживані скорочення термінів Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV).	The translation from Ukrainian to English of the aberrations in the Bulletin engaged common aberration of terms by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).
ПС – патент на сорт рослин (згідно з термінологією UPOV – права селекціонера),	PBR – Plant Variety Patent (according to UPOV terminology – Plant Breeder's Rights),
РС – державна реєстрація сорту рослин (згідно з термінологією UPOV – національний перелік),	NLI – Plant Variety State Registration (according to UPOV terminology – National Listing),
АС – свідоцтво про авторство на сорт рослин.	AC – Plant Variety Authorship Certificate.
Скорочені назви, скорочення термінів, які вжиті в офіційних описах та показниках господарської придатності:	Short names, aberrations as appearing in the Descriptions and Indices of Value for Cultivation and Use:
П – Полісся,	П – Woodlands,
Л – Лісостеп,	Л – Forest-Steppe,
С – Степ,	С – Steppe,
ЗГр – захищений ґрунт.	ЗГр – covered ground.

Розподіл ботанічних таксонів за блоками

Горох посівний (зерновий)

3 Середньостиглий (71–80 діб)

4 Пізньостиглий (більше 81 доби)

Ячмінь звичайний (ярий, озимий)

1 Без блоку

2 Голозерний

Ріпак (ярий, озимий)

4 Сорт: низькоеруковий

Картопля

7 Ранньостиглий 81–100 діб

8 Середньостиглий 101–125 діб

9 Середньопізній 126–140 діб

Пшениця м'яка (озима)

1 Середньорослий

2 Напівкарлик

Горошок посівний (вика) (ярий)

1 Без блоку

Тритикале (дворучка)

1 Без блоку

® патент

/ значок рівнозначності

Характеристика 1 – Напрямок використання

пер переробка

слн сильний

цін цінний

ф філер

зерн зерновий

пв пивоварний

х харчовий
олн олійний
стл столовий
конс консервний
зс для соління
ун універсального призначення
свж споживання у свіжому вигляді
озл озеленення
корм кормовий
дкр декоративного оформлення
н насіння
підщ. підщепа

Характеристика 2 – Група стиглості

сс середньостиглий
рс ранньостиглий
пс пізньостиглий
осін осінній
др дуже ранній

Характеристика 3 – Якість

сбіл середньобілковий
скр середньокрохмальний
нкр низькокрохмальний
пкр підвищеної крохмальності

Характеристика 4 – Метод створення

СЗ самозапилення
П перехресне запилення
С сорт-синтетик
F1 гібрид

ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
OFFICIAL PUBLICATION

ОХОРОНА ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

PLANT VARIETY RIGHTS PROTECTION

Бюлетень
BULLETIN

Відповідальний за випуск: Павлюк Н. В.

Комп'ютерне верстання: Бойко А. І.

Номер підготували: Возна Т. Г., Каражбей Г. М., Костенко Н. П., Лашук С. О.,
Тиха Н. В., Худолій Л. В., Шкапенко Є. А.

Офіційні описи
та показники
господарської
придатності підготували: Баліцька Л. М., Данюк Ю. С., Дутова Г. А.,
Житомирець О. С., Ільченко Я. В., Курочка Н. В.,
Матус В. М., Михайлик С. М., Носуля А. М.,
Свинарчук О. В., Симоненко Н. В., Смульська І. В.,
Сонець Т. Д., Таганцова М. М., Хоменко Т. М.

Передплатний індекс видання – 86211.

Підписано до друку 13.11.2023

Дата друку
Формат 60x84 1/8. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Officina.
Умов. друк. арк. . Обл.-вид. арк..
Тираж 25 прим. Зам. №
Віддруковано з оригіналів замовника.
21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 62а.
Тел.: 0(800) 33-00-90, (096) 97-30-934, (093) 89-13-852, (098) 46-98-043
e-mail: info@tvoru.com.ua
<http://www.tvoru.com.ua>

**Бюлетень «Охорона прав на сорти рослин» –
офіційне видання, що містить офіційні відомості
щодо охорони прав на сорти рослин.**

Видається 12 разів на рік. Розраховано для:

- науковців;
- викладачів;
- студентів;
- заявників;
- підтримувачів;
- представників з інтелектуальної власності;
- авторів та власників сортів тощо

Передплатний індекс 86211